


7


75/17 973


12/12


36


247











ΦΥΤΟΒΑΣΑΝΟC

SIVE

PLANTARVM

ALIQVOT HISTORIA

IN QVA DESCRIBVNTVR DIVERSI GE-
neris Plantæ veriores, ac magis facie, viribúsq; re-
spondentes antiquorum Theophrasti, Diosco-
ridis, Plinij, Galeni, aliorúmque deli-
neationibus, ab alijs hucusque
non animaduersæ.

FABIO COLUMNA AVCTORE.

ACCESSIT ETIAM PISCIVM ALIQVOT,
Plantarúmque nouarum Historia eodem auctore.

AD ILLVSTRISSIMVM ET REVERENDISSIMVM D.
S. R. E. CARD. M. ANTONIVM COLUMNAM.



Ex Officina Horatij Saluiani.

NEAPOLI, M. D. XCII.

Apud Io. Iacobum Carlinum, & Antonium Pacem.

PHYTOGEOGRAPHY

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT

PLANT



PLANT

PLANT

PLANT

ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISS. D.
S. R. E. CARDINALI
MARCO ANTONIO
COLVMNAE.



ONFINGVNT Poëta ,
ij q₃ apud veteres Theolo-
gi, Cardinalis Ampliſſime,
Mercurium inuentam ſi-
bi Lyram , ſi non adeò
excultam, at neceſſariam,
Apollini dono dediffe .

Nonne id quidem præclarè? Latona nimirum
filius omni bonorum genere ſatis ſuperq₃ af-
fluebat , in eamq₃ poterat omnia conferre or-
namenta , atque admirabilem penè reddere ;
Maia verò natus haud tanti ſanè erat , vt ta-
le tantumq₃ munus exornaret , ac mortalium
pectora delectatione perfunderet , Aequè au-
tem mihi humanitate tua freto actum videtur

T 2 eſſe,

esse, cùm inuenta hac mea fortasse non inutilia,
licet minimè expolita, tibi, maxime Heros, obtu-
lerim, atque dedicauerim. Quis verò mortali-
um te animi bonis, atque corporis antecellit?
quis maiora rebus ornamenta impertit? deni-
que quis aequè ac tu homines ad te rapis mira-
qua praditus es sapientia? Excipe igitur, ob-
secro, ingenij mei primitias: eas enim, ut tibi
animum meum aperirem, id quod à pueritia
semper exoptavi, magnis quidem laboribus com-
paravi: cumque ea, qualescunque profectò sint,
principibus viris debeantur, voluntatem hanc
meam in te propensam aequi, bonique fac: si-
quidem id temporis si tanti non fuerint, an-
nuente te, αἱ μνημόσυνον observantia in te mea,
maiora forsitan movebo. Interim valde tero-
go, ut rebus hisce meis opem feras, currentique
mihi addas calcaria: quandoquidem τὰ κενεὰ
καλεῖται omnino sunt. Ausus id certè sum: ete-
nim tu ad omnia natus es; atque unus ipse
principis nomine dignus maximè videris, idque
neminem latet: nam & magna cum omnium
admiratione plurima sustines negotia, ijsque
diligenter praes, & Gracis, Latinisque literis,

*scientijs omnibus ornatissimus es. Vale, teque
Deus ea, quæ per dignus es, nominis amplitudine
decoret. Neapoli. Idibus Junij.*

CIO. IO. XCII.

Illustrissimæ, & Reuerendissimæ D. T.

addictissimus

Fabius Columna.

AD LECTOREM.



PLANTARVM cognitionem, rerumque aliarum naturalium apud priscos, tum neotericos celebrem fuisse, ac summo honore habitam, quippe qua proffit, atque delectet, non à Philosophis tantum, sed etiam ab Regibus, veteres testantur historia. Nec me cognitionis illarum utilitatem hoc loco asserere necessarium videtur, cum & qui Medicorum industria aliquando usus sit, cognitam habeat. Ac equidem testis esse possum, atque affirmare, nihil hominibus corporis incolamitatem prestare posse, nisi huius rei scientia usum: quo animalia quæque rationis expertia à natura edocta, nedum homines, à morborum periculis se tuentur, atque contra ea firma evadunt. Noscunt enim ipsa quæ sibi salutaria sunt: nos autem nisi ab aliquo edocti simus, aliorumque experimento, haud ea scire potuissimus. Hoc autem humani generis est peccatum, quo non modò quæ vitæ subsidia sunt, sed & salutis remedia labore consequi oportet. Quid enim vitam hanc vivere prodesset, si morbis quotidie illam afficientibus vexar emur? Blos enim ælios esset. Morborum sanè frequens inuasio, qua cæteris studijs me abdicare eo tempore oportuit, Epilepsia præsertim, à qua Dei Optimi Maximi miseratione, beataque Virginis matris intercessione evasi, in hac mentem adduxit meam. Hac enim de causa Hippocratis, Galeni, aliorumque scripta reuoluere cæpi: nam quod Medici pro morbi curatione faciendum responderent, an & antiquorum testimonijs comprobaretur, perpendere volebam: siquidem salutis, animoque meo satisfacere videbar. Sic etiam, an Medicorum formulas pharmacopola obseruarent, ac an & ipsi Medici, & pharmacopola, ea quæ syrupis pharmacisque componendis necessaria sunt, Plantas scilicet, Metallica, cæteraque, & compositionis modum, ratione, experi-

perientiaque comprobata agnoscerent. Quam cupiens scientiam habere, Auctores, qui de Plantis, Animalibus, Metallicisque descripsissent historias, perlegere volui; atque in ijs multa incerta, atque incognita recentioribus, tum ipsis antiquis perspexi, qua vel rei ignoratione, vel eorum mutila, deprauataque historia, verborum, sensuumque difficultate, ab interpretibus, atque commentatoribus minus animaduersa fuerunt. Ea praesertim libuit ijs maxime incumbenti, qua potui diligentia, atque studio inuestigare, atque exponere. Atque antequam ad difficiliorum interpretationem, atque cognitionem peruenire potuissem, minima quaque primum, vel ipsa vulgaria scire me oportebat, non sine aliquo labore: quantumque in his adipiscendis insudauerim, qui studijs hisce defessi sunt, facile intelligere poterunt. Ab initio profecto Plantas, Animalia, ceteraque metallica, qua in manus peruenerunt, perquirere, atque inuestigare, suisque historijs respondentia reponere, nemine quidem demonstrante, vel docente, (familiares id non latet) studio, lectione, iudicioque, summa ingenij mei industria, visque fuit. Postquam autem aliquem horum numerum, & magnam fere partem, eorumque rei inspectione, atque cum historijs collatione scientiam, adeptum me esse cognoui; an & alij eiusdem rei professores eo etiam modo, quo ipse, ea cognoscerent, denominarentque eadem ratione, ipsorum colloctione certior fieri volui; atque ita me non inanem impendisse operam perspexi. Sed hoc haud satis mihi esse visum est: quamobrem maiora exquirere statui, ut maiore haecenus diligentia me his studijs incubuissem ostenderem, atque si potuissem aliquid communi studiosorum saltem utilitati excepiisse viderer. Quod ut assequi possem, Dioscoridis loquendi modum, verborum proprietatem, & quomodo ijs usus sit, considerare caepi, atque ut facilius possem, verborum singulorum, similitudinum descriptionum, atque in illis verborum magis proprietatem signantium, item plantarum similitudinum radice, fronde, caule, flore, semine, vel toto habi-

tu, ac denique caterarum rerum, indicem ferè confeci. Ac eo veluti regula quadam in plantarum inuestigatione usus sum, non sine aliqua commoditate. Sed non pauca in eo considerata sunt, quæ difficultatem afferre possent; verba nempe δάμνος, δάμνιον, & δάμνιονιον, quibus herbas denominat, nullam cum fruticibus affinitatem, nec similitudinem habentes: non enim lignosæ, aut surculosæ sunt, nec fiunt senectute, sed succosæ, teneræ, & ab radice foliosæ, quæ notæ sunt herbarum non fruticum, etsi eadem alarum multitudine diuidantur, quod forsân poterit cum fruticibus commune dici. Sæpè καρπὸν & σπέρμα confundit. Floris etiam similitudinem, nunc in forma, nunc in colore, nulla addita differentia describit. Foliorum etiam similitudinem nunc in parte, nunc in toto, atque tam lobos, siue lacinias, quàm folia φύλλα appellat, totum cum parte confundens. Plantas denique flore, atque fructu carere, quæ vel serò, vel confestim eos edunt, asserit, atque etiam illas, in quibus propter tenuitatem difficile cognoscantur. In his autem animaduertendum est quod idem Dioscorides in præmio testatur, non omnes plantas se conspexisse, nec erat quidem facile, sed ex aliorum historia excepisse; atque ab incolarum locorum in quibus plantæ orirentur narratione plantas multas delineasse: non ideo mirandum si in aliquibus peccarit. Quæ ut cognoscerem diu versatus sum in ijs, tum lectionem historiarum, tum inspectionem rerum repetens. Quare multa in singulis plantarum descriptionibus à me observata conspiciuntur, quibus plantæ delineatio, atque forma dilucidatur: quæ etiam per regulam modum describi potuissent; sed hic ea repetere viderer. His sic à me cognitæ, faciliore redita mihi Dioscoridis delineatione, difficiliorum, incognitarumque plantarum nouam sententiam cæteris probabiliorẽ, ni fallor, afferre minus laboris fuit. Quibus singulis rationem, observationemque plantæ necessariam addidi, in qua, Dioscoridis lectio quæ verior sit, quæ plantæ necessariè notæ, quomodo respondere debeant, conspicuum erit omnibus. Plantarum etiam ab alijs descri-

descriptarum confutatio agnoscetur, quam in fine cuiuslibet plantæ Historiæ apposui, ut cognita planta à me proposita, & cum Dioscoridis historia collatione facta, magis respondentem cæteris plantis, atque veriorē facie, viribusque me descripsisse ex illis colligi possit. Atque veluti auri fabri faciunt, optimi auri signo in coticula prius facto, alterius postea, & diuersi auri probationem, vel improbationem collatione excipiunt: Sic Dioscoridis posita delineatione, quæ auro optimo signatam coticulam æmulatur, plantam cum illa contuli, quæ si forsan non optima videbitur singulis partibus, haud dubito quin cæteras ab alijs descriptas in fine descriptionis collatas longè superet: id quidem efficere conatus sum. Multis enim plantis ab alijs nomen inditum cognoui, quæ, forcipe folijs illarum laciniatis, & serratis, nondum similitudinem assequi videbantur, nam vel magnitudine, vel paruitate etiam differebant, sicuti & substantia, viribusque. Multis etiam contra, quibus ampliora reddi folia oportebat, ut digna eo nomine censerī possent. Alijs flores, siliquasque concinnare necesse erat, alijs totum plantæ habitum diuersum immutare: quamobrem quaslibet pro illis supponere melius erat. Quod non parum animum meum excitauit, ut pro illis magis respondentes, nisi genuinas possem, inquirerem, ac reponerem. Has æmulatione inuidiaque ab imperitis improbatum iri aliqua saltem parte non ignoro. Quibus ut recto animo has improbasse videantur, plantas pro illis veriores, magisque respondentes facie, & viribus afferre studendum est. Atque tunc maiore gaudio afficiar; cùm aliquem mei æmulatione studijs vehementius incumbentem, communi utilitati veriora in lucem proferre cognouero. Non equidem ut aliorum refellerem plantas, sed ut veriores ostenderem, hac & Diuapiv scripsi: nec plantas hæc ita affirmare audeo constanter, quòd quibusdam meliores inueniri posse minimè censeam. Quod ut ipsemet assequar etiam atque etiam perquiro. Non enim pudebit si foridẽ meliorem de ea re sententiam, veriorẽque plantam inuenero,

errasse me antea, vel hoc non animaduertisse fateri: αἰδεσθῆναι
γὰρ ἔστι τὸ ἀμαρτάνειν. Atque mihi summis quidem laudibus
dignus videtur esse, qui spretanonnullorum hominum sese mirè
iactantium opinione, & ὁρίεσθαι περὶ ἰδίας, maximè probat. Nec
etiam hac statuta sunt, sed iudicia rationibus confirmata, vel
potius suspicionibus, quibus semper certiora iudicia superuenire
poterunt, hisque veriora agnoscere possumus: atque ideo si quid
post harum editionem affecutus fuero veritatis, aut certio-
ris iudicij, quod non animaduertissem, tum etiam plantarum
non descriptarum, aliarumque rerum, in alteram editionem
huic adnectendam prolaturum me polliceor, nisi nouum Dioscori-
dem breui, verioreque commentatione, cū nouarum pluriumque
plantarum additione, iam inceptum, ut amicorum satisfaciam
voluntati, perfecero, & edidero. Qui haud suam poterit conse-
qui perfectionem, nisi huius rei studiosorum munere ac liberali-
tate plantas quasdam, metallicaque habuero: quorum non pau-
ca Ferdinandus Imperatus huius rei studiosissimus, qui rectè
ὁνοματίζεσθαι habendus est, mihi dono dedit: ut or quidem eo val-
de familiariter, isque re suum erga me amorem patefacit: sapius
enim Musæum, plantasque viuas, quas innumeras summa dili-
gentia alit, conspiciendi copiam facit, ac earum semper multas
liberaliter offert. quamobrem etiam illi gratias agere debebunt,
qui aliquid ex meis lucubrationibus exceperint, nam nisi prius
plurium cognitionem plantarum assequutus essem, minimè in-
uestigare, atque eligere magis respondentem potuissem. Mul-
tas plantas mente, atque idea retineo, quas re ipsa videre non-
dum potui. Idcirco sapius non tantum quas ipse alo plantas, &
quarum icones ipses plantis noua quadam arte à me excogitata
effinxi, quarum non minimus est numerus, sed & spontè na-
scentes, semper cū possum, conspiciere, considerareque conor,
ut aliquarum sese mihi obijceret inuestigatio. Non enim suffi-
cit satius videre plantas, nisi easdem quo oriuntur spontè loco
inspexeris. Cultu quidem plantæ multa degenerant, sicuti &
& mala

& mala cultura: multa etiam maximè gaudent cultu, alia ve-
 rò marcescunt, alia nisi solis continuis radijs illustrata atque
 calefacta sint, non crescunt, alia verò pauco vel nullo solis
 aspectu perficiuntur. Sæpe etiam cultu, vel etiam negligenti-
 a planta transfigurantur, atque folia diuersa emittant, atque
 mutatio etiam fit in sapore, odore, forma, & magnitudine tam
 ipsarum plantarum, quàm fructuum, foliorumque: folia quidem
 sapius, vel angustiora, vel latiora magis, minusque lacinijs diuisa
 sunt secundum soli, cæli, & cultura diuersitatem. Alia quidem
 gracile solum, macrumque amant, alia arenaceum, quadam sa-
 bulosum, alia verò pingue, alia limosum, riguumque. Quibus de
 causis non modo vel degenerant, vel fiunt latiores, sed etiam
 sterilesce euenit: nam sicuti planta humore soli diminuto fru-
 ctus perficere nequeunt: ita et si copiosum habeant alimentum,
 lasciuientes humoris abundantia, copiosos incipientes edere fru-
 ctus, illos postea ad perfectionem maturitatis deducere nequeunt,
 atque ita exinanita pereunt. Quare & cultas, & sylvestres opor-
 tet conspicere, ut in sylvestribus consideretur locus natalis, plan-
 ta statura, & habitus, in plantarum cognitione perquam necessa-
 rij: in cultis verò partes minimæ, & priuata, quæ melius conspici
 possunt: domi quidem cum illas habeas, sapius ad illas te conferre
 potes, atq; primo ortu ad seminum usq; perfectionem inspicere po-
 tes ipsas: quod non ita in spontè nascentibus euenit. Hoc non parū
 obseruauī, & quotidie ferè idem facere oportet, atque non modo
 plantas ipsas considerare, sed illarum historias, à Dioscoride præ-
 sertim descriptas, in cuius textu præter aliorū scripta diligentius
 plantarum nota describuntur, perlegere non solum Latinè, sed
 & Gracè visum est: multa quidem difficillimè, vel nunquam
 cognouissem, nisi Græca verba, & loquendi modum obserua-
 sem. Atque hæc fuit ratio cur, Dioscoridis Græcum textum,
 & Latinam ad verbum versionem in plantarum descriptionibus
 singulis apposuerim. multa quidem hac mea dignoscantur ver-
 sione, quam ab alijs diuersam esse iudicabunt, & forsan immuta-

ram atque deprauatam. Cuius suspicionis causam Latina si cum
 Græcis conferantur verba, cessare certum erit. Græca enim col-
 lationis commoditati inserviunt. Reliquum est ut ostendam Dio-
 scoridis Historiam deprauatam, atque adulteratam à posteriori-
 bus plantarum professoribus, qui diuersas illas nomenclaturas
 apposuerunt, quibus alij nominum communitate & varietate de-
 cepti, multa diuersis nominibus inscripta capita adiunxere, qui-
 bus planta describuntur eadem, nomine tantum differentes: alijs
 remotis ante proprijs viribus, alias contrarias ab alijs capitibus
 differentis plantæ exceptas reposuere: multa etiam capita è lo-
 co in alterum transtulerunt, quæ aliorum etiam doctiorum viro-
 rum iudicio suspecta sunt: quapropter difficile quid de plantis
 illis sit statuendum asserere possumus: quod verò coniecturis
 affecutus sum suis locis videre licebit. Has igitur excipe hilari
 animo meas lucubrationes, & quamprimum Deo fauente quod
 pollicitus sum expecta.

FRANCISCVS MAVRVS MAIDENSIS AD LECTOREM

HIERONYMI COLUMNAE STUDIOSVM.



*ERVM sobolem insignem virtute
 COLUMNAM
 (Sic decessisset post tria secla) patrem
 Pectore quiq; foues, dum te præclara moratur
 Cantibus Aonias numina propter aquas:
 Quiq; hauris nectar sitienti gutture, cuius
 Ille dat assidua pocula plena manu:*

Vt tibi nil desit : videas planè omnia : mentem,
Vt pascas : fœtus edat vt ipsa novos :
Nunc foueas natum et Fabium tantopatre dignũ.
Et pro sexcentis hic sit, vt ille, tibi.
Ingenia hinc absint mediocria : iussit Apollo :
Debentur summis summa theatra viris.
Quæ seruat natura potens, sic finxit vtrunque,
Aeternũ vt tantus duret in orbe labor :
Vtque sit exemplar rerum : ne dente timendo
Officiant nostris tempora sæua bonis.
Cultus vterque quidem est Latio, sermoneq; Graio,
Nympharumque Arni voce recludit opes.
Connectens adeò numeros felicia monstrat
Secula felices reddit & arte viros :
Et patri, & nato Pallas fauitq; , tulitq;
Phæbus opem. Phæbus, Pallas & aqua fuit :
Illi aſt animo inſedit poſt maxima facta
Musarum egregium Calliopea decus .
Quale viro fuit ingenium ! qua præditus arte !
Per membra & quantus fortia ſudor iſt !
Teſtis adeſt vates Calabris in montibus ortus,
Qui primus Latio dixerat arma ſono.
Erutus vt tenebris micat ! vt cluet illa corona,
Vertice detulerat quam ſacer Aonio !

Hic autem patri decus addens, cum sit alumnus
Verè inter paucos & Iouis ipse viros,
Indicis ingenio gaudet, quo gaudet Apollo:
Battus adhuc certè est, sit licet ille silex.
Ergo cum veterum sibi non arrideat aurum,
Scriptorum, atq; ipsum Lyncea decipiat:
Cumq; ardens cecas cupiat dispellere fraudes,
Et cui debentur, tradere diuitias,
Aduocat optatum lapidem, signatq; COLUMNA:
Protinus & vires monstrat uterque nouas.
Exprimit ille quidem syncerè: hic indicat aquè,
Qua bone te vates Delphice digna forent.
Sic iuueni nona nondum trieteride plena
Natura fines transilysse datum est.
Transilyt: testis Siren pulcherrima: testis
Pagina, quamq; dedit, quamq; daturus erit.
Felicem ô iuuenem! bene largi ô sidera celi!
Maior hic humana conditione nitet.
Ornat Aristotelem scriptis, ornatq; Platonem,
Et facilem mira preparat arte viam.
Condit in Euclidem, viuunt quæ secula: viuunt,
Donec metiri tempora Phœbe voles.
Sic legum incumbit studijs, sic iura recludit,
Vnus ut Astræa munere celsus eat.

De sine

Desine mirari Dircaum Amphiona: quid non

Hic ad se numeris conuocat, & cithara?

Vulgares artes nec dedignatur: in ipsis

Nanque animi vires, dexterit asq₃ nitent.

Addit & inuentis, Heron qua monstrat uterque,

Et Phœbi digitis organa digna facit.

Si qua nunc dextra fingit, pingitq₃ fideli,

Spectasset natus, magne Philippe, tuus,

Lysippum haud tanti, tanti haud fecisset Apellem,

Vt ferrent primas docta per ora virum.

Quod tibi nunc præbet, diuino complet odore

Iam pridem Clarj templa superba dei.

Gratū erit at superis, dum sese effundet in amplum

Telluris gremium Iuppiter ipse pater.

Accipe tu facili dextra, vultuq₃ sereno

Munus, & id totum terq₃ quaterq₃ vide.

Non est doctrinis solum, formisq₃ loquendi

Concinnum, viuis stirpium & iconibus:

Verum quiq₃ heroa decent, quiq₃ aethere summo

Mortalem donant, moribus egregijs.

Sudores ergo ambrosios ne sperne COLVMNAE,

Qui cœpit scriptis secula beare suis.

Interea huic Musa cingamus bacchare frontem,

Ne noceat tanto noxia lingua viro.



INTER

PLANTARVM

ALIQVOT ANTIQVORVM

DELINEATIONIBVS MAGIS

RESPONDENTIVM HISTORIA.

FABIO COLUMNA AVCTORE.



Jsopyrum Dioscoridis.



ΣΟΨΥΡΟΝ dictum est, *ὑπὸ τοῦ πυρός*, *Nomen*
non *πυροῦ*: quia florem edit forma *ἢ Ety-*
flammæ similem: flos enim ita simul *mon.*
côgestos apices habet, vt ignis flam-
mas repræsentet: nam ex lata basi in-
acutum desinunt quinque illæ sum-
mæ partes contortæ, inque sese infle-
xæ, ita vt vento agitatom flammam
demonstrent: pyramidales quidem
sunt flores, vnde *ὑπὸ τοῦ πυρός*, τὸ πυ-
ροειδὲς, ignis scilicet speciem habens dicitur, indeque *πυραμίδες*,
quia in modum flammæ in acutum, ex lato prodeuntes desi-
nunt. Alij verò Phasiolon vocant ob similitudinem, nã vt Dio-
scorides ait, κατ' ἄκρον τὸ πέταλον ἑλικά φέρει, in extremo folium ca-
preolum producit: floris folium, πέταλον intelligendum; nam idem
Dioscorides in capite de Vnguento Rosaceo ait, *ῥόδων ἀβρόχων* *Lib. 4.*
ἀριθμῷ χίλια πέταλα, Rosarum non madidarum numero mille folia.
ἑλικά capreolum, quem Plinius hîc pampinum vertit, vt etiam
alibi; eritque sensus: Floris folium in summo, si positum ipsius
confideraueris, si verò partem, in ipsius extremo, producit
ἑλικά, capreolum, capreoli quidem modo inflectitur: quod ex
Plinij textu fit clarius, ait enim: *folium in pampinos torquetur: flo-*

A ris

ris scilicet extremum in pampinum, capreoli scilicet, viticulaeque modo tortuosum definit. Similitudo autem inter Phasiolon & Isopyron erit, ut Isopyri flores in pampinos inflexi, Phasioli florum ex petiolis simul dependentium positum penè referant. Quod perbellè, & exactè exprimit planta à me proposita, totamque Dioscoridis historiam explere videtur, qui ait.

Descriptio.

Ἰσόπυρον, οἱ δὲ φασίολον καλοῦσιν, ἔπ' τοῦ εἰκέναι φασίολον, πρὸ κατ' ἄκρον τὸ πέταλον ἐλκε φέρειν, ἔπεισι δὲ κεφαλὰ ἐπ' ἄκρον τοῦ καυλοῦ, λεπταί, σπειρματίων πλήρεις, παραπλησίον μελανθίῳ τὴν γεῦσιν. τὸ δὲ φύλλον ἀνίσω. quæ sic Latine reddidi, Isopyron, aliqui Phasiolon vocant, cum simile sit Phasiolo, eò quod in extremo folium capreolum producit.

Lib. 27.

c. 11.

Insunt autem capita in summo caulis tenuia, semunculis plena, Melanthio similia gustu: frons autem Aniso similis. Differentiam verò frondis plantæ, & folij floris nemo, quod viderim, huc usque tradidit, atque Ruellius vir doctissimus ut perquam Latine Dioscoridem vertisse videretur, neue ipse ignorasse

Forma.

hoc dici posset, Plinij textum mutilum, vel peruersum pro versione descripsit, qui ait, Isopyron, aliqui Phasiolon vocant, quoniam folium, quod est Aniso simile, in pampinos torquetur. Cuius sensus erit, ut Dioscoridis textui, ex quo transcriptus est locus hic, consentiat: Isopyron quod est Aniso simile, folijs intellige, aliqui Phasiolon vocant, quoniam folium, scilicet floris, in pampinos torquetur. atque ita putarem esse legendum. Planta hæc radicem habet fibrosam, crassiusculam, pallidam, folia forma foliorum Anisi, maiora verò, colorèque cæsia ex viridi, læuia, petiolo longo, tenui, purpureo, & hirsuto adnascentia: tripartita, ut terna folia habere videatur: sed vnumquodque folium, cum planta est bima, vno enim anno non perficitur, in terna cum petiolis diuiduntur, quæ etiam propter profundissimas lacinias in terna videntur diuisa, non tribus petiolis, sed vno ortu prodeuntia. Caulem edit hirsutum, subrubentem, rotundum, tenuem, striatum, angulosum, bipedalem, aliquando maiorem, in cuius summo, & ramorum, ex folijs illis hærentibus cauli absque petiolis, in terna diuisis, ita ut trifolia videantur, tenues petioli Phascoli modo prodeunt; qui propter florum grauitatem ex illorum extremo dependetium curui, dum flores vigent, conspiciuntur: qui, ex quinque Consolidæ regię dictæ floribus simul coniunctis, singuli compositi videntur:

tur : dependētque ita , vt illorum capreoli , tenuiores scilicet partes contortæ , superiores sint basi : itaque flammæ specię quandam , repræsentare videantur : non solum forma , cū quinque illæ partes extremæ superiores sint viticulæ modo inflexę ; flammarūque simul speciem referant : sed etiam colore qui sunt rubri , nam alij vario colore cernuntur , cærulei , albi , lutei , alij multiplices , sed omnes eandem habent formam ; Phasiolique florum positum , & ignis flammæ simulant : colore tantum , atque pluritate flosculorum differunt . Quibus deficientibus , eriguntur paulatim in dies petioli , perficientes capitula similia illis Melanthij , at non ita extuberantia , angustiora verò , atque tenuiora , ac veluti in plures partes diuisa , plena paruis seminibus nigris , angulosis , Melanthij nigri vulgaris forma , & colore , sed læuibus , nitidisque : sapore & gustu amariuscule , atque aliquatulum acerbo , vt Galenus vult , nigri Melanthij semina referentibus , vt si vtriusque plantæ semina gustaueris , paucam , vel nullam sentias saporis differentiam , quodque semen , an idem gustaueris , nisi acrius Melanthiū esset vix cognoscas : neque acrimonia in nigri Melanthij seminibus sentitur , vt Dioscorides ait , quanta in Citrino , etsi adesse caliditatem , negare non possimus . Plinius verò nolens de gustu disputare , scripsit , *Capitula sunt in summo caule tenuia , plena seminis Melanthij* : quod ad formam referri videtur . sed hæc planta vtriusque descriptiones tuetur , cū formam Melanthij , & gustum referat ; Dioscoridis historiæ , & Plinij varietati satisfaciens . Aprili mense floret , atque Maio perficitur : colitur hîc à studiosis , & in hortis propter florū elegantiam . In Germania , Francia , & Anglia , collibus , montibus , & pratis nasci asseritur . Vires huic tribuit Dioscorides scilicet . *Huius semen cum aqua mulsa potum , dolores circa thoracem , & tusses sedat . Conuenit etiam sanguinem spuentibus , & hepaticis . Quas vires , excepta vi sistendi sanguinis , Plinius in sua transcripsit . Galenus verò , Isopyrum aut Phasiolum semen habet amarum , & subacerbum . Extergit itaque & incidit humores crassos cum hoc vt corpora cōtrahat & constringat . Quamobrem excreationibus pectoris conducit , & iecur expurgat , & sanguinem spuentibus non est aduersum : immo etiam iuuare creditur . Nam propter temperaturæ mixtionem contrarijs etiam congruere videtur . Neoterici sub Aquilegiæ , & Columbinae appellatione , à corrupta forsan voce pa-*

Lib. 6.
de simpl.
med. fac.

Tempus.
Locus.

Vires.

Lib. 6.
de simpl.
med. fac.

σῆλον, vel φαξίλον, has vires huic tribuere: vt obstructis hepate, & vesica fellea regio morbo vtiliter dari possit seminis. 3.1. cum Croci obolo: quæ vires ab illis Dioscoridis non dissentiunt: etiâque ad pestiferam luem commendant. Pena semen gustu esse tantillum adstringente, & temperatæ ex calore siccitatis, ideoque ad faucium, pharyngis, & tracheæ incendium &, vlcuscula eo vulgus vti. Non est Isopyron Dioscoridis Melanthij species illa, neque palustre Trifolium, cum neque vlla sit in illa nota Dioscoridis respondens: mirorque Dodonæum virum doctissimum ita hallucinatum, vt Dioscoridis textum totum hîc pervertere, & immutare voluerit, illius sensum, verbâque, atq; Plinij versionem minimè percipiens: & ideo quæ non intellexit, abundare, superfluâque censuit. Neque Vesicaria Indica, Pisum cordatum, vel cor Indicum dicta, à Pena, amici cuiusdam sententia, Isopyrum putata; cum sit repens, nec in illa rectè summum caulis dici possit, vt colligitur ex cap. de Chamefycæ. in quo dicit Dioscorides, non habere caulem, sed viticulos per terram stratos, neque flos in pampinos torquetur, neque habet capitula tenuia, sed magnas vesicas, non semunculis; sed magnis seminibus ternis in singulis vesicis, & ære plenas: gustu etiam Auctoris iudicio dissimili, Pisi scilicet: neque vires Dioscoridi respondentes, quis habere compertum habet, sed omnes, an sit Halicacabi species, dubitant: atque ita à folliculi forma denominatur. Nec, vt idem Pena scripsit, Phasioli πέταλον, quod nonnulli etiam *folium* interpretâtur, habet, quod ipse ignorans, Dodonæo objicit, vt intellexisse videretur. Sed iam demonstraui adhuc neminem non ignorasse. Quare planta à me proposita Dioscoridis Isopyrum habenda, cum neque sit quod aduersari possit, immo suam ipsius historiam dilucidat, adhuc tenebris obuolutam, propter verborum, atque sensus difficultatem, neque ab alijs, & ne quidem ab interpretibus enodatam.



Μαλινάθουλη

Malinathala



INTER

*Aegyptiorum Malinathalle Theophrasti,
Anthalium Plinio.*

Nomen.
Lib. 4. c.
10.
Descriptio.



Lib. 21.
c. 15.
Etymon.

Forma.

INTER edules radices quas Aegyptus fert, Malinathalles à Theophrasto connumerantur, ait. n. de ijs quæ in aqua oriuntur supra locutus: Εἷν δὲ τοῖς ἀμμοῦσι χωρίοις, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, φέρεται καὶ γῆς ὃ καλεῖται μαλινάθλλη. στρογγύλον πρὸ γῆματι. μέγεθος δὲ ἡλίκον μέσσιλον, ἀπὸ ῥιζῶν δὲ, ἀφλοῖον: φύλλα δ' ἀφίσσιν ἀπ' αὐτοῦ ὅμοια κυπέ-
ρῳ. Locis autem arenosis, baud procul à fluvio, nascitur in terra, quod Malinathalle appellatur, figura rotundum, magnitudine Mespili, sine nucleò, sine cortice; folia ut Cypérus mittit. Ex quo textu Plinius mutuatus, pro, Μαλινάθλλη, Anthalium transcripsit: quod Græcè ἀνθάλλιον scriberetur, ex ἀνά, & θάλλω, vel θάλλω, compositum, quod est regermino, parum distans à verbo μαλινάθλλη, quod, ex μάλα adverbium, & ἀνθάλλω conflatum est, significatque valde regermino, quod etymon proprium est huius plantæ, quæ, radice unica fata, ut altera Diosc. Chondrilla se propagat, innumeratque producit. Verba eius sunt hæc. Anthalium longius à flumine nascitur Mespili magnitudine, & rotunditate, sine nucleo, sine cortice, folio Cyperi. Cui planta, Trasi, appellata, siue dulces & esculenti Cyperi, similis admodum, eademque esse videtur. Habet enim ex tenuibus fibris dependentes globulos, læves, rotundos, oblongos, ex aliqua parte magis extuberantes, extremum diuisum habentes uti Mali Punici fructus, Mespili coronam æmulantes: ut in pictura visitur, paucis lineis per obliquum circumductis, ac si pluribus partibus simul coniunctis, constarent, signatos: magnitudine, & forma ad fructum minoris Mespili ex genere Setanæ, accedentes: quem nos hîc, quia molles, & esui aptos habet nucleos, Mespilum ex ossem appellamus: cuius & colorem etiam exterior pars refert: quæ exco-
riari nequit, ideo sine cortice dici possunt: cum propriè cortex sit, quæ exui potest, inutilis, nihilque interiori parti, vel fructui obest: carnem intus continent solidam, albam, sine nucleo

cleo aliquo : sapore dulci ferè Castaneæ : folia emittit Cyperi nostratis vulgaris, at oblongiora ; caulè, & flores æstate eidem
Tempus.
 similes . Rara hîc planta , neque alibi, nisi in studioforum pen-
Locus.
 silibus hortis culta visitur , è Sicilia extremis , arenosisque o-
 ris Austro expositis, vbi spontè oritur , aduecta. Cuius natales
 plantam confirmare videntur , cùm à Theophrasto dicatur ,
Locis autem arenosis &c. ad differentiam plantarum in limosis , &
 palustribus locis nascentium , de quibus antea dixerat , ideò-
 que subiunxit: *haud procul à fluuio nascitur in terra, &c.* Plinius ve-
 rò ad differentiam Colocasæ , & Personatæ , quas Nili sui do-
 tibus gaudere, ait : *Longius à flumine* , oriri tradidit. Ex quibus,
 & superioribus colligitur , arenosa , Austrinæque non sicca ni-
 mis loca Malinathallen adamare . *Hæc incolæ* , sequitur Theo-
 phrastus, *legentes , in bryto hordeaceo decoquunt , dulcia admodum effi-*
ciuntur, hisque pro bellarijs vtuntur . Plinius, *mandunt igni paratum. &*
Lib. 21.
alibi, Anthali, quod Aegyptij edunt, nullum alium reperi rsum. Mat-
c. 29.
 thiolus verò in Veronensium agro oriri asserit : atque ibi pue-
 ri plenos quasillos vænum circumferunt, vocântque *Dolce Trasi:*
Vires.
 crudas , coctasque esitant in bellarijs . Harum cremor vt tra-
 dit Matthiolus pectoris , & laterum vitia expurgat , quo fit vt
 tussientibus perutiles sint . Tunduntur enim maceranturque
 carniû iure, & inde per linteolum exprimitur cremor, quem
 etiam venereis potionibus miscêt recentiorum nonnulli. Idem
 cremor potus ad vrinæ ardores valet , & ad dysenteriam, nam
 humorum acrimoniam retundit , præsertim ex aqua potus , in
 qua candens ferrum extinctum fuerit . Sunt hæ radices vt ex-
 perientia , & dulcedine conijci potest , in moderatè calfacien-
 tium & humectantiû genere. Sed flatus quodammodo gignunt.
 Sunt qui Theophrasti esculentos Cyperos esse iudicent, quam-
Lib. 6. de
causis plâ
 obrem illius textum adducunt, in quo saporis, odorisque gra-
ta. c. 16.
 tia si in radicibus insit plantarum , cur reliqua eorum minimè
 respondeant, rationem reddit : & exempli gratia adducit,
Graminis , Cyperi, Betæ, Apij, Equapij, atque eorum quæ in paludibus,
atque fluuijs idonea cibo proueniunt. Quo loco respondetur, Theo-
Li. 1. c. 16
 phrastum, nusquam Cyperos differre radicibus, & sapore tra-
Li. 4. c. 9.
 didisse . Sed semper inter palustres , atque in aquis degentes
Sc. 11. de
 plantas illos connumerat, atque odoratas radices habere ait: *plan. li. 6.*
nec in sequenti capite Cyperum inter odoratas recensuisset, de can. pl.
tam c. 17.

tam breui intervallo absque vlla differentiæ mentione, si de alio Cypero, dulci scilicet, atque radicibus inodoris, forma etiam differētibus in antecedenti capite verba fecisset, pro quo Trasi planta hæc intelligi posset; cū ē memoria tam citò, quod de priore Cypero in antecedenti capite scripserat, excludere non potuisset. Quare hanc primò tuebar opinionem, vt scilicet textus in quo Cyperus, inter dulces radices connumeratur, sit corruptus, & pro κυπείρου, per ei, diphthongum, Cyperi latinè, κυπίρου, per i, Gladioli scilicet sit reponendum, vt idem Theodorus Gaza in reliquis locis non sine errore vertit Cyperum; Cyperum, & Cypirum confundens; atque semper Gladiolum interpretans. Atque Plinij auctoritate motus Grecum textum emendandum eo loco putabam, vt κυπίρου, pro κυπείρου, haberet. In alijs de Cypero aromatico loqui videtur,

Lib. I. c. 4. Iuncus scilicet triangulari dicto palustri, de quo Dioscorides,

Lib. 21. & Plinius cuius verba sunt hæc: *Quidam etiamnum vnum genus*

c. 18. *faciunt Iunci trianguli, Cyperon vocant. Multi non discernunt à Cypiro, vicinitate nominis. Nos distinguemus vtrunque, Cypirus est Gladiolus, vt diximus radice bulbosa &c. & inferius, Cyperus Iuncus est, vt diximus*

Lib. 21. *angulosus: & alibi, Idem & Gladiolum alterum, quem Cypiron vocant,*

c. 17. *& ipsum palustrem. & eodem capite superius. Bulborum generi quidam adnumerant & Cypiri, hoc est Gladioli radicem; Dulcis ea est, & quæ decocta panem etiam gratiorem faciat, ponderosiorēque simul subacta. Ex quibus, nullo pacto de Trasi planta, Theophrastum eo loco intelligere colligitur: nā si κυπείρου, Cyperi ibi habeatur, cū sit radicibus odoris, forma differentibus, atque palustris, limosisque magis gaudeat locis; Cyperus erit: atque de eo intelligendum est, non qui in lapillofis locis, sed qui in aquis degit, de quo semper loquitur Theophrastus, qui propter maiorem humoris abundantiam ab aquis exceptam, dulciorem saporem reddit, aliquantulum astringentem, odoratum, cibo aptum atque suauem, recentem intellige: nam siccatus parum amarus, & odoratior efficitur: in siccis enim non est dulcedo vt idem Theophrastus ait, & de eo intelligit Dioscorides in ca-*

Lib. 1. *pitate de Cypero, nam alibi de recente radice intelligens, illi*

Lib. 4. *Chrysocomes radicem comparat, dicens esse dulcem, aliquantulum austeram, vt est, his verbis, γδοσαυρόφ οὐκ ἀπηνή, κυπείρω ἴστω οὖσαν, ἐν τοῖς γλυκεῖς παύσῃρον: gustanti non iniucundam, Cypero similem*

existentem ex dulci subausteram: & sic Trasi non poterit esse, quæ nullam habet aulteritatem, atque arenosis, & in Sicilia, & Aegypto, quibus locis frequentissima, & spontanea est, oritur: indeque ad nos & Veronam forsan etiam adsportata, vbi colitur pingui rignoque terreno, vt ait Pena; sed hæc planta pingui agro sata facile corrumpitur, nam vermes radicem erodunt; in arenosis verò & glareosis vermes haud procreantur, plantaque lætior euadit, sed sæpe locus irrigandus est, nisi sit naturâ rignuus. Quare cum ibi de Cypero Theophrastus loqui videatur, non dubium est amplius, Trasi Plantam non esse Theophrasti Cyperum, quæ Malinathallen eiusdem plenè refert, forma, sapore, natalibus, atque vsu, in bellarijs scilicet vt Pena & omnes aiunt, etiamnum vbique expetitam. Quidam obijciunt huic plantæ, magnitudinem non esse Mespilo æqualem, atque de maiore intelligunt, quibus respondeo satis esse ad quamlibet Mespilorum speciem accedere, nam ex trium generum Mespilorum Theophrasti ad minorem Setaneæ speciem, quam nos vt dixi, Mespilum exossem appellamus, accedit, & forsan tertio generi nobis incognito parem, aut maiorem, quod minus est: atque dici potest vt est in Aegypto maiores fieri radices propter loci opportunitatem, quare de hoc amplius non est differendū. Quidam nescientes etymon Anthalij, & Malinathalles, Malum Anthalium scribunt, putantq. ita appellari, atque alij plantam quandam exoticam pro Malinathalle demonstrant, fructu iuglandi nuci pari, quæ sit ne recipienda ignari sciunt.

Chrondilla prima Dioscoridis.



CHRONDRILLA dicta fuit, τῷ τοῦ χόνδρος, quod *Nomen*, est grumus, & ἰλεῖν, quod continere significat, quasi continens grumos, quos Mastichæ similes esse ait Dioscorides his verbis: *Lib. 2.*
 οὗ δὲ τοῖς κλωναρίοις αὐτοῖς δρίσκειτε κόμμι ὁμοίον μάστιγι. Plinius verò, *habet proximam terræ Mastichen tuberculo fabæ &c.* *Lib. 22.* Planta hæc in aridis *c. 22.*

aggeribus viarum aestate visitur hîc humi habens folia strata, quæ vere erumpunt, primùm Cichorio similia, postea vel *Forma locus.*



rò lacinioſa magis efficiuntur, atque Soncho, vel Denti Leonis dictæ plantæ accedunt, carnoſa, fractu, facilia, lactiſque plena: radicem longam: inueni illam trium pedum longitudinem æquantem, craſſitie verò minimum digitum: foris ſubſtāuam, intus albeſcentem lacte turgidam: quam ſi extirpes, non tantam poteris diligentiam adhibere, quin ſaltem plice- tur, atque tunc per obliquum finditur multis locis, exitque lac viſcoſum, quod pauco exinde tēporis interuallo, minúſue quar- ta horæ parte, vt gummi concreſcit. In radice ſemper inue- nies terræ glebulas ab eodem ipſius lacte concretas, dum ma- gis vigeat planta, exudante; quod ita viſcoſum eſt, vt neque à digitis, dum recenſeſt, aqua abluendo, remoueat. Huic plantæ cū caulis erumpit, folia quæ humi ſternebantur, marceſcunt ferè in omnibus: quamobrem rarò illa inuenies habere, aut flaccida pauca: qui trium aliquando pedum al- titudinem æquat, prope humum hirsutus, atque aſper eſt, re- liquus totus læuis, rotundus, multis alis reſertus lignoſis, fle- xilibus, vt vna tantūm planta, velut Geniſta, cui colore, & habitu quadantenus ſimilis videtur, ſcopam efformare poſſis: habet foliola ex interuallo alternatim parua, craſſa, abſque lacinijs, vel raris Linariæ, vel Geniſtæ ſimilia, ex viridi etiam ad cæruleum vergentia, ex quibus ſingulis flores vt in Cicho- rio ſatiuo æſtate exeunt luteo colore, parui, in pappos cum ſemen ematuruerit euolantes: quod oblongum, fuluū- que atque hirsutum eſt. Tota planta, guſtu eſt amaro. Hanc primam Dioſcoridis Chondrillam ſtatuendam eſſe cenſui, cū ſuæ deſcriptioni congruere videatur: ait enim Dioſcorides

Χονδρίλλη, ἢ δὲ καὶ τοῦτο κικωρίον καλοῦσιν ἢ ſερίδα, τὰ μὲν φύλλα καὶ τὸν καυλόν, καὶ τὰ ἀνθη ἔχει κικωρίον ὁμοία, ὅθεν καὶ εἶδος αὐτοῦ τινὲς εἶπον ſερίδος ἀγρίας λέ- πτότερον δὲ τὸ ὅλον, περὶ δὲ τοῖς κλωναρίοις αὐτοῖς δρίσκεται κόμμι ὁμοιον μα- σίχῃ, μεγέθει κυαμινῶα. Chondrilla, quam aliqui Cichorio, aut Serin appellant, folia quidem, caulem, & flores Cichorio ſimiles habet, qua de cauſa quidam ſylueſtris Seridis ſpeciem eſſe dixerunt, ſed tenuiorem totam: at circa ramulos ipſos inuenitur gummi ſimile Maſtiche magnitu- dine Fabæ, &c. Quameandem deſcribens Galenus ita inquit, Lactuce agreſti ſimile quodam olus eſt, quod Chondrillam nominant, & citius in caulem erumpit; amaritudinem habens manifeſtam, & quendam viſcoſum, & album ſuccum, &c. Quibus notis congruere videtur

Tempus.

Descrip-
tio.

hæc, nam tota viscoso, atque albo succo est referta, & si quamlibet partem flectas, radicem, folia, caulem, ramos, flores etiam, ex rima vi orta lacteus succus exit, qui concrefcit paulo post Mastiches duritie, & colore, sed postea longo tempore nigrefcit: & quamuis Dioscorides dicat, succum concrefcisci, in imis ramulis vertit Marcellus Virgilius, Plinium fequutus, qui ait, *proximam terræ Mastichen*, Galenus tamen hoc non tradidit, sed lacte quidem multo esse refertam, & viscoso; cum non semper hoc eueniat: euenire potest quidem vel humoris abundantia excrescentis, & hoc in radice semper inuenitur, vel aliqua vi exteriori, vt vento valido, aut alia, ab animalibus quadrupedibus ibi pascentibus, orta, qua ramuli flexi fuere, atque ita, parte illa curuata, rima efficitur, indeque lac exoritur, quod postea concretum inuenitur, vt pluries obseruaui, atque non solum in caule, sed ramis, frondibusque. In radice verò semper, atque in pluribus partibus, terramque adhaerentem inuenies, atque nouum lac exire videbis, si parum illam flectes, atque concrefcere, vt dixi Mastichen referens; quod plerisque amicis ostendi, minimè hoc credentibus, numquam id obseruarant, nam plantam hanc flocci faciebant. Nulla ex alijs Chondrillæ nomine ab alijs insignita planta, hoc facere reperies: succum quidem illæ lacteum habent, non tamen viscosum, nec facile naturam concrefcentem, immo nec longo tempore. Quare non amplius illas, sed hanc Dioscoridis primam Chondrillam esse dicas, atque vires à Dioscoride huic tributas, inesse scias, ait enim, *Inuenitur autem circa ramulos ipsos gummi Mastichæ simile, magnitudine Fabæ. Quod cum Myrrha tritum magnitudine Oliuæ in linteo appositum, menses ducit. Herba ipsa vna cum radice contusa, admixto melle in pastillos efformatur, qui diluti nitro addito, vitiligines exterunt. Gummi verò etiam pilos agglutinat. Sed & radix recens ad eadem facit, si in ipsam acus tingatur, & pilis admoueatur. Commode est etiam ad riperas cum vino pota. Et succus ipsius aluum sistit, coctus cum vino & potus, aut per se ipsum. Quæ Plinius ita exarauit. Habet proximam terræ Mastichen tuberculo Fabæ, quæ apposita seminarum menses trahere dicitur. Tusa cum radicibus tota, diuiditur in pastillos, contra serpentes argumento probabili. Siquidem mures agrestes ab his læsi, hanc esse dicuntur. Succus ex vino coctæ aluum sistit. Eadem palpebrarum pilos in-*
ordina-

Vires.

ordinatissimos, pro gummi efficacissimè regit. Dorotheus stomacho & concoctionibus vtilem carminibus suis pronuntiauit. Aliqui fœminis & oculis, generationique virorum contrariam putauere. Galenus verò, Chondrilla, & hanc quidam Serin nominant, est enim eiusdem ferè cum illa facultatis, nisi quòd gustu amariuscula est, ac proinde facultate siccantiore. Hanc Lobellius vimineam viscosámque Chondrillam vocat, neque gummi modo globulos concretos animaduertit, saltem in radice: neque illum sequentes, qui viscum melle nigro admixto, & huius radice ad auiculas capiendas idoneum à pueris factitari, asserunt.

Chondrilla altera Dioscoridis.



T hæc sanè Chondrilla dici potest, nam radices habet à quibus grumi pendent, *χόνδροι* Græcis dicti: atque hanc Dioscorides, vt superiorem, Chondrillam appellauit, tradiditque habere radicem rotundam, paruum, &c. his verbis, *ρίζαν δὲ λεπλήν, ἑπακμον, κοῦφην στρογγύλην*, &c. Plinius verò exactiùs hanc

Nomen
Etymon.

describens ita ait, *radice Fabæ simili*, aliquando numerosa: descripsitque confundens vtriusque plantæ descriptiones, primò secundam, secundo verò loco primam ibi, *Habet proximam*, &c. Est igitur herba hæc in mōtibus saxosis, locisque in quibus terra non excedit dodrantem altitudine, nascens, vbi & Cistus, Agrioriganum, atque Calamintha oriuntur: longè à mari, ac etiam ab Austro tutis: radicem habet rotundam, paruum Fabæ magnitudine, succosam, parum lactescentem, albidam, quandoque ad purpureum vergentem, solidam, amarā (maior non excedit Auellanæ nucis formam, sed oblongiorem, læuem, atque cū effoditur nihil terræ retinet, ita vt pellucida, & quasi margarita videatur: quæ maior, vetustiorque inuenitur, tres quatuorue concauitates diaphragmatibus distinctas habere cernitur, atque ideo etiam *χόνδριλλον ἀπὸ τοῦ χόνδρου*, quod pro chartilagine, siue diaphragmate accipitur, vnde hypochondriū dicitur quia *ὑπὸ χόνδρου*, positū est: flauescit, cōtrahitur, rugosáque efficitur: inueniuntur sæpe plures à tenuibus fibris albis per terrā repētibus dependētes, qđ Plinius animad-

Lib. 22.
c. 22.

Forma
locus.

uer-



uerit, cùm dicat, *radice Fabæ simili, aliquando numerosa*. Nam & vnus ex bubulis illis perficit plantam, eandemque plures simul ex fibris dependentes. Ex quarum principio erumpunt, autumno folia Cichorij minora, oblonga circumrofa, siue leniter sinuata, quarum inferior pars ad cæruleum tendit, dorsum habentia rubens, carnosæ, læuia, fractu facilia, atque tunc stridentia, vnde Herbarij hîc, *Herba stridola*, appellant, & lac amarum emanantia: maius folium minus est dodrante: è medio foliorum caulis assurgit vnicus, nudus, læuis, cauus, teres, rubens, lacte turgidus, pedalis, aliquando minor, vel etiam contra maior, secundum loci temporisque temperiem. nam Plinius habet, *caulem minus pedalem*, in cuius summo vnicus est flos luteus, Aprili mense prodiens, Cichorij, siue Dentis Leonis dictæ: cuius basis, & caulis prope illam, hirsutie nigra obsiti cernuntur: semen in pappos euolat maturum. Hanc alterâ Dioscoridis Chondrillam statui cùm suæ respondeat historiæ ab eodem tradita, scilicet, Εἷς δὲ καὶ ἕτερον εἶδος χονδρίλλης, φύλλον δὲ ἔχει πενταβερρωμένον, πορρόμηκες, ἐπὶ γῆς ἐς ρωμύον. καυλὸν δὲ ὁποῦ μέσον. εἴς τιν δὲ λεπτόν, ἐπακμον, κοῦφον, στρογγύλον, πορρωθον, ὁποῦ μέσλν. Est & alterum genus Chondrillæ, folium habens cir-

Tempus.

cumrosum, oblongum, humi sparsum: caulem succo madentem: radicem

Descrip-
tio.

paruam, vegetam, læuem, rotundam, flauescentem, succosam. Quam

Lib. 22.

ita Plinius transcripsit, Chondrillon, siue Chondrille, folia habet

c. 22.

Intubi circumrofis similia, caulem minus pedalem, succo madentem amaro, radice Fabæ simili, aliquando numerosa. Quorum delineatio-

nem nulli aptare possumus, quæ bulbosas habeat radices, atque ex vnico bulbulato plantam separatam efficere possit,

quæ etiam plures globulos habere possit, vt vult Plinius. Fo-

lia, etsi non sint strata in terra, vt in Cynoglossa, Plantagine,

& similibus, nulla alia habet, præterquam illa quæ ab radice

prodeunt, proximæque sunt terræ, quarum aliqua in terram

conuertuntur, quæ in terra iacere dicere possumus. Quare

nihil mihi videtur posse obstare, quominus Dioscoridis ge-

nuina censenda sit, præsertim cùm ex Plinij textus supplemen-

to clarior fiat, quem scimus ab ipso mutuatum multa tran-

scripsisse insalutato hospite. Hanc Lobellius marinam Chon-

drillam appellat, sed hîc rariùs in maritimis inuenitur, &

Perdicium Theophrasti, dubitatque an sit Dioscoridis Chon-

drilla

drilla; quare aliam describit Asphodeli radice, quam Matthiolus ignorans an & nobis oriretur, Constantinopolitanum Cichorium appellauit; quæ radicibus constat multiplicibus in mucronem desinentibus: Marcellum Virgilium virum doctissimum sequutus, qui ἐπακμον, non, *vegetam*, sed, in *mucronem desinentem*, vertit non animaduertens verbum ἐπακμον, ἀπὸ τοῦ ἐπακμάζειν deriuari, quod verbum, ἀπὸ τοῦ ἀκμάζω, & ὅτι conflatum est, quod, *vigeo*, & *adolesco*, interpretatur; atque *vegetam*, vel *adulescentem*, esse interpretandum vt omnes verterunt: atque etiam textum vult deprauare, vt non κοῦφω, *laeuem*, scilicet: sed κορυφῶ, quod verbum, non legitur in textu Græco aliquo, nec in Ruellij versione quam multis locis impressam habeo, sed κοῦφω & pro eo *laeuem*, scriptum inuenitur: quamuis in Volumine de Plantarum natura aliter dicat, sed ibi historiographus, non interpres est. Quod ipsi neque satisfaciens, in Plinium verba vertit, quem hallucinatum putat, non percipiens, neque cognoscens quam lectionem, quamue plantam recipere debeat: in Matthioli demum incidit Cichorium Constantinopolitanum, in eum etiam insurgens, sed & pudere debuit ipsum etiam, qui illius scrutator fit, & quæ ipse scribit non considerat, plantarum similium copia & lectionum conuolutus: illud tandem describit. Sed neque est, cum pluribus radicibus, non vnica propagetur, exceditque longè formam & magnitudinem vt ex Dioscoridis & Plinij textu liquet; neque aliquando, sed semper contra Dioscoridis & Plinij sententiam sit numerosa, atque multiplex; non vnica vt in planta à me proposita: quæ has vires habebit ex Dioscoride, *Vim concoquendi habent folia & caulis. Succus verò pilos in palpebris ag glutinat.* Myconius hanc strumofum Cichorium appellat, atque ad strumas curandas multum conferre se experimento didicisse asserit, quinque aut sex integræ cum melle sumptæ radices multis continuis diebus mirum in modum profunt. Eadem, stillatitia aqua earum, & decoctum præstat, sed inefficacius: item conditum ex ijs cum melle paratum admodum iuuat. Herbarij hîc fœmellis ad eliciendum lac vti sonchum vtilem vendunt; quæ illas parant ita; contundunt radices huius herbæ atque addito sampsucho ouis intermiscent, atque placentas ex his confectas edunt.

Vires.

Alisma

Aligot

Aligot



Alisma, siue Damassonium Dioscoridis.

Nomen

Etymon.



ALISMA, quæ Alcea dicitur, atque Damassoniū, à ui propulsandi venena Leporis marini, & Ranæ rubetæ, opīq. vt in Dioscoride legitur, nomina sunt. Lobellius verò Alismatis etymon esse ait à voce αλισμός, quod est maris allisio, atque iactatio, conueniréque Alismati, eo quòd in aquis degat. Sed si verum hoc esset, Halisma debebat scribere, nam α, spiritu aspero signatum est, ab Alismate alienum: atque verum esset si planta ab ipso proposita Alisma fuisset; sed certè longè satis est, nihilque Dioscoridis delineationi respondet, quamuis verba illius etiam peruertere voluerit, vt suæ plantæ responderent: & adhuc etiam multa desiderantur in illa planta, quæ apertè à

Descrip-
tio.

Dioscoride describuntur, & demonstrabo: ait enim Ἀλισμα, οἱ δὲ ἀλκέαν, οἱ δὲ δαμασάνιον καλοῦσι. φύλλα μὲν ἔχει ἀρνογλώσσω ὅμοια, στενότερα δὲ καὶ ἐπὶ γλῶ κλωμένα. καυλὸς δὲ λεπτός, ἀπλοῦς, ὑπὲρ πῆχυν ἔχων κεφάλια, θυρσοειδής. ἀνθὴ λεπτὰ, λευκὰ, ὑπαρχα. ρίζαι ὡς μέλανος ἐλλεβορίου

Lib. 3.

λεπτὰ, εὐώδεις, δριμύται, ὑπολίπαροι. ὑδρῆλὰ δὲ φιλεῖ χαρὰ. *Alisma*, quam alij *Alceam*, alij *Damassonium* appellant, folia habet similia *Arnogloss*, angustiora verò, atque in terram conuexa; caulem tenuem, simplicem, thyrsi specie, cubito altiore, capitula habentem: flores tenues, albos, subpallentes: radices vt nigri *Ellebori* tenues, bene olentes, acres, sub

Lib. 25.
c. 10.

pingues. *Aquosa* amat loca. Ex hoc textu *Plinius* in suos libros ita reposuit *Alismatis* Historiam. *Alisma*, quam alij *Damassoniū*, alij *Lyron* appellant. Folia ei *Plantaginis*, nisi angustiora essent, & magis laciniosa, conuexaque in terram, aliàs etiam venosa similiter: caule simplici, tenui, cubitali, capite thyrsi: radicibus densis, tenuibus vt *veratri* nigri, acris, odoratis, pinguibus. Nasquitur in aquis. Alterum genus eiusdem in syluis, nigrius, maioribus folijs, &c. Quorum delineationibus quantum respondeat planta à me proposita ex hac descriptione patebit. Radicem habet in summo crassam maiorem digitum æquantem, foris rufescentem, ex qua fibre pallentes dependent circum plures, carnosæ, tenues, non dissimiles *Elleboro*, odoratæ, atque gustu acres: folia emittit plura in gyrum in terram inclinantia, pallido colore, læuia, carnosa forma *Plantaginis* latifoliæ angustiore, sed nerui parum conspicui

Forma.

viden-

videntur; in superiore & latiore parte serra ta minutis, parvisque dentibus: quarum quæ proximiora sunt humo flaccida, atque languida sunt: caulem emittit, non è centro foliorum, sed ex radice latere, cubitalem atque maiorem, cum planta vetustior est, supra quem radiatim foliola exeunt latiuscula, quarum vnicum triplo maius est, vt in pictura visitur, basim conficiencia florum, qui inter ipsa velut umbella, aut corymbi dependent, ex albo lutescentes, parum odori, caui, tenues, in quinque partes in summo diuisi, ac si quinque foliolis essent constructi, floribus Primularum veris vulgò dictarum non dissimiles, calices ex quibus prodeunt, in imo habentes. Quibus siccatis fructus remanent rotundi, duri, apicem habentes; cortice molli in quinque etiam partes diuisa contexti, vt in Ocymoidum genere visitur: in quibus minutum semen, fuscū, angulosum, citrinæ Nigellæ simile continetur. Februario, & Martio mense floret, atque Aestate fructus perficit.

In montosis oritur, rupibusque, in quibus ex altiore parte montis defluit humiditas, atque vmbrosis locis frigidisque gaudet: in Palinuri rupibus humidis frequens. Hanc recentiores Vrsi auriculam appellant à forma, foliorum scilicet, quæ erumpunt, tunc enim auriculam imitantur: & Saniculam atque Paralyticam, propter insignes facultates, quas obtinet: atque propter florum præcocitatem inter Veris Primulas recensent; quibus congener est: quas Phlomidis, siue Verbasculos putarunt (sed à Verbasco longè absunt) quarum plures species à plantarum collectoribus depinguntur, à loco in quo nascuntur nomine discretæ; nam aliæ, vt hæc montanis locis, aliæ syluis, aliæ pratensibus gaudent: at omnes quidem vmbrosa humentiaque amant loca. His Fuchsius vir doctissimus, sub Verbasculorum nomine, aliud enim verius his inditum non erat, has vires tribuit.

Radicis decocto vesicae, reniumque obstructions solvuntur. Quod etsi à Dioscoride non memoretur, à Galeno tamen hæc de Alismate, siue Damassonio proferuntur. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, quod eius radix epotata dysenterias sanat, & aluum sistat, atque oedemata mitiget, sed nos ea quidem experti non sumus. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit, pota comminuat: id certè experti sumus. Ex quo liquet quod abstersoriam quandam facultatem obtinet. Sequitur Fuch-

*Tempus.
Locus.*

*Vires.
Lib. 6. de
semp. fa-
med. fa-
cult.*

sius. Ius herbae propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata, & luentia: quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt, si gustaueris, amara, & modicè acria sunt: ut hoc nomine, desiccandi, & detergendi facultatem habere nemo dubitet. Et mulieres formæ studentes succo è floribus illarum expresso faciem illinunt, quòd maculas, rugasque & alia eiusdem vitia mirificè detergeant.

Lib. 25.

cap. 10.

Ad enterocelas thoracisq; vulnera commendantur ex Matthiolo. Plinius verò ex Dioscoride transcripsit hæc tantum. *V*sus in radice utriusque aduersus ranas, & lepores marinos drachmæ pondere in vini potu. Quibus respondere videntur quæ de primulis congeneribus scribit Matthiolus: ait enim aquam stil-
latitiam ex florida planta exceptam vtilem esse in potu, languoribus cordis, & totius corporis: nam, ut periclitatores aiunt, mirum in modum auxiliatur, roburque addit cordi. Flores impositi scorpionum, & venenosarum araneorum ictibus subueniunt: atque folia, flores, radixue, aut tota planta imposita, luem pestiferam atque vulnera sanat. Dioscorides verò ait Radix drachmæ vnius aut duarum pondere pota cum vino commoda est his qui leporem marinum vorarunt, & quos rana rubeta momordit, & qui opium hauerunt. Torminibus, atque dysenteria per se, aut cum pari modo seminis Dauci, potui datur. Conuulsis, & ad vteri affectiones prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, atque tumores illita mitigat. Item

Lib. 26.

cap. 5.

Plinius de plantis ad strumas vtilibus verba faciens ait, Damassonium quæ & Alcea vocatur, sub solstitio collecta, imponitur ex aqua cœlesti, folium tritum, vel radix cum axungia tusa, ita ut imposita folio suo operiatur. Sic & ad omnes ceruicis dolores, tumoresque quacunque in parte. Ex his quidem colligitur, & facie, viribusque plantam à me propositam Dioscoridis esse Alisma, siue Damassonium, omnibus respondentibus notis; quas longè abesse ab alijs Damassonijs siue Alismatibus putatis, quisque ex his iudicabit; radice quidem, folijsue aut ferraturis, caule, odore, atque sapore, viribusque minimè respondentibus quæque planta ab iisdem proposita eget, quæ hîc repetere prolixum foret. Est & alterum genus Alismatis à Plinio memoratum, de quo in sequentibus dicam.

Alisma sylvaticum & pratense



Alismatis siue Damassoniæ genus alterum Plinij.

Descrip-
tio.

Lib. 25.

c. 10.



Forma.

Tempus.

Vires.

N descriptione Alismatis siue Damassoniæ ex Dioscoride transcripta, Plinius addit hæc verba. *Alterum genus eiusdem in sylvis, nigrius, maioribus folijs: & infra primam Alismatis descriptionē, hæc verba intermiscet: alias etiam venosa similiter.* Ex quibus verbis innotescit, quas depictas affero plantas, & eiusdem generis, secundum esse Alismatis genus Plinij. Radicem enim omnes habent Ellebori modo fibrosam, pinguem, tenuem, odoratam, & acrem, ex qua folia in gyrum humum operiunt parum ab ea elata, lactucaceis proxima, inferiore parte hirsuta, venosa, siue nervosa multum, quamobrem crispa visuntur, per ambitum leniter sinuata, colore viridiore, saturiore primo Alismate depicto, quare Plinius nigrum genus appellavit, & rectè. Harum prima depicta non thyrsi specie caulem, & supra eum capitula, sed plures cauliculos nudos, atque hirsutos promit, in quorum summo singuli flores ex calice prodeuntes insunt, ex albo lutei, odoratique, quibus siccis vascula remanent semina habentia parva, subrotunda, fusca, quæ Maio perficiuntur. Secunda verò, caulem, atque flores, Alismatis primi generis modo emittit, etiam concolores. Omnes primo Vere florem edunt, indeque Veris Primulas, recentiores appellarunt, alias verò syluaticas, omnibusque easdem vires tribuere, eorundem experimento cōprobatas. Quod animadvertens Plinius dixit, *Alterum genus eiusdem in sylvis nigrius, maioribus folijs: Vfus in radice utriusque aduersus ranas, & lepores marinos, drachmæ pondere in vini potu.* Quibus subscribenda sunt quæ supra in descriptione primi Alismatis generis reposui: nam & recētiore, sicut antiqui omnibus easdem vires tribuere. Harum alias congeneres in plantarum collectoribus sub Primulæ, Saniculæ, Vrsi auriculæ, & Paralyticæ nomine videre poteris, quas omnes sub Alismatis & Damassoniæ nomine comprehendes: atque alias montanas, quæ in montibus oriuntur, alias syluaticas, alias postremò pratenses, non Primulas, sed Alismatis nomine insignitas plantas, appellabis.

Acinos Dioscoridis.

κινος dicta fuit planta hæc ab, *α*, litera, quæ Nomen
nota est priuatiua, & verbum *κινέω*, quod si- Etymon.
gnificat, mollio, moueo, incito, cieo; vnde *κι-
νεί κοιλίαν καὶ ἐμμῖνα*, dicitur apud Dioscoridē, Lib. 2. c.
ciet aluum & menses: hæc autem, quia con- de Bras-
trariam habet facultatem, scilicet quod men- sica.

tia, ideo *ακινος* dicitur, quia *ακινεῖ*, vel *ἵσσει κοιλίαν, καὶ ἐμμῖνα πι-
νομένη*, quam ita descripsit Dioscorides, *Ακινος, ἢ ἀκονος*, Lib. 3.
*πῶς ἔστι λεπτόκαρπος, σεφαιωματική, παραπλησία ὀνίμφῳ, δασυτέρα δὲ,
καὶ ευώδης: παρ' ἐνίοις δὲ καὶ κηπύεται*. *Acinos*, aut *Aconos* herba est Descrip-
tenuibus surculis, coronaria, admodum similis ocimo; hirsutior verò, atque tio.
bene olens, apud aliquos in hortis plantatur. Plinius verò de varijs
oleribus verba faciens subiungit: *Acinos, quam Epipetron vocant*, Lib. 21.
quæ nunquam floret. Ex quo textu multi opinati sunt eandem c. 15.
esse cum Epimetro Theophrasti à vocis similitudine, quod ab-
que dubio est; rationem affero, quia Plinius illa, inter quæ de
hoc Acino mentionem facit, ex Theophrasti capite octauo li-
bri septimi exarauit: atque ex rebus de quibus ibi agit, si cum
Theophrasti loco citato expendantur, perspicuū erit: vbi eius
verba hæc sunt: *ἐνια δὲ καὶ ὅλας ἀνανδῶν, καδάπερ καὶ τὸ ἐπίμετρον*.

Aliqua verò omnino flore carent, sicut Epimetron. Quod etiam Lib. 7.
indicio fuit, vt etiam idem esset cum Epimedio Dioscoridis, c. 8.
cū neque Epimedium florere dicat vnquam: idēque esse
Epimedium Dioscoridis & Epimetron Theophrasti, à vocis
quadam, & historiæ similitudine, atque Epimetron Plinij, qui &
Acinos dici tradit; quo loco reponendum putarem, pro *Ac-
inos, Erineos*, potius: quod nomen in diuersis illis Epimedij Dio-
scoridis nomenclaturis, inuenitur: cū Plinij mos sit, diuersa
ex varijs transcribere, atque hīc Theophrasti caput 8. libri 7.
alibi verò Dioscoridis Epimedium præ manibus habebat, im- Lib. 27.
memor Epimetri iam descripti: non enim semper potuit succi- c. 9.
fiuis horis, nocturnisque hæc expendere, lucēque videre, at-
que nobis ostendere. Quibus conuolutus Pena: putauit *ακινος*
per v, scribi oportere, quod sterilem signat, atque infœcundam
plantam;

Lib. 21.
c. 27.

plantam: & in Matthiolum insurgit, vt solet, trabem etiam suam minimè videns: sed de his hætenus. Non est Acinos, quã Epipetron vocant, Acinos Dioscoridis, nam idem Plinius de eo loquens ait, *Acinon, & coronarum causa, & ciborum Aegyptij serunt: eadẽque erat quæ Ocimum, nisi hirsutior ramis ac folijs esset, & admodum odorata.* Ex quibus verbis clarè liquet Acinon cibo aptã esse, atque vtilem, cùm eo seratur: quod contra est in Epipetro, vel Epimedio: secundò Epimedium, vel Epipetron, aut Epimetron ab omnibus flore carere dicitur, quod contra esse in Acino Plinius his verbis demonstrat, *Eadẽque erat quæ Ocimum, nisi hirsutior, &c.* Sed Ocimum non caret flore, ergo & Acinon flores habere est necesse, cùm nihil ab Ocimo differre debeat, nisi hirsutie tantum, qua etiam nota à Dioscoride ab Ocimo distinguitur, cùm *ὀκίμω παραπλησία* scribat, quæ verba & sententiam hanc, & Plinij descriptionem confirmant, cùm illa præpositio *παρὰ* addat *πλησία*, in compositione verò vel nomini vel verbo adiuncta, proprietatem illius adiuuat, tam si rectum, quàm si iniquum significet, vt in linguæ Græcæ obseruationibus licet videre: & sic flores habere oportet vt Ocimum, cùm ab eo hirsutie tantum differat. Quod argumentum ab alijs hucusque non est animaduersum, atque mihi sufficere videtur, vt flores Acinon habere, probare possit, præter illud quod alij dixere, quod coronaria cùm sit, flores habere est verisimile, sed quidem non necesse. Quare plantam hanc pro veriore Acino afferò, quam quotannis olitores Verno tempore serunt, illamque *Vrtichella*, hîc appellant, eò quòd *Vrticæ* hirsutiem quodammodo referat; hirsuta quidem est, atque asperiuscula caule, & folijs Ocimo similibus, tenuioribus, oblongioribusque per ambitum ferratis Mercurialis modo, flore æstate etiam Ocimo simili, paruo, purpurascens: diceres nisi aliud Ocimum agnosceres, genuinum esse Dioscoridis: folia enim habet Mercuriali similia, quæ Ocimi folia habere ait Dioscorides: cui nulla alia planta à Dioscoride descripta folijs Ocimo similibus, ita Ocimo, folijs, atque positu, colore, læuitate, & caule est Mercuriale similior: hæc autem ab illis differt tenuitate caulis, quod Dioscorides requirit, illiusque & foliorum hirsutie, quæ Ocimo & Mercuriali desunt. Odore est fragrantissima ad Caryophyllos aromaticos accedente: & si tantum illam tangis,



Vires .

tangis, remittit odorem, et si deinde manum naribus admouebis, iucundissimo odore nares ferientur. Quare admodum est odorata, & boni odoris, atque tam Ocimo similis est facie, vt non dubium sit Ocimi speciem esse, cum hirsutiae tantum atque caulis tenuitate differat. Acini mentionem Galenus omisit: Paulus verò Dioscoridi se subscribens ita ait. *Acinos Ocimo similis, mediocriter adstringendi vires habet, quod clarè ex gustu mandendo percipies, ideòque aluum & menses pota sistit: imposita verò panos, & erysipelata curat.* In Plinij textu contrarias vires reperiri, sed non dubito quin error sit correctoris putantis calidas vires, aperientesque habere, atque sicut Ocimum vrinae difficultati succurrit Dioscoridis sententia, ita & hanc Ocimi speciem, & vrinas, & menses ciere posse: ideòque *Ciet menses, & vrinas*, scripsit. Quod etsi probari possit, utraque vires Acinon habere posse, vt ab aliquibus factum est: tamen potius duobus textibus credendum cenfeo, quam vni contrarij rationem non reddenti. Non est Acinos Dioscoridis, quae à diuersis ponuntur, multum enim ab Acini historia absunt, qua de causa alter, alterius putatum Acinon refellit, suae subridens opinioni: sed nulla Ocimi folia habere perspicitur, neque cum Ocimo similitudinem illam refert, qua eadem dici posset, nisi hirsutior esset, vt Plinius ait ex mente Dioscoridis. Quare Plantarum auctor nesciens quam reciperet, inodoram illam, aut potius foetidam plantam, vbique viarum infestissimam, cum admodum odorata esse debeat, pro vero Acino appingere maluit, Lobelij, Penaeque poenam formidans: quam & ipsemet Clinopodium sylvestre appellat, quam ex Ocimis hirsutam plantam, ab ipso depictam Fuchsj medijs Ocimi nomine considerare, an Ocimum hirsutum esset, & Acini nomine dignum, sed tantam iconum multitudinem, nedum plantas considerare haud poterat.



Alyssum

Alyssum Dioscoridis.

λυσσον dicta fuit planta hæc, *ἡ τοῦ λυσσαίνου*, quod est, rabire, & α, particula priuatiua, eo quod rabie priuat, vt Dioscorides de hac loquens, ait, *δοκεῖ δὲ καὶ λυσσάν κυνὸς ἰαθεῖν*, & Plinius, *Nomen accepit, quod à cane cōmorsos rabiem sentire non patitur.* Herbulæ est parua furculosa, radicē habens exiguā, albidā, tenuibus capillamentis

Nomen

Etymon.

Lib. 3.

Lib. 24.

c. 11.

Forma.

diuisam, folia bina humi strata, rotunda, parua admodū, carnosæ, hirsuta, atque asperiuscula, per ambitū paruis, rotundisque incisuris ferrata: caulem edit aliquando vnicum, [& non minus inuenies vnicaulem plantam, quā ramis præditam] rectum, rotundum, hirsutum sine alis, virgellam referentem, pedem, vel sesquipedem altitudine vel longitudine æquantem: aliquando multas alas, ex singulis foliolis imis, atque etiam ex alijs superioribus cauli absque petiolo ex aduerso etiam hærentibus, maioribus illis, quæ humi sternuntur, ex interuallo dispositis, exorientes: quæ sicut & caulis, è medio ad summum vsque, flores paulatim edunt cæruleos, paruos, Anagallidi aquaticæ pares, atque concolores, furculis, & folijs tunc alternatim dispositis, minoribus, oblongioribus, minúsque incis, interceptos: quibus decidentibus, in illorum locum fructus hirsuti succedunt foliacei compressi cordis prima facie quodammodo latiore formam æmulantes, *δισκοειδής*, vt Thlaspi fructus, duplici membranula constructi, duplicis clypei ovalis, vel rotundi, alterius alteri hærentis iconem exprimentes: dupliciter ex vtraque facie extuberant, ac si duorum clypeorum alter alterius lateri coniunctus esset: atque ita intelligendum est, non vt alij perperam, alterum alteri incumbentem clypeum considerarunt: nam si ita esset omnes plantæ hoc exprimerent, etiam quæ foliaceum semen habent; sed Dioscorides, vt dixi, plantam hanc ab alijs hoc secreuit, vt fructus eiusdem, quælibet scilicet membranula, duplicis clypei, latere alterius alteri hærente, iconem repræsentarent; quam descriptionem hæc tantum planta & congeneres referunt. Hos quatuor foliola circundant, vt in Anagallide visitur; intus semina parua,



oualia compressa, flauescencia continent, quæ veluti dorsum in medio magis eleuatum habent, ideo Dioscoridés, ὑπόπλατυ πῶμα dixit, quibus perfectis folliculi aperiuntur, seménque decedit. Tota planta gustu amaricat. Aprili mense florere incipit: Maio perficit fructus. In editis locis & sole illustratis, saxosis, non cultis, parietibúsque hîc oritur, & etiam vallibus, pratensibúsque, sed non ita frequens. Totam videtur explere Dioscoridis historiam, qui ait. Ἀλυσσον φρυγανίον ὅστις ὑπόπλατυ φύλλα ἔχον στρογγύλαι: παρ' οἷς ὁ καρπὸς ὡς ἀπιδίσκια διάδιπλα, ἐν οἷς τὸ πῶμα ὑπόπλατυ. φύεται ἐν ὄρεινοῖς καὶ τραχέσι τόποις. *Alysson virgultulum est, in aliquibus legitur, vnicante, subasperum, folia habens rotunda, iuxta quæ fructus velut duplices clypeoli, in quibus semen subcompressum: oritur in montibus, & asperis locis.* Dinerfam ab hac plantam descripsit Plinius his verbis post Erythrodani descriptionem subiungens: *Distat ab eo, qui Alysson vocatur folijs tantum, & ramis minoribus.* Ex quibus patet similem fecisse Rubiæ: & sic alia planta diuersa est ab ea, quam Dioscorides descripsit folijs rotundis, quæ non potest cum Rubia aliquam habere similitudinem, cum plura folia caulem cingere deberent, vt Rubiæ similis esset; sed contra est, atque hoc confirmat diuersa illa nomenclatura Dioscoridi apposita, ἀπλόφυλλον, quod verbum, simplici folio plantam designat: vt scilicet simplex folium caulis lateri hæreat, nō plura simul ex eadē parte, vt in Rubia, quæ terna vtrinque ex opposito habet hærentia: quod nomen à Rubia longè alienum est, & planta à me proposita referre videtur, præsertim ex medio ad summum, in quo clypeoli insunt, à quibus ἀπιδίων, nomen fuit huic impositum, ob eorum similitudinem & frequentiam. Quare Plinius, vel aliam descripsit plantam, vel in transcribendo, Dioscoridis textus caput antecedens proximum Alyssō, Aparines scilicet, alterum pro altero exarauit, cum Aparinen folijs tantum, & caule minoribus esse, atque in eo ab Erythrodano differre omnes sciant. Neoterici verò diuersas pro Alyssō Dioscoridis depinxere plantas, quarum nec aliqua respondere videtur, cum vel folijs sit longis, læuibus, vel etiam hirsutis, nec rotundis, non φρυγανώδης, nec folliculos caule, & folijs interceptos, sed in spicam in summo dispositos habeat, contra Dioscoridis sententiam, qui descripsit vt folliculi hærent folijs, ibi παρ' οἷς ὁ καρπός, &c. vt etiam in alijs plantis quæ fructū caule,

Tempus.
Locus.

Descrip-
tio.

Lib. 24.
C. II.

Varieta-
tes.
Vires.

caule, & folijs interceptum habent, vt Lithospermon, & Polygonon, & similes. Nec alio modo habere possunt, si Dioscoridis textui respondere debent, quod, alij quia ab ipsis depicta planta non referebat, non sine errore pertransierunt, aut non animaduerterunt. Hanc pro Veronicæ specie, vt ab alijs dicebatur, minore primùm afferebam ab alijs non depictam, vel minus rectè expressam si depinxerunt, alijs non dissimilem, nisi quia folijs sit rotundioribus per ambitum rotundis crenis diuisis, hirsutioribus crassisque & caule aliquādo recto, vel supino: flore verò, fructibusque non disparibus, item sapore viribusque. Quare alias Veronicas iam receptas humicaules, & supinas Alyssi varietati adscribendas putarem: Multis quidē viribus pollent, vt recentiorum experimento constat. *Ad cruenta, scilicet, & vetera vlcera, & vulnera sananda mirificè conferunt. Scabiei, & omnibus cutis vitij medentur. Tumores discutiunt potissimùm in ceruice: contra tussim, & vitia pectoris, pulmonisque datur stillatitia aqua potanda: Iocinoris, & lienis obstructions aperiunt: vterum, renes, & vesicam expurgant. Ad febres, contagiososque morbos, trium drachmarum puluis siccarum, epota cum Theriaca drachma ex vino commendatur, si verò statim operiantur, vt sudent ægri. Dioscorides verò ait, Huius decoctum potum singultus qui sine febre sunt soluit. Idem facit detentum, aut naribus admotum. At cum melle tritum lentigines & maculas solares depurgat. Videtur & Canis rabiem sanare, cum cibo contusum & exhibitum. Sed & in domo appensum salutare esse dicitur, tum hominibus, tum alijs animalibus, ne à fascino ledantur. Quin & puniceo panniculo alligatum pecorum morbos abigit. Galenus verò scripsit, Nuncupata est hæc herba Alysson, quòd mirificè inuuet morsos à cane rabido. Sed & rabienti quoque data sepe in totum sanauit: atque hoc ex totius substantiæ similitudine efficit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola percipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experietur, cognoscet facultatem habere siccificam, & digerentem, cum hoc vt absterforium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione vitiliginem & maculas faciei à sole procreatas expurgat. Quæ vires si conferantur cum superioribus à recentioribus descriptis, præter facultatem sanandi rabiem, quam nescierunt, eadem esse videbuntur, nam digerere, excutere, siccare, abstergeréque conspicitur, atque Alexipharmacum esse. Ex quibus rectè poterit censerì plantam hanc Dioscoridis Alyssum facie, & viribus referre.*

Lib. 6. de
simpl.
med. fa-
cult.

Piu-

Plutarchus verò celebrauit Alyssum plantam, numerauitque inter eas quæ solo contactu, halitûe, aut aspectu prodesse homini possunt: non tamen contra rabidi canis maleficium, sed contra singultum. Verba eius sunt. τὴν δὲ ἄλυσον καλουμένην βοτάνην καὶ λαβόντες εἰς τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσβλέψαντες ἀπαλλάττονται λυγμοῦ. λέγεται δὲ καὶ ποιμνίοις ἀγαθὴ, καὶ αἱ πολλοὶς παραφυτοδομήν ταις μάνδραις. Quin etiam herbam Alysson vocatam, alij in manus accipientes tantum, alij autem conspicientes, à singultu liberantur. dicunt eandem ouillo & caprino pecori salutarem esse prope mandras plantatam. quare ἄλυσον dici oporteret, nam λύζειν, singultire significat: indeque nomen λύξ, & λυγμός, singultus vertitur, deriuatur.

Sympos.
lib. 3. q. 1.

*Alysson Antonij Coi. Sideritis heraclea
Dioscoridis.*



L I A M Alyssi nomine plantam describit Antonius Cous, vt Galenus refert, his verbis.

Lib. 2.

Ἀλυσος δὲ ἐστὶ βοτάνη τῆς πρᾶσις παρεμφέρουσα, τραχυτέρα δὲ καὶ μαῖλλον ἀκαθάρτης περὶ τὰ σφαίρια, ἄνθος δὲ φέρει κυανίζον. Alysson Marrubio similis herba, aspe-

c. 11. de
Antido-
tis.

rior tamen, & magis spinosa circa orbiculos: flore ad ceruleum vergente. Quem sequutus Aëtius ita scripsit, Alysson, aiunt esse Sideritidem heracleam appellatam, quæ iuxta vias nascitur vbique, purpureum florem habens, & folia crassiora, ita Latini codices habent, sed ego puto pro, folia crassiora, in græco textu esse scriptum, φύλλα παχύτερα, quo loco reponi debet, φύλλα τραχέα, folia aspera, hirsuta scilicet, nam illud comparatiuum παχύτερα, non refertur ad vllum positium, atque in textu Sideritidis Dioscoridis τραχέα, etiam legitur, hoc animaduertit etiam Gesnerus. Quam descriptionem si cum Dioscoridis delineatione Sideritidis heracleæ conferas, eandem esse censebis: in qua Dioscorides diligentior videtur in foliorum descriptione; nam postquam Marrubio similia esse dixit vt exactius illorum exprimeret formā, oblongiora esse dixit, minoraque ad Saluæ foliorum formam, aut Quercus accedentia, nam & Marrubio longiora data portione sunt. eius verba sunt hæc. Σιδηρίτις, οἱ δὲ ἡράκλειαν, πῶς ἔστι φύλλα ἔχουσα ὅμοια πρᾶσι, ἐπιμηκέστερα δὲ πρὸς τὰ τοῦ ἐλελισθαίου δρυός,

Descrip-
tio.

Tetra-
bibl. 1.

ser. 1. c.
de Alyf-
so.

Lib. 4.

δρυός, μικρότερα μὲν τοι καὶ τραχέα. καυλοὺς, δὲ ἀνίσσι τετραγώνους, σπιθαμιαίους, ἢ καὶ μείζονας, οὐκ ἀνδεῖς ἐν τῇ γλίσσει, καὶ ποσῶς ὑποσφοντάς: ἐν οἷς ἐκ διασημάτων ἀνδύλοι περιφερεῖς ὥσπερ παρσίου, καὶ ἐν αὐτοῖς σπέρμα μέλαν. φύεται δὲ ἐν ὑποπέτραις χωρίοις. Sideritis, quam aliqui heracleam appellant; herba est folia habens similia Marrubio, longiora verò, ad Saluix, aut Quercus folia accedentia, minora quidem & aspera. Caules edis quadratos, pedales, & maiores non iniucundi gustus, aliquantumque subfringentis, in quibus ex intervallo verticuli sunt rotundi, ut in Marrubio, in quibus semen nigrum. Oritur in subpetrosis locis. Et sic Antonius Cous cum dicat Alysson Marrubio esse simile, atque etiā Dioscorides Sideritidem, Aëtius verò esse quam Sideritidem heracleam appellant: ijdem eandem plantam diuersis verbis atque nominibus descripsisse videntur: nam delineatio vnius duabus reliquis respondere videtur, quamcunque aptare velis: non solum forma, sed natali loco, & viribus. Quidam obijciunt Aëtium per modum loquendi dixisse, Alysson esse appellatam Sideritidem heracleam, sed certè ibi loco affirmantis est, verbum illud, aiunt; quod confirmo ex eiusdem Aëtij textu, ubi de remedijs commorsos à rabido cane curantibus loquitur, ubi ait. Danda est quotidie Hiera non ad purgationem, sed tanquam auxiliare medicamentum, nucis Auellanae magnitudine, cum cyatho decocti Saluix, aut herbae Sideritidis, quam heracleam appellant. Quidam etiam sola ipsa vtuntur, & multum prodesse dicunt, & propterea etiam Alysson, eo quod rabiem eximat, ipsam nominant. Quod confirmat Paulus Aegineta verbis ferè ijsdem. καθαίρειν δ' εἴ τὸν διὰ τῆς συκωνίας διδόντα κατ' ἡμέραν τοῦ φαρμάκου μετὰ ἀφελήματος ἐλεισφάκου, ἢ τῆς σιδηρίτιδος τῆς ἡρακλείας, ἣν καὶ ἄλυσσον καλοῦσιν τινες. Purgare expedit medicamento ex cucurbita sylvestri, ita ut quotidie id exhibeas cum decocto Saluix, aut Sideritidis heracleæ quam aliqui Alysson vocant. Ex quibus omnis dubitandi ratio infirma remanet: eadèque est censenda Sideritis heraclea Dioscoridis, & Alysson Antonij Coi, & sequentiū. Miror etiam Matthiolum dicere, se ignorare de qua heraclea Sideritide Aëtius verba faciat, cum duæ dicantur heracleæ, prima scilicet, & tertia: neque animaduertit, Dioscoridem, primam heracleam Sideritidem communi appellatione ita denominatam afferre: tertiam verò à Crateua tantum ita appellatam referre: atque primam in petrosis, & fecus vias oriri, tertiam verò in vineis locisque humidis, vmbrosisque atque à
prima

Tetra-
bibl. 2.
ser. 2.
c. 24.

Lib. 5.
c. 23.

Σιδυρίτις
Αλυσαν.

Sideritis
Alysan.



Locus.
Tempus.

Forma.

Vires.

Lib. 8. de
simpl.
med. fa-
cult.

prima differre folijs & floribus, vt à Dioscoride traditur, & infra dicam suo loco; primam verò folijs ad Marrubium, atque etiam floribus, totaque forma, sed minore accedere, vt ex sequenti historia & icone patebit: eodémque tempore Dioscoridis Sideritidem heracleam, & Antonij Coi Alysson ex Galeo habebis. Planta hæc oritur hîc circa lata's vias vallium petrosas, aridas, vbi parum terræ supra petras inest. Autumno exit, atque Vere caulem edere incipit, duratque ad Aestatem. Radicem habet paruum, lignosam, fibris diuisam, ex qua folia emittit Marrubij forma, longiore tamen vt Dioscorides ait ad Saluiam, proportionem data, longitudinem accedentia, satis Chamædryo similia, parum maiora quæ prima exoriuntur ante caulem: hirsutæ aspera, incana, atque per ambitum incisa, sed non tam profundè vt in Chamædryo: sed Betonicæ modo, quæ etiam Quercus folia habere ait Dioscorides: caules plures exeunt, quadrati, pedales inueni sponte; sed cultu parum maiores efficiuntur, parum repentes, ac veluti supini eriguntur, qui cum tribus digitis è terra eminent, flores habere conspiciuntur singulis geniculis verticillatos, vt in Marrubio, ex albo ad purpuræ rubeum vergentes: qui, caules geniculis circum hærentes ex interuallo ornant: siccatis verò & decisis, remanent infundibula quibus continebantur, in quinque acutas, duras, pungentisque eminentes diuisuras desinentia, ita vt nisi quis hoc animaduertat, ab aculeis illis feriri sentiat, si decerpere tentauerit: folia geniculis hærentia minora, oblongioraque sunt primis. semen intus continent verticuli, fuscum, Iunioque mense perficitur. Gustu adstringere sentitur, non iniucundo palato, aliquid amaroris & odoris habens. Ex his igitur constat plantam hanc & Sideritidem Dioscoridis, & Alysson referre Antonij Coi, cum natalibus, forma, viribusque conuenire videatur. Dioscorides sub Sideritidis nomine has vires huic tribuit. Illita folia suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt. Galenus verò, Sideritis habet quidem etiam abstergendæ quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & modicoriter frigida: pauca verò inest adstrictio: quare phlegmonem sedat, & glutinat. Quæ vires si rectè expendantur cum superioribus, alteri Alysson tributis, quas easdem Aëtius & Paulus huic tribuunt, similes esse videbuntur, atque inter se secundum magis & minus

& minus differre patebit. Modum verò vtendi hac ad Canis rabidi morsum ita Galenus ex mente Antonij Coi describit.

Alysson herbam contusam, & cribratam reponere. Huius cum opus fuerit, Lib. 2. de Antidot. à cane rabido morsus cochlear exhibebis ex aquæ & mulsæ cyathis tribus, statim à primo die vsque ad quadraginta: sin minus, saltem primis septem diebus. Hanc inter Caniculæ æstus colligere oportet; exiccataque & cribrata seruanda est, vt expirare non possit. Aëtius vim purgantem habere tradit ab alijs minimè cognitâ, si puluis Alyssi huius VI. Tetra- bibl. 1. ser. 3. c. 31

scrup. pondere cum aceto, modico sale, ex aqua potui inspersa bibatur. Nō est Alysson Galeni, Antonij Coi scilicet, planta illa Hispanica Marrubio similis, si nō est Sideritis heraclea, vt Paulus & Aëtius volunt: nec obstat dicere Galenum diuersis locis de Alyssō, & Sideritide verba facere, nā nihil ob stare videtur, cū historiam Alyssi in lib. 2. de Antidotis, non ex mente sua, sed ab Antonio Coo descriptâ afferat, atque eo loco relatoris vicem non scriptoris gerere videtur: ibi & aliorum veterum etiam, remedia, antidota, & similia refert: & sic non est dubitandum de hac mea sententia, cū à duobus antiquis doctissimis medicis Paulo Aegineta, & Aëtio comprobetur.

Pycnocomon Dioscoridis.



YCNOCOMON dicta est planta hæc τοῦ Πυκνός, & κομών, à comarum scilicet densitate, plures enim comas edit; vel quia, coma ipsa florum pluritate densa apparet. Huius notas Dioscorides sic depinxit. Πυκνόκομον Lib. 4. Etymon.

φυλλα ἔχει ὅμοια ἐν ζώμῳ, παχέα δὲ, καὶ παχέα, καὶ δριμύτερα: καυλὸν τετραγώνον: ἀνδρὸς δὲ τὸ τοῦ ἀνθρώπου τιό.

ἑμφερές. καρπὸν δὲ ὡς τῶσόν. ῥίζαν μέλαιναν, σπογγύλῳ, ὠρεῶν, ὡς μικρὸν μήλον, γεώδες ὄζουσαν, φύεται ἐν πετρώδεσι τόποις. Pycnocomon folia habet similia Eruca, aspera verò, crassa, & acriora: caulem quadratum: florem Ocimi flori similem: fructum verò vt Porri: radicem nigram, rotundam, pallidam, vt paruum malū, terram olentem: inuenitur in saxosis locis. Rlinius ita habet. Solut & Pycnocomon Eruca folijs crassioribus, & rarioribus: radice rotunda, lutei coloris, terrā redolente, caule quadrangulo, modico, tenui, flore Ocimi. Quibus notis congruere videtur plan- Lib. 26. c. 8. Forma.

ta à me propofita, quæ radicem habet carnofam, obliquè geniculatam, veluti rotunda Aristolochia, extuberantè, luteam; in craffas atque plures fibras obliquè fe circum diuidentem vetuftioris Phu à me defcripti radici fimilem. terram redolentem, gultu amaro, atque acri linguam mordente: caulè emit tit tenuem, purpurafcentem, ab radice ad fummum vfque alis vndique diuifum, ramifque refertum, pedè, fefquipedem tres, quatuorue altum: folijs, fingulis geniculis ex aduerfo hærentibus fuperna parte hirsutis, craffis, duris, per ambitum diuifuris Erucæ fylueftri fimilibus, incifis: altiùs quam in pictura vifitur: verùm antequam caulem edat Plantaginis mediæ magnitudine, nullis, vel raris ferraturis diuifis, quod etiam in Eruca fylueftri obferuatur, nò femper folia habente incifa præfertim in imo, quæ Plantaginis anguftifoliæ formam repræfentant: acri, amaróque gultu: folia ita geniculis caulis, alarúmque hærent, vt quatuor facies cauli alifque tribuant, non diffimilibus cauli Ocimi, Mercurialis, atque Ebuli, quod quadratum caulem in fuo fuperiore capite habere tradidit Diofcorides, & tamen caulis non quatuor habet angulos, fed folia geniculis ex oppofito hærentia alternatim, illos cauli conftituunt. In fingulorum verò caulis, ramorúmque fupmo, earúmque alis, terna exeunt longo petiolo capita colore purpurocerulea nò diffimilia illis Trifolij Bituminofi, vel Scabiofæ vulgò appellatæ, pluribus circumdata floribus, fed finguli flores Ocimi flores imitantur forma: quibus decidentibus fructus in illorum locum femina continentes oblonga remanent, eodè modo quo Scabiofæ vulgaris minoris, in capitibus parum oblongis: quorum forma & fimilitudine Diofcorides ait fructum edere vt

- Lib. 2. c.* Porrum, caput fcilicet edere vt Porrum, cuius fummum caput de porro. comam idem Diofcorides appellauit, ibi *ἡ δὲ κόμη αὐτοῦ*, &c. &
Lib. 4. c. Pſyllij etiam ibi, *ἄρχεται δ' αὐτοῦ ἡ κόμη ἀπὸ μέσου τοῦ ναυλοῦ, κεφάλια δὲ δύο ἢ τρία ἐπ' ἄκρου συνεσπλεγμένα*, &c. Incipit ipſius coma à medio caule; capitula verò duo, vel tria in fupmo contracta. & etiam alijs locis. Sed quia plura capitula habet, & fic comas, Pycnocomon appellauit. Quod autem Pycnocomon capitula habeat, teftis
Lib. 26. c. 12. eft mihi Plinius qui ait, *Paſſim & in quacunq; parte, ac maximo incommodo, naſcuntur qui furunculi vocantur, mortiferum aliquando malum conſectis corporibus. Remedio ſunt Pycnocomi folia trita cum polen-*

Πικνίδιον

Picnacomon



ta, si nondum caput fecerint. Ex quibus iam clarè liquet, Pycnocomon caput habere, atque Porri modo fructum edere, atque ita vetustiores codices, quos habere testatur Marcellus Virgilius, καρπὸν ὡς πορρέου, Porri, scilicet, non πορρέου, Marrubij, vt alij legunt, scriptum habent: à Dioscoridis instituto abhorrens, qui Marrubio verticulos tribuit & plantis illi similibus.

Tempus. Augusto mense incipit florere. Septembri verò semina perficit. Huius mihi Ferdinandus Imperatus ex fictilibus vasis in quibus alebat plures, auulsæ copiam fecit. Spontè ortam non vidi, quam magis etiam laciniatam esse accepi, atque minorè,

Locus. nam cultu caret: Fuchsius ait nasci locis incultis montanis, saltibus, ac interdum pratis etiā, & dumetis, atque subnigras habere radices: quam, cū antiquum nomen ignoraretur, recentiores *Diaboli morsum*, vel *Succisam* appellarunt; quia tuberosum illud, à quo fibræ deducuntur, quasi præmorsum, corrosūque visitur, sed non omnibus, nisi vetustioribus aliquando; quod cū in alijs plantis euenire animaduertisset Pena, mauult, & rectè, ita dici ab vrente vi, qua bubones, & pestilentes carbunculos mordicat, quibus magno leuamēto admoventur folia, atque in hoc acriorem esse *Eruca* folijs, cognoscitur expressè. Fuchsius calidam, & siccam admodum esse testatur, cū supra modum amara sit, atque acris. quare ait, Præsentaneo remedio ad maturandos, atque adeò sanandos carbunculos adhibetur, si herba viridis trita imponatur, aut vinum, in quo decocta fuerit, bibatur. Radix per se estur, aut vinum eius decoctū in vuluæ doloribus bibitur. Hæc manuscriptum herbarium habere testatur. Atque hodie, inquit, cū habeat discutiendi facultatem, & incidenti, vtuntur ad dissoluendos sanguinis grumios. Galenus ait,

Vires. Pycnocomi radix, fructus, folia, omnia digerendi, attrahendique habent de simp. facultatem, vt pote quæ & gustu sunt acria: folia itaque tumores, & furunculos discutiunt: fructus valentior est: & hæc quidem efficere potest mixtus alicui digerentium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex farina hordeacea conficitur: palos, & alia id genus infixæ ad extimam cutem elicit. Porro radix ad supradicta quidem deterior est, & infirmior, ceterum bilem flauam expurgat. Quibus se subscribit Aegineta. Dioscorides verò addit aliqua, & ait, Semen grauius somnia & tumultuosa facit, drachmæ pondere potum: tumores discutit illiū cum polenta: Spicula adactesque corpori aculeos, extrahit. Folia illiū tubercula & furunculos

Lib. 8. de simp. med. fac. Lib. 7.

culos discutiunt. Radix eius in aqua mulsâ duûm drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem extrahit. Aliqui alias vires Scabiosis tributas huic referunt, sed Scabiosas, quas hîc spontè ortas habemus, non habere acrimoniam percepi, & si aliquantulum amaricare palato sentiantur; præterea recentiores, & præsertim Pena, contrarias vires Scabiosis tribuere, nam in capite de Scabiosa, & Diaboli morsu in Aduersarijs, viribus ijsdem præditas esse illas scribit, sed in Observationibus de Cyaneo vulgò dicta, Chondrillas Scabiosas, Cyaneosque eandem temperiem habere, nempe refrigerantem, & siccantem. Quare hoc loco parvam illis fidem adhibendam esse censeo, atque non parum differre Scabiosas ab hac planta, etsi capitulis similes esse videantur. Quidam obijciunt huic plantæ, folia prima non esse Eruçæ sylvestri similia, sed Plantagini, his ego; cum in alijs respondere videatur, ita respondi: non omnes plantas Dioscoridem, cum scripsit, vidisse; vt idem in proëmio testatur, sed quæ ab alijs sine contrarietate descripta inuenerat, exarasse; quare vel idem, vel is à quo transcripsit, plantæ caulem, sine primis folijs humi proximis, (quæ faciliè pluvia intercedente terram tangentia marcescunt, vt in Glasto sylvestri cuius folia prima plantaginea non vidit, sed quæ caulē lactucæ modo cingūt, ideo folijs lactucæ similibus esse ait, sed certè satium Glastū à sylvestri nihil differre, nisi cultu non est dubitandum) floridum atque perfectum delineauit: iccirco parui esse faciendum hoc iudicaui: sciens Antiquiores in describendis plantis non omnibus diligentiam adhibuisse, vt cuique exercitato constet: & vt dixi Eruçæ sylvestris folia neque incisa in imo esse & latiora, & Dioscoridem non magnitudinem, sed formam foliorum semper designare, nisi expresse illam vt solet. Quare his non obstantibus plantam hanc Pycnocomi nomen, formam, viresque cum referat, habere statui; adhuc incognitam, nec ab alijs animaduersam. Pena Pycnocomi nomine acanaceam plantam quandam describit, nulla prorsus facie Pycnocomi, quam nec ipse ausus est Pycnocomon esse asserere. Vim purgatricem recentiores in hac planta non cognouerunt sub Succisæ nomine. Diligens nunc, doctusque medicus, qui non vt alij Carri semitam sequatur; poterit huius plantæ radices vim experiri, modo à Dioscoride descripto.

Semperuium tertium Diosc. & Plinij.

Nomen
Etymon.

Locus.
Forma.



TSI semper non viuat planta hæc, cùm tamē αειζωοειδής sit caule, folijs, floribus, atque viribus, Semperuiui nomen adepta est. Iisdem locis quibus congeneres aliæ plantæ, gaudet: petris scilicet humentibus; sata verò vbique prouenit. Huius radix parua admodum, fibrosa, atque multis capillamentis tenuibus est prædita: folia Portulacæ sunt latiora, maioris Semperuiui æmula, minora tamen, carnosiora, & rotundiora, præsertim antequam caulem edat, quibus folia Aristolochiæ Clematitidis Dioscorides comparat his verbis, φύλλοις ὑποστρογγύλοις αειζώου μικροῦ ἑοικόσι. : folijs subrotundis paruo semperuiuo similibus: succo magis referta, hirsuta, sinus quatuor in latiore partem habentia: caulem crassum, rubentem Tithymali Characiæ modo, atque succosum cingunt alternatim: aliquando multas radice tenus alas habentem supinas: quandoque unicum caulem rectum, in summo duabus, tribusue alis diuisum, vbi folia paucioribus, binis tantum sinibus erosa conspiciuntur: in alarum cauo interceptus primus flos exit, posteaque per alas dispositi ab imo incipientes alij prodeunt paulatim albo colore, lacteo-ue, stellam referentes quinque radijs constructam, in medio quorum totidem siliquæ stellatæ, eiusdem formæ, & magnitudinis suboriuntur: exiguis multisque seminibus nigricantibus turgidæ, non secus ac secundum Sedum. Tota planta longitudine, altitudinē dodrantem ad summum æquat cultu: humilior est huius coma secundo Semperuiuo vermiculatis folijs.

Tempus. Maio mense floret, Iulio, & Augusto finitur. Sapore primum aquoso in fine adstringente sine aliqua mordacitate. Huic similem depictam edidi, sed minorem; quam spontè ortam vidi in pariete vetere ædis D. Antonij extra urbem, postea multis locis humetibus. toto habitu superiori est similis folijs, variat non sinuatis, magis ad Portulacæ folia accedentia, sed minora, flores non albos, sed luteos promit, eodémque tempore perficitur: gustu etiam simili. nec dubium est quin sit eadem specie & viribus; quibus ambæ easdem, quas reliqua duo genera

Sem-

Semperuiui habent vires, Dioscoridis sententia, referunt. atque tertij ab eodem descripti notas adimplere videntur: ait enim . Δοκεῖ δὲ εἶναι καὶ τρίτον εἶδος αἰζώου, ὃ ἐνίοι ἀνδράχνην ἀγρίαν ἢ τηλέφιον ἐκάλεσαν, ῥωμαῖοι δὲ ἰλλέκεβραν. ἔχει δὲ αὐτὴ παχύτερα τὰ φυλλάρια πρὸς τὰ τῆς ἀνδράχνης, καὶ δασέα. φύεται ἐν πέτραις. Videtur autem et tertium genus Semperuiui esse, quod aliqui *Andrachnen agriam*, aut *Tephion* vocant: *Romani* autem *Illecebram*. Habet foliola crassiora, aliqui pro παχύτερα, πλατύτερα legunt & melius, vt etiam Plinius, nam comparatium πλατύτερα, latiora scilicet, refertur ad folia secundi Sedi, cuius folia crassa sunt, & rotunda, vermiculi modo, quibus crassiora non possunt esse; sed latiora certè, atque ideo similia sunt *Portulacæ* folijs, quare ita legendum est. Habet foliola latiora, *Portulacæ* proxima, et hirsuta. Nascitur in petris. Ex quo textu Plinius ita transcripsit. Huic [supra alijs ante duobus descriptis,] similis est, quam Græci *Andrachnen agriam* vocant, Itali *Illecebram*, pusillis latioribus folijs, breuiori cacumine: nascitur in petris, et colligitur cibi causa. Omnium harum vis eadem, perfrigerare, et adstringere, &c. Ex quibus colligitur eandem plantam esse, quæ supra à Dioscoride est descripta: viribus tantum contrarijs differre videtur. Quare videndum est cui textui sit credendum, & quænam vires propriæ sint huius plantæ. Et certè non solum ex sapore plantæ huius, quæ integras notas Dioscoridis, & Plinij in se continet, sed ex aliorum coniecturis, vires has, Δυσάριον δὲ ἔχει, &c. Dioscoridis textui insertas, supposititias esse, est credendum. Plinium omnium primum Dioscoridis textum in suos libros transcripsisse nemo dubitat, etsi ab ipso nunquam memoretur; eoque tempore incorruptum habuisse existimandum est. Quãobrem si duorum fideliter historias transcripsit, & tertij quoque Semperuiui historiam, notas uirèsq; simul incorruptè exarasse est credendum: nec ipse suo Marte illas vires descripsit, sed ab Auctoribus fide dignioribus transcripsisse, non tantum has, sed omnem historiam fatetur. Quod clarè patet, nam Plinius describit primum, secundum, & denique tertium Sedum, nec singulis, nec primo tantum adscripsit vires, ut in Dioscoride, sed in fine descriptionis omnium trium concludit dicens, Omnium harum vis eadem, perfrigerare, et adstringere; atque vires priuatim sequenter describit. Facilius igitur, veriusque censendum est, eundem qui diuersas illas p'antarum nomenclaturas

Lib. 4.
Descrip-
tio.

Lib. 25.
cap. 13.

Vires.



Dioscoridi adscriptis, & has apposuisse vires Galeni commentario deceptum, & nominis varietate, atque similitudine. In Glossis enim Hippocratis Galenus tradit, Telephium specie esse herbæ, quæ, & Semperuium sylvestre, & Portulaca sylvestris appellatur, à Romanis autem Illecebra. Quod Auctor qui Emblemata in Dioscoridem edidit Basileæ impressa animaduertit, atque alij etiam Commentatores confirmant, sed de varijs nomenclaturis loquuntur, non de viribus falsò apposis, quod verius est: varia quidem illa nomina apud Plinium sunt; vires verò minimè. Verius igitur deceptus est ab historia Portulacæ sylvestris putans easdem vires habere Semperuium tertium, quia etiam Portulaca sylvestris appellaretur: in quam decipulam incidit Marcellus Virgilius etiam, qui ea quæ de Portulaca sylvestri erant, tertio Semperuiuo adscriptis: ita rectè factum existimans: non enim animaduertit contrariam historiam à Plinio descriptam, magis Sedo tertio congruere, veriorémque esse. Aliam igitur in mediū afferam textuum conciliationem, & primò, ut veritas agnoscat, demonstrandum est, sylvestris Portulacæ historiam supposititiam esse: & adducor, quia nec in Plinio de hac sylvestri Portulaca, neque in Galeno, qui etiam in multis Dioscoridem est sequutus, nec in Paulo aliquid memoriæ inuenitur: atque rationi consentaneum est, nullam esse inter satiuam & sylvestrem, spontaneam scilicet Portulacam, differentiam: nisi magnitudine à cultu proueniente, nihilque sapore & viribus differre, ut iam omnes alij doctiores animaduertè, qui ab ipsorum commentarijs penitus caput illud abstulerunt. Sylvestrem Portulacam esse censeo, quæ Peplis, & Peplion dicitur: nam hæc uerba Plinij mihi indicio fuerunt, de satiuæ Portulacæ loquentis. *Est & Portulaca, quam Peplion vocant, non multum satiuæ efficacior; cuius memorabiles usus traduntur, &c. Portulacæ scilicet satiuæ, cuius vires multas describit: sylvestris verò Peplij scilicet, nulla alia est in illo mentio. Et apud Galenum, Peplion frutex succum habet velut Tithymali, & nascitur plerunque circa mare; radicem habens inutilem, quemadmodum & Peplos, &c. Apud Dioscoridem. Peplis, quam aliqui sylvestrem Portulacam vocant, Hippocrates Peplion, in maritimis maxime nascitur, latè opaco frutice candidi succi pleno, folijs satiuæ Portulacæ, rotundis; infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, ut in Peplo: igneo gustu:*

Lib. 20.

c. 20.

Lib. 8. de

simpl.

med. fac.

Lib. 4.

gustu: radix tenuis, &c. Ex quibus faciliè credendum est supposito-
rem illum Peplidis descriptionem, Portulacæ sylvestris nomi-
ne insignitam, ab alio aliquo Auctore descriptam, putantem à
Peplide differre, cum ignoraret easdem esse plantas, Dioscori-
di adscripsisse, cum deesset ibi sylvestris Portulacæ differentia.
Ita etiam contigit Marcello Virgilio, qui putans sylvestrem
Portulacam, eandem esse cum tertio Sedo; ob idem nomen illis
donatum, illius historiam, atque vires capiti tertij Semperuiui
reposuit: nominum, & notarum plantæ similitudine deceptus:
ideoque inueniuntur eadem uerba, easdem uires Portulacæ syl-
vestris, tertio Semperuiuo tribuentia. Integra quidem verba
illa in hoc tertio Sedo reposita inueniuntur, quæ si quis erudi-
tus, veritatis studiosus conferre uoluerit, eadem absque immu-
tatione inueniet. Alij putant sylvestrem Portulacam non esse
reijciendam, sed uires tantum illi adscriptas, tertio Sedo repo-
nendas: à quo illapsas esse censent. Alij Telephium & Sedum
tertium confundunt, eandem esse plantam iudicantes. Alij
uarias de hoc sententias iuxta ipsorum mentes tradunt, mihi
minimè persuadentes. Hæc igitur mea, rectiorque videtur sen-
tentia: ut Peplis, Peplion dicta, eadem sit, quæ Portulaca syl-
vestris Dioscoridi supposita, uiribus namque igneis ambæ sunt
præditæ; forma etiam eadem. Quare expungenda erit Portula-
ca hæc sylvestris igneis uiribus, exulcerantibusque Tithymali
vires referens: & Peplis tantum remanebit, duplici nomine, ut
iam à Dioscoride describitur, & à Plinio, qui nullam aliam ha-
bet sylvestrem Portulacam, nisi Peplion dictam: quæ in mari-
timis maximè nascitur, & feruidis collibus arenosisque ut aliæ
maritimæ plantæ multæ. Telephium etiam à tertio Sedo differ-
re, nam & in Plinio utrumque habetur, & ut Dioscorides ait.
Telephium folia habet cærulea, & binas alas in singulis foliorum geniculis,
atque inter vites nascitur, & culta loca. Sedum verò eiusdem senten-
tia folijs est hirsutis, atque in saxis, & non alibi oritur. Sunt qui
Sedum hoc, non folia hirsuta, sed densa, habere malunt, atque
verbum, *δασέα*, densa interpretantur, quod à Dioscoridis insti-
tuto abhorret. Semper quidem uerbo, *δασέα*, utitur, pro *hirsu-*
ta, & pro densa, *πυκνά*, quod patet in multis, & præsertim in ca-
pite de Aethiopide, ubi ambo ponit, ibi, *ἔχει τὰ φύλλα δασέα δὲ*
λίαν, καὶ πυκνά: Habet scilicet folia hirsuta valdè, & densa. Quamob-
rem

rem poterit verbum illud *δασέα*, *densa* interpretari, et si, *densa*, etiam per translationē interpretetur, cū iam videmus Dioscoridem pro, *hirsuta*, accipere ad differentiam verbi, *λεία*, *laevia*, quæ inter se sunt propriè opposita, & pro *densa*, verbo *πυκνά*, semper vti. Neque obstat caput Hyperici, & Britannicæ, nam ibi etiam Dioscorides pro *hirsuta*, verbum hoc *δασέα* accipit, & iam non solum pericarpium inuenitur hirsutum in Hyperico, sed & tota planta tomentosa: & si pro Britannica Bistortam accipias, folia non uidebis habere densa, pauca enim habet, sed pilosa saltem in auersa parte. Quare expuncta primū syluestri Portulacæ, & deinde verbis illis Portulacæ vires Sedo tribuentibus, tria Dioscoridis Semperuiua coniunges, vt in Plinio, & uerba illa post notas secundi Sedi, *τούτου τὰ φύλλα*, &c. in fine historiæ tertij Semperuiui repones, atque ita in pristinum reduces, *τούτων τὰ φύλλα δῶαμιν ἔχει τὴν αὐτὴν τῶν προειρημένων*. Atque hoc loco potius Plinio, quā Galeno credendum cenfeo, qui duo tantum Semperuiua descripsit, Maius nempe, & minus; ideoque quidam putarunt tertium Sedum pro Telephio descripsisse, sed certè Telephium per se planta est viribus, nedū forma à Sedo aliena, neque cum Sedo aliquid commune habet, præter appellationum varietatem. Tertium Sedum viribus *Vires.* per omnia primo & maiori similibus esse, nisi quod inefficacius, Auctor est Plinius, qui vt dixi refrigerantem, & adstringentem vim tribuit tribus omnibus Semperuiuis, atque semper similes viribus plantas has fecit, coniunxitque his verbis, *Αἰζοῦν* omne, sed è maiore succus efficacissimè. & alibi, *Omnia harum vis eadem, perfrigerare, & adstringere*. Medentur epiphoris folia *Lib. 26.* *imposita, vel succus inunctis*. Purgat enim ulcera oculorum, expletque *c. 13.* & ad cicatricem perducit: palpebras deglutinat. Eadem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illiis. Aduersantur phalangiorum iectibus, &c. Plantæ quæ ab alijs pro tertio Sedo viribus acribus, cibis ineptæ contra Plinij sententiam, depictæ sunt, non hoc tertium Sedum, sed *δειζωοειδὲς* sunt, non vt à me propositæ *Lib. 25,* *δειζωοοῦσαι*. Et quæ vermiculatis folijs est planta minima Plinij *c. 13.* alterum, vel tertium Dactylum esse censerem: ait enim, *Sunt* *Lib. 24.* *qui & aculeatum gramen vocant: trium generum: cū in cacumine aculei sunt plurimum quini, Dactylon vocant: hos conuolutos naribus inserunt, extrahuntque sanguinis ciendi gratia. Altero quod est Αἰζοο simile,* *c. vlt.*

ad paronychias, & pterygia unguium, & cum caro unguibus increuit, utuntur cum axungia, ideo Dactylon appellant, quia digitis medeatur; Tertium genus Dactyli, sed tenuis, nascitur in parietinis, aut tegulis. Huic caustica vis. sistit ulcera quæ serpunt.

Solanum Manicum Dioscoridis:

Nomen.

Lib. 4.
Descrip-
tio.



TRYCHNON *μανικόν*, appellatum est, eo quod insanire facit, ut Dioscorides ait, qui ex Theophrasto mutuatus, ita nobis illud depinxit. Στρυχρον *μανικόν*, ὃ ἐνίοι Πέρσιον, οἱ δὲ θρύον ἐκάλεσαν. τοῦτου τὸ μὲν φύλλον παραπλήσιον ἐστὶν δίζωμον, μείζον δὲ πρὸς τὰ τῆς ἀκάνθης, ἢ τις καὶ παίδεως καλεῖται. καυλοὺς δὲ ἀνίσχιν ἀπὸ τῆς ῥίζης ὑπερφυεῖς

δέκα ἢ ἰβ'. ὀργαῖς ἔχοντας ὕψος. τὴν κεφαλὴν ἐπιχειμῶν ὥστερ ἐλαίαν, δασυτέραν δὲ ὡς πλατάνου σφαῖραν, μείζονα δὲ καὶ πλατυτέραν, &c. *Solanum manicum*, aliqui Persion, alij Thryon appellauere. Huius folium simile est Erucae folio, maius quidem, ad folia accedens Acanthi, qui Pæderos dicitur: caules producit ab radice ingentes, decem, aut duodecim, vnae altitudinem habentes: caput uelut oliuam incumbens, hirsutius quidem, uelut Platani sphaeram, sed maius, planiusque, &c. Hic animaduertendū, caput hoc Dioscoridis mutilum, ac deprauatum esse: nam quæ sequuntur alterius Solani Manici, quod nostrates vulgò, Belladonna, appellant, notæ sunt; à cuius descriptione delenda sunt, καρπὸν ἴσχει βοτρυοειδῆ, ῥαγάδας ἰ ἢ ἰβ'. ὁμοίας κισσοῦ κορύμβοις. fructum racemosum, acinos decem aut duodecim habet, hederae corymbis similes: eritque sensus atque descriptio hæc. Florem habet nigrum, & post florem fructum rotundum, nigrum, mollem ut uia. Radix subest alba, crassa, caua, cubitalis. Quæ Græcè ita legi debent: Ἄνθος μέλαν, μετὰ δὲ τοῦτο καρπὸν ἴσχει τρογγύλον, μέλανα, μαλακὸν ὥστερ σαφυλή. ῥίζα δὲ ὑπερῖλευκη, παχέια, κοιλὴ ὡς πήχεως, &c. Folia ex Plinio sunt reponnenda, ait enim de Strychnis loquens. Tertio folia sunt Ocimi, minimè diligenter demonstranda, remedia non venenatracantibus, &c. intelligendum verò folia Ocimi formam habere, sed maiorem & multò. Sed ad plantam redeo, eritque forsan ab omnibus recipienda, cum neque sit quicquam quod illi refragetur. Est igitur tetri odoris Solanum referens, planta: radicem habens rectam

Lib. 21.
c. 31.

Forma.

Σησίγγου μαυρίκη

Solanū manicum.



etiam, fibrosam, non multum longam respectu caulis, qui procerus est hominis staturam adæquans, rotundus, ramosus, multisque alis refertus, semper in binas, quæ singulæ in alias binas, se diuidens alas: folia habet Solani somniferi & lethalis foliorum magnitudine, latiora, mollia, atque per ambitum lacinia ta, velut Atriplex sylvestre angustifolium, pes Anserinus dictum, medias inter sylvestrem Erucam, & Acanthum Pæderota dictum, incisuras siue lacinias referens, ut vult Dioscorides: alternatim per intervalla cauli, ramisque pediculo longo hærentia: ex quorum alarum sinibus, crassi, breues, rectique petioli exeunt, Aestate habentes flores albos, calathi forma, vel nolæ, ut vulgare Strammonium, odoratos, quibus decidentibus exit pilula ovalis, tunc cum est parua, pilis mollibus, ut Platani, sed cum est adulta, spinosior, horridiorque ut Xanthij pilula: nec obstat, ut aliqui dicunt, pilulam Platani esse molliorem, & non ita asperam atque spinosam: idem enim Dioscorides Xanthij pilulæ asperitatem, similem fecit illi Platani, his verbis, ἀκανθώδη ὡς πλατάνου σφαίρας: *Spinosas, scilicet, ut Platani pilulas*: sed Xanthij pilulæ cum imperfectæ sunt, similes sunt his à me descriptis, atque etiam cum sunt perfectæ, & adultæ, ergo nihil obstat. Huius plantæ pilulæ in quatuor partes, cum arefcunt, diuiduntur in superiore parte: quatuor quidem facies, totidemque angulos rotundos habent, ideo dixit Dioscorides πλατύτεραν, ex quibus excidit semen, quo sunt turgidæ, compressum simile semini nucis Metellæ officinarum, sed hoc nigrum:

Tempus. Aestatis fine floret, fructus perficit Autumno. Notandum est in Dioscoridis textu dici, caules, numero plurali, quod emendandum est, atque in singulari numero, caulem, est reponendum,

Lib. 9. ut in Theophrasti codice legitur, ibi, ἔχει τὸ μὲν φύλλον ὁμοίον διζώ-
c. 12. μω, πλεῖν μείζον. τὸν δὲ καυλὸν ὡς περ ὀργυιᾶς. κεφαλαίῳ δὲ ὡς περ γηθίου, μείζω δὲ καὶ παχυτέραν; εἴοικε δὲ καὶ πλατάνου καρπῷ: quæ Latine ita redduntur. *Folium habet Erucæ simile, verum maius: caulem verò ut plinæ longitudo: caput velut Gethij, maius quidem et crassius: atque Platani fructui simile.* Sic in vulgaribus textibus: Gaza uerò, non habet, crassius, sed pilosius, legitque δασυτέραν, pro παχυτέραν: quod magis probabile, atque Plantæ respondens est: maius quidem & crassius, idem significare videntur. Dici etiam potest satis veritati respondens, ut verba illa, *caules emitit ab radice proceros decem*

decem, aut duodecim vlnæ altitudine adolēcentes, referantur plantæ alteri, Solano scilicet somnifero, & lethali, nobis, *Belladonna*, & *maius* dicto, quod ex radice plures caules emittit eadem altitudine adolēcentes, vt ex viua planta videre licet. Non enim Dioscoridis textus tantum, sed & Theophrasti etiā codex mutilus, atque deprauatus est: cum nihil distinguat, atque confundere videatur descriptionem radicis, cum foliorum delineatione, atque ex his unam describere plantam: quod contrā est in Dioscoride, qui in alterius Solani, florem nigrum, atque acinos ferentis historia radicem illam describit: quæ conuenit illi Solani, non autem plantæ à me propositæ, quæ minorem atq. fibrosam habet: sed neque plantas distinguit, neque duas describere, sed vnam, atque vnicum caput conficere videtur, atque vires scribit ac si vnicam plantam narrasset: sed certè duas descripsisse cuique cognitum erit; non enim eadem planta fructus Platani similes, atque spinis horridos promere potest, ac etiam acinos nigros, molles, vt vua: quare vel Theophrastum, & Dioscoridem non descripsisse, quod non verisimile est, dicendum erit, vel potius, eorum alterum: aut etiam vtriusque textum deprauatum fuisse; atque qui primò textus transcripserunt, omisisse verba intermedia, atque postea commentatores, atque interpretes ignorantes plantas, quas descripsisse illos non est dubium, ita textus nobis reliquerunt corruptos: mirorque tot tantosque doctissimos viros, qui Dioscoridis textum interpretati sunt, atque in eum commentarios edidere, saltem corruptum textum non animaduertisse: atque si nesciebant, quomodo illum restituerent, illum nobis corruptum, atque mutilum esse, notum facere debebant. Miror etiam Plinium, ex duobus manicis Solanis, vnum describere, nec duorum facere mentionem: sed quod nostri *Belladonna*, vocant Solanum Ocimi folijs relicto altero, quod in Theophr. & Dioscor. Eruca folio inuenitur, nolentem scribere descripsisse, ne cognitum foret: ait enim *Tertio folia sunt Ocimi, minimè diligenter demonstranda, remedia, non venena tractanti; quippe insaniam facit paruo quoque succo. Quamquam Græci Auctores in iocum vertere. Drachmæ enim pondere lufum pudoris.* Qui Emblemata in Dioscoridem scripsit, quia in Theophrasto nihil de pudore habetur, pudoris, verbum, in Plinij textu, iudicat superuacaneum: sed hoc fuit, quia plantæ vires ignorabat,

bat, lulum autem pudoris, idem est, quod venereas res tractare, ideóq. nos *Belladonna*. quod Diosc. imaginationes non iniucundas efficere, Theophrastus, ut ludat, atq. se pulcherrimū putet, honestè descripserunt. *Gigni dixerunt, species vanas, imaginésque conspicuas obuersari demonstrantes. Duplicatum hunc modum legitimam insaniam facere. Quicquid verò adiciatur ponderi, representari mortem.*

Lib. 9.
c. 12.

Quas vires Solani huius, alteri, *Eruca folio* ad *Acanthi* accedenti, Theophrastus, atque Dioscorides tribuisse videntur. sed si quæ Plinius scribit, cum Theophrasto, & Dioscoride rectè ex pendantur, non *Eruca folio*, sed *Ocimi*, *Solano* tributa, conspiciuntur. nam quæ Theophrastus scribit, ex uerbis, *ὁ δὲ μανικόν, οἱ μὲν θρύονον καλοῦσιν*. Quod verò *Manicum*, alij quidem *Thryoron* appellant, vsque ad verba, *ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον*. Habet verò folium: & quæ ex Plinio transcripsi, atque ex Dioscoride ex verbo, *florem habet nigrum, &c.* ad finem vsque eadem esse videbuntur. Quare ex his *Solanum Ocimi folio*, quod nos *Belladonna* dicimus, & illius vires descripsisse omnes apparebit, & *Solani Eruca folio* vires, aut sub eadem descriptione, vel non descripsisse, aut maneat esse est dicendum: illius quidem non radix, etsi soporifera sit recentiorum experimento, sed semen, manicas vires habet, alterius radicis viribus ad vnguem respondentes, vt apud Plantarum collectorem videre poteris. Quare Pliniū dicendum est, *Solanū Ocimi folio* tantū forsā descripsisse, quia ipsi notum erat, atque nostro cœlo oriebatur, de altero verò *Eruca folio*, vt ipsi incognito, & exotico noluisse, cum & quod descripsit, noluit describere, ne verbum quidem facere. gratias igitur Deo esse referendas censeo, cum nostro seculo, antiquioribus incognita atque illorum mutilam deprauatāque historiam, agnoscamus, veritatísque certiores facti simus: atque duo *Strychna manica* habeamus certiore historia, delineata: præter alias plantas multas exoticas, à Theophrasto aliisque memoratas, iam agnitas, & descriptas ab eodem plantarum collectore. Huius exoticæ plantæ primus mihi copiam fecit Christianæ fidei verè defensoris Philippi I I. Hispaniarum Regis Leonardus Antonius Reccus medicus peritissimus; cuius industria & labore descripta est quamplurimarum exoticarum plantarum Latina historia, quæ impressa quamprimum in lucem progredietur eiusdem Regis liberalitate, mandato, & sumptu. Hanc

Chri-

Christophorus Costa Daturam appellat; medicique legitimā nucem Methel Arabum, esse censent, frigidam tertio excessu, secundique sine siccā constituant. vires in radice & magis in semine planè manicas habere asserunt. reliquas vires & modum utendi, apud eundem videre licebit. Galenus verò de omnibus Solanis supra locutus ait. Porro quod reliquum est, ex propositis Solanis, ad medicationes, quæ intro in corpus adhibentur, inutile est. Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mortem inferent: si pauciores, saltem insaniam. Vna certè innoxie sumitur, ceterum nec in ipsa vtile quid obtinet. Verum si foris corpori emplastri modo illinatur, vlcera cacoethe, & nomode, siue pascentia curat. Sed ad talia radice cortex præfertur, desiccans secundo ordine iam completo, & tertio incipiente refrigerans secundo incipiente. Si quis verò Dioscoridis textum in pristinum reducere voluerit, ita meo iudicio scribere, atque legere poterit. Græcè quidem ita leget. Σπύχρον μανικόν ἐνιοι πέρσιον, οἱ δὲ θρύον ἐκάλεσαν. τὸ μὲν καυλοῦς ἀνίσιν ἀπὸ τῆς ρίζης ὑπερφυεῖς δέκα ἢ ἑβ', ὀργυᾶς ἔχοντας ὕψος: ἄνθος μέλαν: μετὰ δὲ τοῦτο καρπὸν ἶχει στρογγύλον, μέλανα, μαλακόν, ὥσπερ σαφυλή. ρίζα δὲ ὑπερσιλευκή, παχέα, κοίλη ὡς πηχέως. φύεται ἐν ὄρειναις χωρίοις, καὶ προσηνέμης, καὶ πλατανῶσι. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ρίζα πινόμενῃ μετ' οἶνου < α' πλήθος, φαντασίας ἀποτελεῖν οὐκ ἀνδεῖς. δύο δὲ < ποθεῖσαι ἐξίστανουσιν ἄξει τριῶν ἡμερῶν. δ' δὲ ποθεῖσαι καὶ ἀναιροῦσιν. Ἀντιφάρμακον δὲ ἐστὶν αὐτοῦ μελίκρατον πολὺ πινόμενον, καὶ ἐξεμούμενον. τῷ δὲ ἐτέρῳ φύλλον παραπλήσιον ἐστὶν ἐυζώμῳ, μείζον δὲ πρὸς τὰ τῆς ἀκάνθης, ἢ τις καὶ παίδερως καλεῖται: καυλὸν δὲ ἀνίσιν ὥσπερ ὀργυᾶς τλὴ κεφαλῶν ἔχοντα ἐπικειμένῳ ὥσπερ ἐλαίαν, δασυτέραν δὲ ὡς πλατάνου σφαῖραν, μείζονα δὲ, καὶ πλατυτέραν. τοῦτου δὲ ρίζα καὶ σπέρμα μετ' οἶνου πινόμενον δυνάμιν ἔχει τλὴ αὐτῷ τῷ προειρημένῳ. Solanum manicum, aliqui Persion, alij Thryon appellauere, alterum quidem caules ab radice ingentes emittit decem, aut duodecim vlnæ altitudinem habentes, florem nigrum, & post florem, fructum habet rotundum, nigrum, mollem vt rua. Radix subest, alba, crassa, caua, cubitalis: gignitur in montibus, & vento expositis, & Platanetis. Vim habet pota in vino radix drachmæ vnus pondere, imaginationes efficiendi, non iniucundas. Due verò potæ mentem ad tres vsque dies emouent. Quatuor verò drachmæ potæ interimunt. Antipharmacum huic est, aqua mulsā multa pota & vomita. Alterum verò, folium habet simile Erucae, maius tamen, ad Acanthi, quem Pæderota vocant, accedens, caulem longitudine fere vlnæ: caput incumbens oliuæ figura, sed hirsutius, vt Platani pilula, maius

Lib. de
Aromat.
c. de Da-
tura.
Lib. 8. de
simpl.
med. fac.

verò, atque planius. Huius radix & semen in vino potum eandem, quam superius, vim habet.

Clymenum Dioscoridis:

Nomen.



Lib. 25.

6.7.

Lib. 27.

6. 12.

Lib. 4

Descrip.

tio.

Forma.

VAM Theophrastus Clymenon plantam appellat, illam Dioscorides Periclymenon: idemque diuersis nominibus eandem describunt, eidemque medicas virtutes tribuunt easdem. Plinius verò qui ex utroque exarauit, nulla habita differentia inter Clymenum Theophrasti, & Dioscoridis, de Clymeno loquens, quas Dioscorides Periclymeno notas tribuit, ipse Clymeno adscribit ex Theophrasto sumptas, neque animaduertit Clymenum Theophrasti esse Periclymenum Dioscoridis: plantasque confundens in duas videtur species diuidere, primam ita à Latinis forsitan dictam, eiq. folia & semina Hederæ tribuit, quæ Dioscorides Periclymeno: secundam ita à Græcis appellari, ait (nolens Dioscoridem citare,) haberéque folia plantagini similia, &c. quæ est Dioscoridis Clymenum. Oblitus postea eorum, quæ de Clymeno scripserat, Periclymeni historiam ferè ad verbum exaratam ex Dioscoride, suo libro impingit, neminem fore existimans, qui hæc animaduertere possit, atque Dioscoridis partes tueatur. Galenus verò & posteriores Clymeni omiserunt historiam, Periclymeni tantum mentionem facere. Dioscorides verò Clymenum à Periclymeno separat, atque illius historiam seiunctam narrat, atque nomine, figura, viribusque diuersam à Periclymeno facit, de qua loquens ita ait. Κλύμενον καυλὸν ἀνίσσει τετραγώνον, ὅμοιον τῷ τοῦ κυάμου. φύλλα δὲ πρὸς τὰ τοῦ ἀργυρώδαντος. θυλάκια δὲ ἔχει ἐπὶ τοῦ καυλοῦ εἰς ἄλλα νέοντα, ἰσινότα ἰριδι, καὶ πολὺ ποδὸς πλεχτάνας. Clymenum caulem fert quadratum Fabæ similem, folia ad Plantaginis folia accedentia: habet autem folliculos in caule sibi inuicem annuentes, eosque similes Iridi, & Polyporum cirris. Cui descriptioni nullam præter hanc à me depictam conuenire patebit. Radice quidem hæc prædita est alba, parua, tenuibus fibris diuisa, ex qua folia erumpunt longa semipedem ad Plantaginis angustifoliæ folia accedentia sicuti Glasti folia

Dio-



Dioscoridis etiam sententia, per ambitum sinibus non profundis erosa, inque illorum diuisura punctum nigrum visitur: carnosa, parum hirsuta, tactu viscida, succosaque: caulem emittit, quadratum, hirsutum, quem folia in imo bina ex opposito coherentia, postea uero propter humoris abundantiam, alternatim, & quolibet angulo cingunt, quinque enim angulos promittunt in Scrophularia maiore & minore uisitur: multis alis refertum: ex foliorum uero dorso ueluti limbus descendit per caulium angulum, ita ut Fabæ caulis angulum videatur representare. Flores in summo alarum & caulis primo Vere ad Autumnum usque semper promittunt luteos saturatos, non nihil odoratos, croci diluti colorem imitantes; magnitudine & forma Chrysanthemo Dioscoridis laciniatis folijs similes quodammodo; differunt tamen parte interiore, quam non solidam & minutis foliulis refertam oculi orbem imitantibus, sed foliolis, staminibusque plenam habent, aliquando ex uiridi ad cæruleum uergentibus. Decidentibus florum folijs filiquæ, siue folliculi suboriuntur cuius C literam exprimentes, semen intus continentes oblongum, tenue, eiusdemque forme, sed triplo minus, fuluescens, uel ad cinereum uergens: folliculi uero ita compositi conspiciuntur in globulos, præsertim plantæ flore multiplici, & prolifera, ut Lilij radicem æmulari videantur squamosis partibus constata: nam singuli follicelli omnes in unum punctum, concurrere conantur, quare alij alijs interioribus incumbunt. Plantæ uero simplici flore folliculi aliter quidem constructi uidentur, & compressam formam Capæ imitantur, nec ut superiores similes omnes, sed triplici formæ differentia conspiciuntur, uerum singuli in dorso continent idem semen: atque qui interiorem partem globuli occupant, ita in se inflexi sunt, ut ferè circum complent, suntque omnium minimi: alij uero ipsis incumbentes latiores atque maiores sunt, & formam uidentur imitari nauiculæ: reliqui uero exteriores omnibus incumbentes, atque longiores, tenuiores sunt secundis, nec ut primi contorti, sed hemicyclum complent: qui siccati parum ab alijs recedunt, ut in pictura uisitur. Quare si quis rectè considerabit, atque latos folliculos folijs Iridis floris se inuicem tangentibus, à quibus, quia arcum varij coloris conficiunt, nomen accepit, ut Dioscorides refert his uerbis, ἀνθη δὲ ἐπὶ καυλῷ παράλληλα,

ἀλλὰ, ὁπκαμπή, ποικίλα: atque longiores alios folliculos exterio-
 res ab illis parum recedentes, folijs alijs floris Iridis in terram
 recuruis, comparabit; perbellè Iridis florem forma scilicet,
 filiquas has imitari dicet. Dioscorides verò tantum notat, ut
 sint adinuicem annuentes, in se scilicet incuruati. Si uerò sin-
 gulos folliculos consideraueris, singulorum dorsum tuberculis
 asperum esse conspicias; etsi exteriores folliculi longiores pau-
 ci, hirsutiores sint, sed qui interiorum locum occupant, omnes
 tuberculis asperum dorsum habent, quibus acetabula cirrorū
 Polypi imitari conantur, quare similitudo refertur, vt curui
 sint Iridis floris modo, sed similes sint cirris Polypi tuberculis
 scilicet asperi sint, similes acetabulis cirrorum Polypi: πλεκτά-
 νας Dioscorides non simpliciter cirros intelligit, sed acetabula,
 vel rectius acetabulis refertos cirros; atque hanc esse veram
 Dioscoridis sententiam, probatur ex textu capitis Polypodij,
 in quo describitur, Polypodium ideo ita dictum, quia similem
 habet radicem cirris Polypi acetabulis refertis, ideòque τὸ πο-
 λυπόδος ποδῶν, πολυπόδιον dictum est: uerba eius sunt, ῥίζα δ' ὑπερί-
 δασεία: πλεκτάνας ὥσπερ πολύπους ἔχουσα, &c. quod confirmat Plinij
 textus, qui ait. *Radix in usu pilosa, coloris intus herbacei, crassi-
 tudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu Polyporum cirri, &c.*
 Quod si quis radicem Polypodij conspexerit, cognoscet: habet
 enim tubercula plura, quibus acetabula pedum Polypi referre
 uidetur. Hoc manifestè ex Theophrasto liquet, qui de radicum
 diuersitate loquens, ait: ἡ δὲ τοῦ πολυπόδιου δασεία, καὶ ἔχουσα κοτυ-
 ληδόνας, ὥσπερ αἱ τοῦ πολύποδος πλεκτάναι, &c. Quòd autem huius
 plantæ fructus, folliculi dicantur, & non semina, clarè patet,
 nam δύλαξ, & θυλάκιον, capsula, vagina, & quodlibet concauū,
 præsertim oblongum quod aliquid contineat, uel continere
 possit, dicitur: quare, cum hi fructus disrupti semen contineant
 minus multò, suam habens cutem, non erit dubitandum quin
 θυλάκια verè sint: quod si nec alicui satisfaciatur, exemplum alte-
 rum ex Dioscoride illi adduco sumptum, fructus scilicet Gla-
 sti, paruarum linguarum effigie, quos idem Dioscorides θυλά-
 κια appellauit, & tamen nec ita crassum folliculum, nec nisi uni-
 cum singuli habent semen. Planta hæc propter copiosos flores,
 atque uiuacitatem, qua usque ad Autumnum, & etiam Hyemē
 durat semper florem emittens, *fior d' ogni mese*, appellata à recē-
 tioribus

Lib. 26.
 c. 8.

Lib. 9.
 c. 13.

tioribus fuit: quare nulli horto non inquilina, gaudetque cultu, in syluis uerò non ita durat, nec ita fit lata, sed tota gracilior, atque minor, caulisque propter paucum humorem quadratus totus sæpius uisitur. Fuchsius, & omnes post ipsum Calthā esse satis friuolo argumento putarunt; quo facilius, ueriusque demonstratur, Caltham Poëtarū esse Chrysanthemū Dioscoridis, quod in diuersis illis nomēclaturis Chalcanthemō, Chalca propter aureum, vel æreum colorem sic dicta, indēque corruptē Caltha, & Bupthalthmon propter floris formam dicitur: atque hīc Olitores etiam Bupthalthmi nomen retinent, frequens enim est in hortorum marginibus: atque probatur eodem illorum argumento, ab odoris scilicet grauitate, quæ in Chrysanthemo non tantū flore, sed in tota planta, à quolibet naso carente sentitur, & à florum colore, forma, & fulgore, & ortu circa ædificia frequentissimo, (quod non in hac planta Clymeno,) & foliorum forma scissa, & læuore & usu, etiam ab iisdem retento, ut scilicet teneri turiones olerum modo edantur, & in acetarijs etiam recipiantur; quorum multa in sic dicta Caltha deesse uidentur, (corrumpant quantum uelint Dioscoridis textum isti peruerfores, Dioscorideæ & Plinianæ purę lectionis inuidi & imperiti:) quam Caltham esse censentes illi calidas vires recentiores tribuere. Quas etsi experimentis comprobatas esse dicunt, nescio an sit illis credendum, cum plantæ sapor cōtrarium demonstret, nullum quidem calorem inesse perspicitur palato, ijdēque fateantur, calorem foliorum propter humiditatem ei coniunctam non se protinus exerere: sed certè minus interuallo quouis. item adstrictione nō carere ait Matthioli, etsi calidam putent omnes, quia ut ait Fuchsius, dulcedine modica cum amaritudine coniuncta participat: sed certè, acerbæ sapore est nihil ad amarum inclinans, sed adstringentem, & aqueo, frigidōque succo referta est. At dato & non concesso quòd parum sit amara (quod enim dulce putarunt, aquosum est) non ideo calida erit, etsi sapor amarus ex calido siccante, uel concoquente humore procedat, nam cum plantæ omnes mixtam habeant qualitatem, quatuor enim elementis constant, non ex ijs, vel sapore tantū, sed simul coniunctis est excipienda qualitas, nam plantæ omnes aqueo humore abundant, atque non ideo refrigerant; sic etiam quæ amaræ sunt,

non

non omnes calefaciunt, nam etsi fapor amarus excedat, quia omnium maximè sensibilis sit, minima enim quæque amaroris pars magnam molem insipidam, vel dulcem conturbat, austerā etiam & acerbam: non ideo ex amarore tantum qualitatis vis dependet, sed ex maiore & superabundanti elementaris mixtæ partis vi, quæ, & rectè gustata planta, & considerato sapore simplicis vel mixto, simul cum experientia, & effectu decernenda est. Quæ verò amara sunt & calida, ferè omnia acrimonia participant, vel multo odore aromatico & etiam graui: ea verò in quibus neutrum percipitur palato, vel lingua, frigida, & sicca, vel humida, magna ex parte sunt; ac etiam si odorata sint, ut Rosa, Viola, & similia, non ex odore caliditas procedit, etsi odor ipse per calidi excoctionem contingat: amarus enim ille fapor ex terreo humore non concocto procedit, vt in omnibus fructibus immaturis, quæ cum acerbo amarum habent mixtum. quod contra est in ijs quæ ex dulci propter nimium calorem, vel excoctionem amara euadunt. Vt autem concludam, Picrin quæ ab amarore sic dicta est, & Opium amarissimum, & similia minimè calefacere certum est, refrigerare verò & siccare non est dubium: ex terrea siccâque parte nec tenui amaror his proccedit, non autem ex aërea, tenui, atque bene excocta, ut in acris & aromaticis, quæ siccata diu odorem & saporem retinēt, ac etiam cum siccantur, odor & fapor magis fit sensibilis. Contra quidem in hac planta & similibus, quorum folia siccata & saporem & odorem etiam, si habebant, amittunt: quod non semel expertus sum. Aiunt postremò huius plantæ aquam floridæ plantæ stillatitiam oculorum ruborem, atque inflammationem arcere, si oculis instilletur, vel lintea madida superponantur: ego quidem scio plantas atque omnia quæ sublimantur, non paruam amittere frigiditatis partem, propter humoris attenuationem à calido effectu contra rei naturam, atque terream partem, in qua maxima est frigiditas, amissam: & contra ruborem atque inflammationem non calidis præsertim in principio, quod nec distinguunt, debere vt; sed frigidis & reperiuntibus. Pena addit, *ius & teneræ cimæ in ouorum luteo in placentam exceptæ, & mansæ, nimis fluentes menses sistere, cunctantes verò impellere esse compertum.* Certissimum ex ouorum comesu præsertim lutei est sanguinem creari, quo facillimè abundante, natu-

ra excalescens menses educit, ut se deoneret. Quod autē ouorum lutea iuncta herba hac etiam sistant menses profluentes, hoc herbæ ui tribuendum est; ex quo si verum est, non calefacere, sed potiùs refrigerare nisi urat dico, Dioscoridi consentiēs qui ait, *ποιεῖ δὲ χυλὸς πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν πινόμενος, καὶ κοιλιακούς, καὶ ῥοιῶν ἐρυθρὸν εὐφραν, καὶ λύχων*, Facit autem succus ad sanguinis reiectionem potus, & Celiacos, & rubras fluxiones adstringens & refrigerās. quod sanè vt dixi gustu percipitur, nisi palatum sit callosum, & iam fœminarū experimento cōstat, & vtuntur ad hæmorrhoidales fluxiones sistendas. Quòd autem regium morbum emendare possit, hoc ex floris colore & substantia (si phytognomicis est credendum) dependeret: sed puto non ex ui propulsua, sed potiùs ex quadam coloris *συμπαθεία*, cui nec semper credo: & sic plantam hanc contrarijs diuersisque viribus præditam esse, diuersis partibus dicendum esset, si tamen verum. Huic periclitatores vulnera sanandi uim tribuere, nec mirum propter humoris glutinosi viscositatem: tota enim planta tactu viscida est. Dioscorides verò Clymeno has vires tribuit, sic scribens. *Præstantissimum montanum: exprimitur totum cum radice. Facit autem succus ad sanguinis reiectionem potus, & Celiacos, & rubra profluuia adstringens, & refrigerans. Compescit autē & narium eruptiones.* Quin etiam folia concisa, vel folliculi recentibus vulneribus impositi, ea ad cicatricem vsque perducunt. Plinius verò, *Folliculi Clymeni recentibus plagis imponuntur*. Alibi etsi Clymeni mentionem faciat, de Periclymeno est intelligendum. Non est Clymenum Dioscoridis quæ à Matthiolo depingitur, cū sit legumen, quod nos Cicerculam dicimus, vt alij etiam animaduertunt, habeátque capreolos; quos, cū Periclymenum sequeretur, quod se aduoluit flexibilitate arboribus, non tacuisset Dioscorides ad differentiam Periclymeni: sed nec hoc esset obijciendum si in alijs responderet: sufficit iam non habere folliculos alios alijs incūbentes, similes Iridi, & cirris Polyporum vt dixi, quibus notis, & Clymenum depictum à Dalechampio verticillatis floribus, & Scrophulariam, siue ut dicunt, Betonicam aquaticam, Clymenum etiam putatam pericarpis rotundis, vt Scrophulariæ, folijs Betonicæ similibus, atque Sicilianam à Lobellio dictam aliásque etiam plantas reijcere hoc modo poterimus, atque etiam omnem plantam, quæ folliculos

non

Vires.

Lib. 26.

c. 14.

non ad inuicem habeat incumbentes, vt iam ostendi, sed in se obuolutos vt aliqui ostendunt, quæ nec alijs notis respondere videtur.

Astragalus Dioscoridis:



EMINVM forma ἀστραγαλοειδής, plantæ huic nomen indidit Astragali: ἀστράγαλος quidem talum, & talorum lusum significat, quorum formam & vsum huius plantæ semina referūt: tereti forma quidem sunt, in superna infernæque parte plana, vel acetabulorum modo concaua: posset etiam ita appellari à tuberosa carnosæve forma radicis compressa, & melius à multitudi-
ne fibrarum nodosarum ad similitudinem flagelli, vnde ἀστραγαλῶν τις μάστιξ à Polluce dicitur, Huius radix colore foris est fusco, intus pallido, multas nodosas fibras, duras, longas, implicatas habens, in quorum medio, sinibus, & extremo inueniuntur veluti bulbuli concrecentes, quibus radix se propagat. Inueniuntur etiam aliquando [Mai] mensis fine inueni] quædā carnosæ, crassæ, purpuræscencia, succosæ, dura, læuia, vt ὑπαστράγαλοι, dici possent, nihil aliud repræsentare videntur: attamen non se explicant, sed ita abundant superfluè. Caules tres, quatuorve emittit tenues, quadratos Ciceri similes, parum à terra se attollentes, inque ipsam inclinatos, ex quibus per intervalla, vt in Cicere posita sunt folia pedicellis hærentia, primò bina, deinde quaterna, bina ex opposito, postea quina, postremò terna ex opposito intercurfantia, forma ad Rusci folia accedentia, maiora verò, duplo longiora, teneriora, & læuia ad nouella Hederæ folia accedentia: pedicelli autem quibus insunt, in imo vbi cauli hærent, singuli auriculas habent, vt in Cicere & similibus leguminosis visitur: auriculas bina illa foliola pedicello, & caulis geniculo hærentia intelligo: in summo verò veluti aculeum, sed mollem. Inter foliorum verò petiolos, & caulem, viticulæ exeunt dodrantem longæ in terram nutantes, ex quorum medio ad summum vsque viginti ferè insunt flores, primùm coaceruati, deinde Viciæ modo dispositi, forma & colore eidem similes: sunt enim purpurei exterius, in medio cærulei,

Nomen,
& Ety-
mon.

Lib. 10.
Forma.



interius verò lutei, colore vario ornati, quibus hiantibus, ex illorum vasculis exeunt filiquæ tenues quatuor digitos longæ, primùm uirides, ficcata verò rufescētes, vt etiam semen, in terram deuexæ, feminibus refertæ, forma ut dixi ἀσραγαλοειδῆ: floret Maio, & Iunio mense perficitur. In montibus, uallibus, locis umbrosis, & Sole illustratis ventosis oritur, hīc ubique. Radix dura est, difficilēque tundi uel rumpi potest etiam ficcata: sapore adstringente, gustu verò fatuo, odore terreo veluti fungi. Hæc planta præ cæteris Dioscoridis delineationi respondere videtur, qui ait. Ἀσράγαλος θαμνίσκος ἐστὶ μικρὸς ἐπὶ γῆς, φύλλοις καὶ κλωνίοις ὅμοιος ἐρεβίνθῳ. ἄνθη πορφυρὰ, μικρά. ῥίζα δὲ ὑπὲρ στρογγύλη ὡς περ βάλανος ἀντιπεπλεγμένης ἀλλήλαις, γευσαμένη στυπικὰς. οὕτως ἐν ἐνανέμοις καὶ συσκίοις καὶ χιονίζομένοις τόποις. *Astragalus paruius frutex est à terra, folijs, & ramis Ciceri similis: flores purpurei sunt parui. Radix autem subest rotunda, vt balanus prægrandis, adnata habens solida, nigra, dura, veluti cornua inter se implicata, gustu adstringentia. Nasquitur in locis vento expositis, umbrosis, & niuosis. Plinius verò aliter habet. Astragalus folia habet longa, incisuris multis, obliqua circa radices; caules tres aut quatuor foliorum plenos, florem Hyacinthi: radices villosas implicatas, rubras, præduras. Eandem plantam videtur descripsisse; differentia est, quia folia habere dicit incisuris multis, quod Dioscorides non tacuisset, & sicut dixit, Ἀσράγαλος ὅμοιος ἐρεβίνθῳ φύλλοις, καὶ κλωνίοις, dixisset, vt in alijs solet, cùm foliorū formam & similitudinem delineare vult, hoc modo: Ἀσράγαλος φύλλα ἔχει ὅμοια, καὶ κλωνία ἐρεβίνθῳ: sed quia plantæ habitum similitudinem Ciceri fecit, non folia Ciceri similia, iccirco ita descripsit: nā foliorum positum, non formam imitari debet. Quare cenfeo vel Plinium ipsum, vel à quo transcripsit, uel aliquem, qui Plinij textum recognouit, Dioscoridis textui similem reddere volentem, verba illa, incisuris multis, addidisse, putantem similitudinem esse in incisuris foliorum Ciceris. Quæ verba abundare puto, & Historiam Astragali in Plinio ita legi debere: Astragalus folia habet longa, obliqua circa radices; caules tres, aut quatuor foliorum plenos, florem Hyacinthi, colore intellige, sicuti idem de Eryngij flore, & Dioscorides, in capite de Antirrhino, Aristolochia, Cnico & similibus: radices villosas, implicatas, rubras, præduras. Et sic planta à me proposita vtrique delineationi respondere*

Tempus.

Locus.

Descriptio.

Lib. 4

Lib. 26.
cap. 8.

Lib. 22.

c. 8.

Vires. dere videtur non solum forma, sed etiam viribus: radices quidem habet stipticas, ut etiam Galenus vult, qui ait. *Astragalus* frutex est parvus radices habens adstrictorias: quamobrem etiam ex numero est non instrenue exiccantium. Nam ulcera vetera glutinat, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plinius huius fruticis proventus est in Pheneo Arcadiae. Dioscorides vero inquit, Sistit radix in vino pota fluentem aluum. Urinas eadem pellit. Facit ad vetusta ulcera sicca inspersa: & sanguinem sistit. Tunditur autem difficile propter ipsius duritiem. Plinius vero. Vis ei ad spissanda corpora. Aluum sistit radix in vino pota, quo fit ut moueat urinam percusso liquore, sicut pleraque quæ aluum sistunt. Sanat & dysentericos in vino rubro tusa. Difficile autem tunditur. Eadem gingivarum suppurationi utilissima est fotu. Colligitur exitu Autumni, cum folia amiserit. Siccatur in umbra. Non sunt igitur Astragalus quæ ab alijs depinguntur, cum uel forma radicum, foliorumue positu ab historia absint. Quæ enim radice Rhaphano similes depinguntur, etsi in alijs responderent, adhuc radice, principali nota differunt. Quæ uero postremo radice balanos imitante describitur, foliorum positu à Cicere longè distat, bina enim tantum habet, atque capreolos singulis petiolis, atque radices non sunt villosæ, sed tantum Cyperi modo inter se cohererent, de uiribus non loquor. Quare si quæ alia, à me proposita respondere videtur in omnibus; etsi etiam aliqui dicant, non habere radicem Rhaphani, quibus respondeo, *ρίζαν ραφάνου*, non *σπογγύλην*, sed *μακράν* esse, etsi nobis nota sit species Rhaphani orbiculati, cuius semina à Ferdinando Imperato habuimus: quod si etiam ita uelint, nihil remanebit contrarium. Sed certè potius legendum censeo, ut Pena & Lobellius animaduertuerunt, *βάλανος*, quàm *ράφανος*, nam in alijs nomenclaturis Ficus terræ, & Glandula inter alias denominatur. Hanc montanam Galegam appellare videtur Plantarum Auctor, sed minus rectè est depicta.



Radix Ideæ Dioscoridis.

Eadem quæ Hypoglosson, Laurus Alexandrina,
Laurotaxa, & Chamædaphne.



RADIX Ideæ, quia plurima in Ida monte nasceretur, uel quia ibi efficacior, primumue cognita, ita à loco denominata est. Plinius eandem, *Ideam herbam*, appellauit: alter à tota substantia plantæ, primus verò à partis in re medica vsu. Ἰδαία ρίζα, ὄξυμυρσίνη τὰ φύλλα τοῖς οἰκίαις, παρ' αὐτὰ δὲ ὡς ἑλικες μικραὶ πεφύκασιν, ἐξ ὧν καὶ τὸ ἄνθος. *Ideæ radix, Rusco similis est folijs, in ipsis veluti capreoli parui enascuntur, ex quibus & flos.* ita Dioscorides scripsit. Quæ ita Plinius transcripsit. *Ideæ herbæ folia sunt quæ Oxymyrsmes: adhærent his veluti pampini in quibus flos.* Cuius plantæ natales, & delineationē cum sæpe mente reuoluissē, difficilē cōtingere posse; ut ante oculos planta Rusco congener, uel similis, mihi sese offerret, opinatus sum: præsertim cum & tot uiri indefessi innumerabilem ferē plantarum numerum exhibuissent, non solum nostrō cælo orientium, sed & ab extremis orbis oris aduectarum: in quibus nullam reperi, quæ Rusco esset affinis, præter hanc quam depictam exhibeo. Quæ cum natalibus, forma, & uiribus quadrare uideatur, hoc nomine Ideæ radice insinuari eam debere iudicaui. Radicem quidem habet Rusco similem, maiorem uerò, à qua plures turiones Asparagi, uel Rusci modo exeunt cibo apti, qui postea in uirgas distenduntur cubitales ferē, uel cultu maiores, læues, uirides, flexibiles, à medio ad summum usque folia habentes forma acutæ Myrto, Rusco scilicet similia, [nulla quidem alia est Myrtus sylvestris apud Dioscoridem, atque Plinium, præter hanc μυρσίνη ἀγρία, & ὄξυμυρσίνη, à Romanis eandem Ruscum dictam, ut idem Dioscorides ait; & Plinius etiam testatur à Castore Oxymyrsinē Ruscum appellari, inter quas nominis tantum uarietas est, etsi Plantarum historiæ Auctor aliter somniet.] maiora uerò & forma

Nomen,
& Ety-
mon.

Lib. 27.
c. 2.

Descrip-
tio.

Lib. 4.

Lib. 27.
c. 11.

Forma.

Lib. 23.
c. vlt.

Ἰδέα Πίσκ.
ὑπόγλωσσον.

Radix Idææ
Hypoglosson, &c.



forma parum angustiore, ad nouella Rusci folia accedentia, viridiora, & molliora; nec ita pungentia, ethi acuta sint; alternatim virgas circundant, sed quæ proximiora sunt terræ, Rubiæ modo terna circum virgas hærent. In ipsis folijs viticulæ parux, seu petioli, (quos *ελιες* appellari aliàs docui, ab Auctore plantarum perperam *λωπιδες* putati, verborum proprietatem suæ opinionis improprietate extorquente, vt planta ab ipso depicta Hypoglosson videri potuisset, vt infra dicam.) enascuntur tenues, breues, sed Rusco longiores, in quorum extremo Vere flos exit herbaceus, stellatus, sex foliolis constructus, medium habens purpureum, non dissimile Rusci flori: fructum edere minimè vidi, sicuti & amici multi, qui plantam viginti annis coluere, nec unquam nisi florem edere animaduenterunt. Quod solo, & cælo imputandum est, alibi enim fructus perficere rubros Ciceris magnitudine, vt Ruscus asseritur. Quare non mirum si florem tantum huius descriptionis Auctor edere tradidit, nam & forsân nec idem vidit, nec descripsit, vt in Dictæno & Nardo montano, & similibus quotannis fructus cum flore edentibus, obseruatur. Idem dicendum de ligula è folio exeunte, quam etiam alios non obseruasse demonstrabo: quilibet enim notam, quam magis illi propriam iudicauit, historiæ mādauit. Iccirco euenit, vt planta à diuersis scriptoribus delineata, diuersis notis, nominibus, sicuti & viribus comprehensa conspiciatur, & tamen eadem describi certò constat. Cognita igitur plantæ forma, vires sunt denique conferendæ: & certè gustu acerbam esse atque subamaram percipitur, non sine calefaciendi facultate: quibus mixtam qualitatem ac vim habere conspicitur. Recentiorum experimento constat. *Vuularum, gut-*

turis, tonsillarumque tumores, ac earundem ulcerationes, huius plantæ gar-
garizatu sanari. Marcellus scribit, in Italia plantam hanc puerorum collo suspendi ad ruam reprimendam, quo ad ruam prolapsam contrahendam vsu, *Vuulariæ* nomen vulgò est adepta. Matthiolus, & sequentes scribunt, Puerorum hernias prolapsas contrahi experimento constare, si puluis radice huius cochlearis mensura cum maioris Symphyti decocto hauriatur, & fascia hernia constringatur primis diebus, ne rursus foras intestina prorumpant. Ex quibus magnam constringendi, atque siccandi habere facultatem, sicuti Dioscorides habere ait, constat. *Huius radix vehementer adstringit, conueniens in his quibus adstri-*

In descri-
ptio. Iso-
pyri.

Vires.

- Lib. 27. Etione opus est. Bibitur etiam ad alui fluxiones, & fluxum muliebrem, om-
 c.2. nēmque sanguinis eruptionem sistit. Plinius verò habet, Ipsa aluum,
 mensesque, & omnem abundantiam sanguinis sistit, spissandi cohibendique
 natura. In quibus, menses, pro mulierum fluxu transcripsit, ἔμμη-
 νια, pro σπυγδαίων. Galenus sic, Idæa radix gustu admodum acerb-
 Lib. 7. de ra, est; ac si opere periculum facias, eandem vim præferet, nimirum sanguinis
 simpl. est; ac si opere periculum facias, eandem vim præferet, nimirum sanguinis
 med. fac. profluvia, alui fluxus, dysenterias, profluuium mulierum, & quæcunque
 eius sunt generis, tum pota, tum foris imposta curans. His verbis vide-
 tur Galenus sicut & in alijs multis, Idæam radicem non cogno-
 uisse; cum taceat vim calefaciendi, & frigefaciendi, quarum
 aliqua præditam esse hanc plantam necesse est: nec quo ordi-
 ne, siue excessu, scribat, ut in alijs solet, calefaciat, refrigeret,
 & an moderata sit, vel contrarijs constet facultatibus. Sed quæ
 à Dioscoride dicuntur, transcribat verbis generis. Hanc no-
 strates vulgò etiam *Bislinguam* appellant, à ligulis folijs hæreti-
 bus nomine sumpto: quam eandem veteres, Dioscorides, & qui
 Lib. 8. de sequuti sunt ipsum, Galenus, & Plinius, *Hypoglossum* etiam ap-
 simpl. pellarunt, quia ut Galenus ait, ita nominatum est, quia propagines
 med. fac. paruarum linguarum sub summis corymbis producit. Pro quâ Plantarū
 hist. Auctor, non hanc *Bislinguam*, & *Vuulariam*, sed *Polygo-*
 nati, siue *Sigilli Salomonis* vulgò dicti, plantam congenerem de-
 pinxit à Carolo Clusio primū delineatā: atque in ea est opi-
 nione, ut *Hypoglossum* ab *Hippoglossō* differat, atque plantam
 illam verum esse *Hypoglossum* affirmat; inque doctiores insur-
 gens, malè illos *Hypoglossi*, & *Hippoglossi* etymon intellige-
 re asserit. Atq. talem sustinens sententiam, potius Diosc. textū
 in maioribus emendare voluit, sensus, verbæque cōuertens, quā
 Plinij, vel Diosc. textus unius duarūmve literarū immutatio-
 ne corruptos dicere, vel potius veriūsq. Dioscoridis *Hippo-*
 glossum à Plinio *Hypoglossum* appellatū. Nulla quidem alia in
 ter illorum historiarum est differentia; nihilque ad plantæ cogni-
 tionem facit, ut ἵππο, vel ὑπό, dicatur: cum utrique nomini
 eadem planta aptari possit, eadēque erit: ut scilicet *Hippo-*
 glossum, à foliorum magnitudine, magnam linguam referens
 dicatur. *Hypoglossum* verò à ligulis folijs hærentibus, ὑπό
 Lib. 27. scilicet γλώσσης. Neque in re alia nota est priuata, qua possint
 c.11. differre inter se, ut ex Plinij textu liquet, ait enim *Hypoglossa* fo-
 lia habet figura sylvestris *Myrti* concava, spinosa, & in his ceu linguas, fo-
 lio

lio paruo exeunte de folijs. Et Dioscorides, & in summo veluti ligulas in folijs. Cuius rei Galenus etymon affert, *Hypoglossum* ita nominatum, quia propagines paruarum linguarum sub summis, corymbis producit. Quibus, etsi textus in aliquibus uerbis uariant, non ideo colligitur diuersas esse plantas: sed scimus, alterum ab altero exarasse, eandemque plantam omnes designare uoluissent. Et si credendum est, ut verum esse censeo, quod ratio demonstrat, doctissimo cuidam medico Germano, qui in Dioscoridē Emblemata scripsit, qui ait se textum habere Dioscoridis uetustum, in quo ὑπόγλωσσον legitur, pro ἰππόγλωσσον: atque plantæ conuenire nemo dubitat: & quamuis corruptè legatur in aliquibus ἰππόγλωσσον, pro ὑπόγλωσσον, non ideo diuersas plantas, ac descriptiones esse censendum est, præsertim cum tam clarū Galeni textum habeamus, in quo ut dixi, huius nominis ὑπόγλωσσον, etymon affert. Immo addo & hanc sententiam, à qua non discedam, donec plantas uidero diuersitatem testantes, nam quæ ab alijs depinguntur, fictitias esse, non dubito; non enim plantarum diligens affertur delineatio, nec locus, nec unde sint aduectæ refertur: præterea non omnes plantarum collectores illas habere icones, & quæ depinguntur ab alijs iconibus exceptæ sunt: & quod fortius, doctiores Scriptores nullā de illis habere rationem uideo. Quare etiam *Hypoglossum*, *Laurum Alexandrinum*, *Laurotaxum*, & *Chamædaphnen*, eandem esse plantam cum superiore censeo; nec nisi nominum diuersitatem habere, à Scriptoribus diuersis impositam, quam Dioscorides, & qui sequuti sunt eum, non animaduertisse ostendam. Foliorum forma *Lauro* similis, *Lauri* nomē plantæ huic indidit, non quidd ex *Lauri* genere esset: & ut aliqua ostenderetur differentia inter hanc, & *Laurum*, *Alexandrinum*, & *Ideam* *Laurum* à loco in quo nasceretur, appellarunt, sicuti & *Radicem* *Ideam*, vel *herbam* *Ideam*, ut *Plin.* habet atq. alij quia humilis esset, *Chamædaphnen*; alij à fructus forma & colore *Laurotaxum*, ut à *Plinio* refertur: & quia fructum folijs interceptum habet, *ἐπικαρπόφυλλον*, & *Carpophyllum*: alij verò quia ligulam è medio folio exire animaduertenterunt, *Hypoglosson*, & *Hypoglotton* appellarunt. Hoc demonstratur, nam quæ *Laurus Alexandrina* dicitur, ab eodem Dioscoride, & *Plinio* *Hypoglotton*, pro *Hypoglosson* Atticè: ex quibus synonyma esse clarè colligitur. Sed

Lib. 4.
Lib. 8. de
simpl.
med. fac.

- & Chamædaphnen Laurum Alexandrinam appellari, idē Dioscorides testatur in cap. de Chamædaphne: atque ita esse, non tantum nomina synonyma, sed & plantæ delineatio demonstrat: sed insuper virium potestas, ut inferius dicam. Lauri igitur
- Lib. 3. Alexandrinæ descriptio, (ut ab antiquiore & veluti fonte, Theophrasto inquam, initium ducam, purius quidem plantas descripsisse nemo dubitat) hæc est. Illa quoque propria esse circa Idam feruntur, *Laurus Alexandrina* cognominata, & *Ficus* quædam, vitisque. Lauri proprium, quod fructum super folia gignit, quemadmodum *Myrtus sylvestris*: quippe ambæ fructum super dorsum folij ferunt. Et alibi. Fructiferæque nonnulla fructum folijs interceptum gerentia, ut *Laurus Alexandrina*, quæ fructum super folio gignit. Nota quidem priuata plantæ huic uidetur, ut *ἐπιφυλλόκαρος* sit quemadmodum *Ruscus*: quibus aliam similem plantam nec Theophrastus descripsit, nec unquam vidisse scio aliquem. Quæ nota expressa diligenter videtur à Dioscoride in capite Lauri Alexandrinæ, his verbis: *καρπὸν ἐν μέσσοις, folijs intellige, ἐρυθρὸν ἐραβίνθου τὸ μέγεθος, fructum in medijs folijs, rubrum Ciceris magnitudine*, & in capite Chamædaphnes: *καρπὸν περιφερὴ ἐρυθρὸν, τοῖς φύλλοις ἐπιπεφυκόμενα. fructum rotundum rubrum, folijs innatum. Quibus minimè arridens obseruantior scriptor, cum Rusco essent communia; magis priuatam notā, sicuti nomenclaturam tribuit huic plantæ, & relicta descriptione fructus, foliolum, ligulam scilicet his verbis habere tradidit. καὶ ἐπ' ἄκραν ὥσπερ γλωττὶς ἀπὸ τοῖς φύλλοις. Quæ Plinius vertit, Et in his ceu linguas, folio paruo exeunte de folijs. Et idem de*
- c. 11. *Lanrotaxa* loquens, ait: *Excrecente in medio folio paruulo, veluti lacinia folij. Quam ligulam etsi in Rusco consideremus, illā non ligulam folij, sed veluti folliculum floris esse censetur: atque ita nulli competere plantæ ligulam hanc adhuc est cognitum.*
- Lib. 4. Dioscorides verò, *Laurus Alexandrina*, quam aliqui *Idæam*, &c. folia habet similia Rusco, maiora verò, molliora, & albidiora: fructum autem in medijs folijs rubrum, magnitudine Ciceris: ramos à terra pedales, vel maiores. Radicem admodum similem Rusco, maiorem, bene olentem, atque molliorem. Nascitur in montanis locis. Ex quo Plinius, Est & Chamædaphne sylvestris frutex, est & Alexandrina, quam aliqui *Idæā*, alij *Hypoglotton*, alij *Daphniti*, alij *Carpophyllon*, alij *Hypelaten* vocant. Ramos spargit à radice dodrantales, topiarij ac coronarij operis, folio acutiore quam *Myrti*, molliore, candidiore, ac maiore, semine inter folia
- c. 17. Lib. 1. c. 16. Lib. 27. c. 11. Lib. 15. c. vlt. Lib. 4. Lib. 15. c. vlt.

lia rubro. Plurima in Ida & circa Heracleam Ponti, nec nisi in montosis.

His respondere videntur Chamædaphnes descriptiones: Dioscorides verò ait, Chamædaphne, quam & aliqui Laurum Alexandrinam vocant, virgas producit cubitales, rectas, tenues, & læves. Et hu-

Lib. 4.

ius folia similia Lauro, læuiora multò & viridiora: fructum rotundum, rubrum folijs innatum. Ex quibus Plinius. Chamædaphne vnico ramulo est, cubitali ferè, folio tenui Lauri similitudine: semen rubens annexū

Lib. 24.

c. 15.

folijs. Ab his non differunt, quæ de Laurotaxa, inquit Plinius.

Lib. 15.

Accedit in topiario opere Taxa, excrecente in medio, folio paruulo

c. vlt.

veluti lacinia folij. Quæ eadem est cum eiusdem Hypoglossi.

Lib. 27.

Hypoglossa folia habet sylvestris Myrti concana, spinosa, & in his ceu linguas,

cap. 11.

folio paruo exeunte de folijs. Quam Dioscorides ita ante descri-

Lib. 4.

pserat. Hypoglosson frutex paruus est Rusco tenui folijs similis: comam

verò habet spinosam, & in summo veluti ligulas in folijs. Cuius etymon

Lib. 8. de

affert Galenus, Hypoglosson inde adeò nuncupata est, quòd summis co-

simpl.

rymbis veluti ligulæ quædam exeunt. Quibus omnibus delineatio-

med. fac.

nibus plantam, quam Hypoglosson, siue vt vulgò dicunt Bislin-

guam respondere demonstrabo. Planta igitur hæc, non solùm

oritur in Ida & Heraclea Ponti, vt ait Plinius, sed vt refert Lo-

bellius, in montosis, saxosisque & asperis incultis Genuæ, por-

tus Lunæ, Sauonæ, Nicæ, aliisque Alpiniis sterilibus calidorum

tractuum: radicem habet Rusci modo, maiorem, bene olentē,

albam, & molliorem, vt Dioscorides ait in capite Lauri Ale-

xandrinæ: à qua primùm teneri stolones exeunt Rusci & Aspa-

ragorum modo, qui edi possunt, vt Galenus ait in capite Cha-

mædaphnes, acerbi quidem sunt & subamari non ingrati, qui

Lib. 6. de

postea in virgas distenduntur pedales, & cubitales, ideòq. Cha-

simpl.

mædaphne dicitur: singulares, sine ramis, ideòque Plinius, ait,

med. fac.

de Chamædaphne loquens vnico ramulo est. tenues, læues, flexi-

biles, topiario & coronario operi aptas, vt idem Plinius ait de

Lauro Alexandrina & Taxa loquens: in quibus folia sunt for-

ma foliorum Rusci nouelli, cuius folia angustiora sunt, sed hu-

ius maiora sunt, atque forma oblongiore, tam Rusci, quàm Myr-

ti, Laurinis similia: albidiora verò, & molliora vt parui Rusci

folia, quibus Dioscorides comparat, quæ molliora & albidio-

ra, læuioraque sunt Laurinis, vt idem Dioscorides ait. Virgis

hærent folia à medio ad summum terna primùm, deinde singu-

la alternatim: quarum alia ligulas habent terram versus, alia

in

in cœlum suspicientiâ, quarum causa, ὑπὸ γλαυκῶν dicta fuit: omnia verò acuta sunt, sed non ita spinosa vt Rusci: ex medio & dorso folij, vt Theophrastus, Dioscorides, & Plinius, dicunt, sed etiam ex ligula, vt in Rusco ferè visitur, flores exeunt Rusci modo; quibus fructus succedunt rotundi, rubri, magnitudine Ciceris, Rusco similes, vt omnes aiunt, singuli vel bini, singulis folijs, petiolos habentes tenues, atque breues, sed singulorum fructuum intellige: qui verò bini simul visuntur fructus, horum singuli longiorem habent petiolum. Vere floret, fructus adhuc edere non vidi, serò fructus edit: sed illos habere dixi aliorum scriptorum sententia, qui videre potuerunt. His igitur sic cognitis, & descriptiones omnes sibi ipsis, & plantam illis omnibus respondere ostendi, quare formæ facta collatione, virium potestatem demonstrandam suscipio, vt scilicet mixtam habeat facultatem, atque præter siccandi & adstringendi facultatem, calida sit, acris amara vt gustu percipitur, quare digere-

- Lib. 6. de simpl. med. fac. Ibidem.* re, incidere, discutere, aperire, & mollire poterit. Galenus verò ait, *Daphnes herbae, quam, & Daphnen Alexandrinam* appellant, *temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul est, & subamara, potaque tum vrinas, tum menses prolicit.* Et porro *Chamædaphnæ* germina tenera edi quoque assolent. Est autem persimilis viribus *Daphnæ Alexandrinæ, &c.* De Hypoglossò verò. Cæterum radix & succus fructicis emolliendi vim possident, sicuti Dioscorides etiam ait: effectus verò harum facultatum eisdem esse illos conferendo demonstrabo. Lauri *Alexandrinæ* hæ sunt vires apud Dioscoridē. *Vim habet radix pota sex drachmarum pondere cum vino dulci, auxiliani di difficulter parientibus, & vrinæ stillicidio. Ducit etiam sanguinem.* Quæ ita Plinius. *Laurus Alexandrina siue Ideæ partus celeres facit* *Lib. 23. c. 8.* *radice pota trium denariorum pondere in vini dulcis cyathis tribus: secundas pellit, mensesque eodem modo pota.* Quibus similia de *Chamædaphne* idem tradit: *Menses succuse eius, & vrinam ciet potus partisque difficiles in lana appositus: quæ Dioscorides, Succus cum vino potus, menses & vrinas ducit. Idem facit & in pecto appositus. Item* *Lib. 24. c. 15.* *Huius folia trita; emplastri modo imposita capitis doloribus, & stomachi ardoribus auxiliantur. Quæ Plinius, Illinitur capitis doloribus recens. ardores refrigerat; Quibus Hypoglossæ vires respondent, Videtur,* *Lib. 27 c. 11.* *inquit Dioscorides, coma amuletum esse vtile caput dolentibus. Quæ Plinius, capitis dolorem corona ex his imposita minuit. Præterea ad tor-*

*mina cum vino bibitur, & Dioscorides, Eadem pota cum vino tormina sedant. His respondentes vires à recentioribus cognitæ sunt. Bilingua epota difficulter parientes adiuvat, menses ciet, calculos pellit. Item Cordus ait, radicem siccam etiam bubones in peste maturare certissimis vulgi experimentis. Item Folia, radixque vna, gutturis ac tonsillarum tumores, ac earundem ulcerationes gargarizatu sanant. Scribit Marcellus, in Italia plantam istam puerorū collo appendi ad vnam reprimendam, quo ad vnam prolapsam contrahendam vsu, Vulariæ nomen est adepta. ac etiam hernias contrahere protuberantes puluerem cum decocto Symphyti haustum Matthiolus scribit. Quibus nō minus Hypoglossi, quā Lauri Alexandrinæ & Chamædaphnes dictæ, vires referre cognitum est, mixtam namque facultatem habere perspicitur effectu, atque gustu, folia quidem acerbamultò esse, sicuti & radix, atque acrimonia participare. Quare mea sententia videtur non sine ratione adducta. Valerius Cordus uir doctissimus animaduertit etiam, atque in ea est opinione, vt Hypoglossum & Laurus Alexandrina eadē plāta sit, quam etsi plantarum Auctor reijcere conatus sit, non tamen suum consequutus est finem. Non est radix Idæa, quæ ab alijs ponitur, nullam enim habet cum Rusco affinitatem. Non est Laurus Alexandrina quæ ab alijs præter Fuchsum depingitur: nam uel fictitia, uel non respōdens est, nec Chamædaphne, cum non habeat fructum folijs innatum, *ἐπιτεκνύται* scilicet, vt Dioscorides ait.*

Sideritis tertia Dioscoridis.



SIDERITIS, & hæc ideo dicta fuit, quoniā, *Nomen.*
 vt Dioscorides ait, *ταύτης, δυνάμεις ἐντισθενός, & Ety-*
καλῶν τιμὴν ἐν αἵματι, καὶ νεοτρώτων: ferruminandi sci
mon.
 licet uim habet recentia, & cruenta uulnera, *Lib. 4.*
 ferro facta, quod *αἰδῆπος*, dicitur, indēque *σι-*
δῆρης dicta. Planta hæc radicem habet fibro-
Forma.
 sam, nigram foris, intus albescentem, ex qua
 multa folia, decem, plus, minúsue exeunt rotundo ambitu, sed
 quinque partita, veluti Geranij columbini dicti, profundiori-
 bus lacinijs, Coriandri folia, antequam caulem edat, satis for-
 ma, & læuore referencia, duriora verò, atque maiora duplo,
 quando-



quandoque magis circumferrata: supernè atrouirentia, infernè verò ex viridi albescentia, politioraque) ex singulis petiollis tenuibus dodrantem altis, vel minus, ex viridi albescentibus in summo; contrà verò rubescentibus, è radice simul prodeuntibus; à qua etiam, & ex medio foliorum plures caules, ali quando vnicus, præsertim ex nouella planta, exit admodum Sideritidis secundæ, Pimpinellæ nobis vulgò dictæ, cauli similis, læuis, rotundus, striatus, eodem colore purpurascente, quandoque parum folia superans, cultu verò, & locis pinguioribus bipedalis; unica, uel duobus alis diuisus, ex folijs, quæ cauli hærent, exeuntibus: in quorum summo, & caulis ueluti corymbi, quatuor exeunt pedicelli, vnicus in medio existēs breuior: reliqui tres triangulum effigiant: singuli tres florum corymbos habentes: medius verò vnicum, & maiorem. Flores parui admodum sunt, atque antequam pandantur villi, purpurascentes, postea verò albescentes, multis purpureis staminibus duriusculis, tactu etiam asperis ornati: ex quorum mixtione puniceus color oculis redditur. Gustu sunt ex dulci, amari, astringentes; non dissimiles Sideritidi secundæ Dioscoridis. Hi uerò amplius quid aromatis continere palato percipiuntur. Aprili & Maio mense floret: Iulio perficitur semen asperum, atque hirsutum. Frequens hîc est secus vallium, colliumque uias umbrosas supra tophos muscosos, & parum terræ habentes oriens. Hæc satis uidetur mea sententia Dioscoridis delineationi respondere, qui ait. Ἐν τι καὶ ἑτέρα εἶναι λέγεται σιδηρίτις, καὶ καὶ αὐτὴν Κρατέως ἡράκλειαν καλεῖ, φουρδύην ἐν τοίχοις, καὶ ἀμπελῶσιν, ἔχουσα φύλλα πολλὰ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης, ὅμοια κοριάων περὶ καυλίοις σπιθαμιαίοις, λείοις, πρυφεροῖς, ὑπολευκοῖς, ἐναρθεύουσιν. ἀνθη δὲ φοινικὰ, μικρὰ, γενομένη πικρὰ, γλίχρα. Præterea aliam Sideritidem esse tradunt, quam Crateus heracleam vocat, in muris & vinetis nascentem, folijs ab vna radice multis, Coriandro similibus, circa caules pedales, teneros, læues, subcandidos, atque rubicundos: flore puniceo, paruo: gustanti amaro, & glutinoso. Quæ cùm forma, & sapore similis videatur, viribus etiā respondere censeo. Sed certè huius vires non solum Sideritidi pares, sed etiam maiores esse, illis à Dioscoride eidem tributis, recentiorum experimento constat, unde apud Gallos uulgatum est Adagium de plantæ huius uiribus, aiunt enim. *Qui Saniculam habent, (sic eadem appellant) Chirurgus non eget.* Dio-

Tempus.
Locus.

Lib. 4.
Descriptio.

Vires.

scorides has vires Sideritidi tertiæ tribuit, *Et huius impostæ vis est, ut cruenta, & recentia vulnera glutinet*. Lobellius uerò, *Internis & externis ulceribus, sanguinis eruptionibus, dysenterijs, ruptis, rulsisque auxiliatur decocta, pota, atque imposita*. Quare nomen illi antiquius reddendum duxi, cum forma satis, atque uiribus tertiam Dioscoridis Sideritidē præ alijs referat, eadēque iudicanda sit. Non est Sideritis tertia Robertianum Geraniū, & si ad uulnera ab eodem sit commendatū, in folijs enim caule, totāque planta hirsutiae obducta est semper, contra Dioscoridis sententiam, qui ait, *καυλίοις σπιθαμιαίοις, λείοις, στυφεροῖς*, &c. Præterea nullam Dioscorides plantam Coriandri folijs hirsutam describere uidi, non addita hirsutiei differentia: item Geranij folia multum sunt incisa, propius Anemonæ, quam Coriandro similia, quamuis Anemone sit Coriandri folijs, sed Dioscorides hoc animaduertit, dicens: *φύλλα δὲ κοριοειδῆ ἢ λεπτοχί- δέα*, &c. ut etiam in alijs, atque hîc dixisset, cum profundis lacinijs sint admodum diuisa, & Geranio bulbofo primo Dioscoridis similia: quod Anemones folia habere tradit, non Coriandri: primò quidem Anemones descriptionem tradiderat, folijs multum incisis, ut supra dixi. Nec etiam flores Geranij sunt amari, nec glutinosi, neque in illis quicquam simile sapore & gustu inesse percipitur, ut multis ostendi. Præterea rostrum Gruinum habet, quod Dioscorides sicut in secundo Geranio, ita & hîc descripsisset; qua nota facilius nobis demonstrasset, cum illi sit priuata nota, & congeneribus. Non possumus plantam à Matthiolo depictam recipere, cum adhuc nec aliquis nisi depictam illam uiderit, Ranunculi faciem habentem: omnesque censent, ex plantis commentitijs ad eum misis ab adulatoribus, illusoribusque amicis esse, quas nec ipse fidelis addiscens uidere, atque considerare quæsiuit.



Tragium

Tragium alterum Dioscoridis .

TRAGII nomen adepta est planta hæc, eo quòd, ut idem Dioscorides ait, *προβάλλει κατὰ τὸ φθινόπωρον τὰ φύλλα τράγου ὁσμῶν, ὅθεν καὶ ὠνόμασαι τράγιον*. Emittunt Autumno folia hirci odorem, unde & appellatū est Tragium. Differt à primo Tragio, nam illud non hirci uirus olet, sed ita dictum fuit, quia Capræ sagittis confosæ, illius pabulo spicula è uulnere excutiunt, notamque priuatam habet, vt lacteum succum gummi non dis similem habeat, & quòd in Creta tantū oriatur. Sed Theophrastus de eodem loquens, alterum uerò non cognouit, hæc ait. *Habet verò lacrymam & Ixia, quæ in Creta nascitur, & Tragacantha dicta. Hæc antea nasci tantū in Creta putabatur, nunc verò in Achaia etiam, Peloponnesi, aliisque locis, & Asiæ circa Mediam comperiri certum est, & alibi, Tragacantha largè in Arcadia nascitur, nec deterior Cretica existimatur, sed etiam visu pulchrior, & alibi, Ergo quibusdam spontè succus consistit, spissaturque lacrymæ modo, vt in Tragacantha appellata: hanc enim cedere opus nequaquam est. Ex quibus suspicio est eandem plantam esse Tragium & Tragacantham, quam Gaza, Hircispinam uertit de qua aliàs. Huic uerò Plantæ notæ sunt* inquit Dioscorides: *Τράγιον ἄλλο τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια σκολοπενδρίῳ, πλὴν δὲ λεπλῶ, λευκῶ, παραπλησίαν ραφάνῳ ἀγρίῳ*. Tragium alterum folia habet similia Scolopendrio, radicem tenuem, albam, persimilem Rhaphano syluestri. Cui descriptioni plantam à me propositam respondere demonstrabo: quæ radicem habet Rhaphano syluestri similem vel Pastinacæ erraticæ, pede longam, minimum digritum crassitie æquantem, albam, raris fibris diuisam: folia emittit petiolis ex aduerso hærentia quaterna, & in extremo unicum, Sideritidis secundæ Dioscoridis modo, Pimpinellæ vulgò nobis dictæ; (ob cuius similitudinem, & hanc Pimpinellam hircinam uocant) rotundiora, atque magis & profundè diuisa: sed si femine seras, primū bina emittit folia singulis petiolis hærentia, rotunda Coriandrinis similia, deinde bina singulis petiolis, & postremò quaterna sibi ipsis aduersantia,

Lib. 4.

Lib. 9.
c. 1.Lib. 9.
c. 15.
Lib. 9.
c. 8.Lib. 4.
Descrip.
tio.

Forma.



in quorum extremo unicum inest. Caules emittit tenues admodum, pedem & sesquipedem altos, binis, ternisue geniculis interceptos, ex quibus folia admodum tenuia exeunt: in summo uerò eorum umbellæ insunt floribus refertæ albis, quibus succedunt semina oblonga similia Aniso, sed minora multum; colore ad uiridem tendentia, atque hirsuta. Floret Aestate, Autumni initio semina perfecta inueniuntur. Oritur in Montibus, saxis, & locis terrenis: in monte Diuæ Mariæ Virginis appellato excelsio & frigido frequens. Folia confricata uirus olent hirci, sicut tota planta. Gustu acri, atque *πικρῷ*, non solum Autumni tempore, sed semper. Quare fieri potuit, ut Dioscorides, uel is à quo transcripsit, plantam hanc Octobris mense uiderit, tunc enim hîc sine umbellis, & caule corrupto inuenitur, noua erumpens folia, quo tempore magnam habere cum Scolopendrij folijs similitudinem conspicitur caule existens uidua: atque ita eo tempore tantum folia naribus admodum, atque ignorans, an toto anno eundem remitteret odorem, tempus Autumni tantum, quo ipse inuenit, atque considerauit, (ut in alijs multis, quæ sine caule, & sine flore descripsit) posteris tradidit. Eo enim tempore propter humoris abundantiam folia magis uirus olent, sicuti in planta Androsæmo uerius putata, Siciliana dicta simili, & congeneri, obseruatur, cuius folia quæ iam siccari incipiunt, non hirci uirus, sed uini odorem remittere uidentur. Obstaret plantæ huic aliquorū sententia forma foliorum, quam dicunt non esse Scolopendrij folijs similem: quam sententiam ita reiiciendam duxi. Asplenium folio constat Polypodij diuisura, quod est Filici simile Dioscoridis sententia: sed axioma est, quod ea quæ uni dato sunt similia, ad inuicem similia esse dicuntur: ergo non ratione & similitudine necessaria, plantæ huius folia sunt Aspleni folijs similia, cum Filici Polipodium sit simile, atque idē Dioscorides Filici Sideritidem secundam, & Trichomanes comparat: quod utrinque folia ex aduerso posita Lentis similitudine habere ait. In Sideritide ait φύλλα ὅμοια τοῖς τῆς πέριδος, quia sola diuisura similia sunt: In Trichomane, *τριχομανές*, & c. ἕμοιον πέριδος, quia & foliorum substantia & diuisura Filici est simile: ut & *δρυοπέρης ὅμοια πέριδι*, non φύλλα ὅμοια σκολοπενδρίῳ, ut hîc; quod tantum de foliorum diuisura est intelligendum, ut de Sideritide

secunda

Tempus.
Locus.

secunda dixi, quibus foliorum Filicis figurā repræsentat vtrinque digestorum: longaque differentia est inter habere folia similia Scolopendrio, Scolopendrij scilicet folijs, & similem esse Scolopendrio; quod ultimū de substantia & forma totius plantæ intelligitur, vt dixi de Dryopteride, & Trichomane. Ob stare dicūt aliqui quod de Filice fœmina Dioscorides scripsit, *φύλλα περίδι ὅμοια*, & tamen substantia & foliorum diuisura similis est Filici mari: ad quod respondere pro me Dioscoridem dico, & sic. Filix fœmina quamuis mari similis sit substantia & diuisura foliorum: positum tamen foliorum ualde dissimilē habet, nam fœmina est ramosa, & non uno petiolo constat, ut Filix mas, sed pluribus alis; ideoque cūm plantæ maximē similitudine foliorum & diuisura dignoscantur, maiori nota, qua facilius dignosci poterat, descripsit: atque folia similia Filici habere ait, cūm plantæ habitu differret: ramorū scilicet multitudine. Præterea Rhaphano similem radicem, nullam ex Filiceorum genere plantam habere adhuc compertum est, sed obliquam, ut Polypodium; reliquos verò capillares. Nec de floribus est dubitandum, ut aliqui dicunt, qui à Dioscoride tacentur, nam hoc fuit, quia eo tempore caule & floribus uiduam plantam conspexit, quod multis plantis euenit, quorum flores non descripsit, & tamen illos habere certò scimus: aliquibus penitus abstulit; illasque flore carere dixit: atque hīc etiā oportebat ut flores negarentur scribere, & hanc flore carere, si flores non emitteret. At potiùs credendum est plantam hanc à notiore nota describere uoluisse, ut facilius cognosci posset, à forma & diuisura foliorum, & ab hirci olentia. Quibus sic cognitis, iam uidetur planta a me proposita dubijs soluta Tragij nomen assequi debere: cuius uires Dioscorides ita expresit: *Hæc radix scilicet, siue cruda, siue cocta edatur, dysentericis opitulatur.* Quam uim recentiores, quia ad id non commendatur planta hæc, negant habere: tantū agnoscunt, ad calculos frangendos aptam esse, & urinas eliciendas: atque ob id contrariā potiùs dysentericis iudicant. Sed si consideretur plantæ substantia & qualitas, gustu percipietur acrimoniam quandam habere cum quadam odoris grauitate, & adstrictione non carere: qua dysenteriam prohibere poterit, præsertim si uiscerum imbecillitate proueniat, (multæ namque sunt causæ) corroborās iecur,

Vires.

iecur, & infirmas partes per urinam euacuans, & siccans diuer-
tensque humorem adstringere fluxionem, vt etiam in Alisinate
euenire censeo, quod acrem uim obtinet, atque Dioscorides ad
dysenteriam facere Dauci pari parte admixta ait: cuius etiam
uis est acris, atque præsertim urinam mouens. Quam faculta-
tem etsi recentiores non sint experti: Galenus non denegat, at-
que propter adstrictionem quam habere plantam ait, posse dys-
enteriam & similes fluxiones sistere. ait enim de utroq. agens.
Tragij folia, fructus, lacrymæque trahentis, & digerentis sunt facultatis.
Est verò tenuium partium, & facultate in principio tertij ordinis calida.
Stipites, & hærentia corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet,
drachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur Tragion lentisco
simile. Cæterum alterum Tragium hoc minus, cuius folia Scolopendrio sunt
similia, visitur quidem multis locis: sed non parum habet facultatis adstrin-
gentis: vt ad fluxionum affectus conueniat. Et sic vi calidæ facultatis
poterit incidere, & abstergere, calculos minuere, & vrinam no-
uere; siccantis & adstringētis, Dysenteriam & alias fluxiones,
à contraria causa effectas emendare. Quorum exempla non
pauca apud Dioscoridem & Galenum extant, vt eadem calcu-
los frangant & menses moueant, eadēque Dysenteriam, &
Diarrhæam sistant propter adstringentem facultatem, calidæ
ui mixtam. Sed hæc medicis sunt relinquenda. Est & altera plā-
ta Tragium appellanda, quæ parum à prædicta facie disfidet,
sicuti nec uiribus. Folia quidem prima ab radice superiori si-
milis in singulis petiolis rotunda, læuia Coriandrinis proxi-
ma, deinde laciniosa efficiuntur, atque bina singulis petiolis
conspiciuntur, tertiò quaterna, postremò sena, sed in omnibus
unicum folium est in extremo rotundius, atq. maius, Pimpinellæ
dictæ modo sed maiora: caulē emittit Fœniculi modo cauū,
læuem, alis diuisum singulis geniculis, crassiorē superiore, um-
bellas & semen non dissimile, quæ Aestate perficiuntur. Huius
semina à Ferdinando Imperato, atque spontē ortam ex insula
Capreis aduectam habui. Radicem & semina si gustaueris, acri-
moniam & odorem hirci, vt superior habere cognosces: folia
uerò minimè *παραζωοτα* obseruabis, nec aliquo tempore. Nō est
Tragium alterum Lunaria botrytis dicta, nā non nisi unicū fo-
lium habet, si Scolopendrio similis esset, non radicem albam,
sed nigram, nec Rraphani syluestris magnitudinem æquantē,
non

Varietas

non esui aptam, nec hircinum odorem remittit, ut Pena etiam animaduertit. Nec planta illa exotica, in appendice Histor. Plantar. depicta. quæ & Sucudus Auicennæ dicitur capitulis thymi modo: nullum quidem hirci odorem referunt habere.

Epimedium Dioscoridis.

Nomen,

Lib. 7.

c. 8.

de hist.

plant.

Lib. 21.

c. 15.

Lib. 27.

c. 9.

Lib. 4.

Forma.



VARE Epimedium appellata sit planta hæc, ignorare fateor, nisi ἐπὶ μὲν δία, quia in Media frequens oriatur. Apud Theophrastum Epimetron legitur, & pro eo in Plinio Epipetron, & alibi, ut in Dioscoride Epimedium, in alijs nomenclaturis Erineos, & Thryon, quia aquosis gaudeat locis. Dioscorides uero Epimediū

habet, atque sic plantā delineauit. Ἐπιμήδιον καυλὸς ἐστὶν οὐ μέγας, κιστῶ παραπλήσια φύλλα ἔχων, ὅσον ἢ ἑβ'. οὔτε δὲ καρπὸν οὔτε ἀνθὴ φέρει.

ρίζαι δὲ λεπταὶ, μέλαιναί, βαρύοσμοι, γευσσάμενῳ μωραί. φύεται ἐν τόποις ὑδροῖς, Epimedium caulis est non magnus Hederae folia similia habens,

ferè decem, aut duodecim: non fructum, neque florem fert: radices sub sunt, tenues, nigrae, graeolentes, gustanti fatuae; oritur in aquosis locis. Ex quo textu Plinius mutuatus ferè ad uerbū ita transcripsit.

Lib. 27. Epimedium caulis est non magnus, Hederae folijs denis, aut duodenis, nunquam florens: radice tenui, nigra subgravi odore: nascitur in humidis.

Lib. 7. In Theophrasto verò de florū differentia differente habentur cap. 8. de hæc verba. ἔνια δὲ καὶ ὅλως ἀνανθη, καθάπερ καὶ τὸ ἐπίμετρον. Aliqua hist. plā. verò omnino flore carentia sunt, sicut Epimetron. Quæ etiam Plinius

Lib. 21. ita in sua reposuit, ut in cap. de Acino dixi. Acinos, quam Epipetron vocant, quæ nunquam floret. In Dioscoride verò legitur nedū flore, sed & fructu etiam carere, & forsan hîc καρπὸν, fructum, pro semine usurpassè Dioscoridem, est censendum, ut in sequentibus capitibus, Xiphio, Sparganio, Xyride, & alijs multis. Quam etiam sententiam adiuuat hoc: non enim legitur, nec in Theophrasto, nec in Plinio, quòd planta hæc fructu uel semine careat, sed flore tantum, quare suspecta, atq. ab aliquo adiuncta hoc loco, uerba οὔτε καρπὸν cenfeo existimanda: aut legi debere, & interpretari, non semen, neque florem fert: atque etiā dici posset, suspecta adhuc esse, nam quælibet planta prius florem,




rem, deinde fructum, & semen, perficere uidetur: atque prius
ὄντε ἀνθος, posuisset, deinde *ὄντε καρπὸν*, ut in Dictamno Phylliti-
 de, & Adiantolicet videre, & similibus. Quòd autem plantæ fru-
 ctu, uel semine, & flore careant, intelligendum est, nobis non cõ-
 tingere forsan illos uidere, uel quia insensibiles ferè uidean-
 tur, à nobis perspicuè non conspici, ut in plantis capillaribus,
 & Filiceorum genere, atque etiam plantis alijs, quorum semi-
 na ueluti atomi impalpabilia uideantur, quorùmque flores nò
 conspiciuntur. In aliquibus uerò Orchidibus, Pirola, & simili-
 bus flores conspiciuntur: semen uerò ueluti puluis est, quo ca-
 rere aliquis dicere posset, nam ex illo ita tenuissimo semine,
 minimè constat plantam oriri posse, experimento facto, plantæ
 quidem quæ radice se propagant, uel nunquam, aut rarò semen
 perficiunt, quo nec exeunt, præsertim ex supradictis; aliquæ ue-
 rò contrà. His cognitis plantam describam, quæ frequens est in
 Monte D. M. Virginis, uulgò *Monte Vergine* appellato, frigido
 & excelsò, locis humidis aquosis, pratensibus: Vere exit, Mar-
 tio scilicet mense inuenitur ab radice tenui, subnigra, intus fla-
 uescente, repente atque fibris diuisa, folia edens rotunda Hede-
 ræ forma, læuia Soldanellæ marinæ similia, minora uerò, tertij
 Sedi à me descripti primis folijs ferè æqualia, quæ etiam Hede-
 ræ similia sunt, sed non ita crassa, atque molliora, singulari cau-
 liculo ex opposito alternatim hærentia, dena, aut duodena, uel
 aliquando etiam minus, magisue; secundum loci annique tem-
 periem: è medio uerò caulis parum sub primis folijs produ-
 citur petiolus tenuis in summo plures racemos utrinq. petio-
 lo hærentes, foliorum etiam numerum æquantes, acinos haben-
 tes congestos, paucos, uirides, qui nec florem unquam edunt,
 nec semen intus habere conspicitur, sed pro eo, pallido colore
 puluis tenuissimus, atque impalpabilis inuenitur, qui an satus,
 ex eo planta exeat, incertum est, sæpe quidem cū expertus sim,
 nunquam exire aliquid cognoui. Maio & Iunio cum botrybus
 racemosa inuenitur. Tota planta dodrantalis ad summum est.
 Radix grauem odorem terreum, putidumq. remittit, gustu in-
 sipido aqueo. Recentiorum experimento constat frigidam, &
 siccam esse temperamento: quare ad ulnèra ferruminanda,
 ulcera cicatrice adducenda efficax est; luxatæque coniungen-
 da. Item ad album mulierum profluium. Lobellius, ad ente-
 rocelas,

Descri-
ptio.

Tempus.

Vires.

rocelas, & hernias magnæ commendationis, & utilitatis potâ,
 & impositam esse ait: eximie quidem ferruminandi uim habere
 asserit. Dioscorides verò: *Huius folia concisa cum oleo trita cataplas-* Lib. 4.
ma mammis exhibent, ut ne augeant. Et radix conceptionem impedit. Et
folia trita quinque drachmarum pondere cum vino pota, post purgationem
dies quinque ne concipiant, seruant. Plinius uerò ait. *Et huic sfissan-* Lib. 27
di, refrigerandique natura, foeminis cauenda. Folia in vino trita virginum cap. 9.
mammis cohibent. Galenus uerò, *Epimedi vis est moderatè refrigera-* Lib. 6. de
toria, cum aquea humiditate: quare nullam habet insignem qualitatem. simpl.
Vberibus illitum ea recta seruare potest. Aiunt verò si potu hauriatur, med. fac.
sterilitatem parere. Quibus non minus facie quàm uiribus re-
 spondere planta hæc uidetur. Non est Epimedium Hepaticū
 trifolium appellatum, nam & flores eodem tempore, cum fo-
 lijs, pulchros, atque conspicuos edit: nec unico cauliculo fo-
 lia hærent, ut Dioscorides ait, qui scribit, ut caulis habeat fo-
 lia decem, aut duodecim, καυλός δέτιν &c. ἔχον φύλλα &c. non ut pe-
 tioli singuli folia habeant diuersi à caule. Neque planta illa
 magna AEthiopici Sefelis dicti folijs, uel Libanotidis, ut aiunt,
 nam & magna planta est, eodēmq. uitio prædita, quo superior,
 nec decem, aut duodecim, unico cauliculo, sed semper nouem
 habet singulis petiolis; καυλός ἐστιν, inquit Dioscorides, sicuti
 in capite de Orobanche, & similibus plantis, quæ caulem sim-
 plicem habent, etsi aliquando confundat scribendi modum.
 Huic congener uidetur natalibus, magnitudine, natura, uiri-
 búsque planta illa Ophioglosson appellata, folio oblongo he-
 deraceo, ligula oblonga, ueluti connexis binis ex ordine bo-
 trybus composita, quæ nec florere conspicitur, nec semen habe-
 re, sed puluerem luteum, ut in supradicta, inutilem: uiribus e-
 tiam recentiorum experimento similibus.





Sifer Dioscoridis.

SISER, à Græcis Σίσαρρον, dicitur. Huius no- Nomen.
tas, quia uulgare, atque notum erat Diosco-
rides tacuit: hæc de ipso scripta reliquit.

Σίσαρρον γνῶριμον, οὗ ἢ σίζα ἐφθῆ, εὐτομος, εὐτόμαχος,
οὐρητικὴν, ὁρεξέως πρακτικὴν. Sifer notum est, cuius
radix decocta ori grata est, & commoda stomacho,
vrinam ciet & appetentiam excitat. Hoc Plinius, Lib. 20.

duplex esse ait, Sifer erraticum satiuo simile est, & effectu, stomachum c. 5.
excitat, fastidium absterget, &c. & alibi de Pastinacis supra loquu-
tus subiungit. Inter medica dicendum Sifer, & ipsum Tiberius princeps

nobilitauit, flagitans omnibus annis à Germania: Gelduba appellatur castel-
lum Rheno impositum, ubi generositas præcipua. Ex quo apparet frigidis
locis conuenire. Inest longitudine neruus, qui decoctis extrahitur, amari-
tudinis tamen magna parte relicta, quæ mulsio in cibis temperata, etiam in
gratiam vertitur. Neruus idem & Pastinacæ maiori, duntaxat anniculæ.

Siferis satus mensibus Februario, Martio, Aprili, Augusto, Septembri,
Octobri, &c. Idem paulò post. Et hæc autem seritur, & sifer, & pasti-
nacæ utroque tempore, Vere, & Autumno, magnis seminum interuallis,
nullare minus quam ternorum pedum, quoniam spatiosè fruticat. Sifer
autem transferre melius: Galenus verò de Sifere hæc tantum tra- Lib. 8. de

didit. Siferis radix cocta stomacho grata est, & vrinam mouet: secundo or- simpl.

dine calfaciens, adiectam habens amaritudinem quandam, cum leui adstri- med. fac.

ctione. Columella uerò de Hortorum cura agens ait, Pastinacæ, Li. 11. de

& Sifer, atque Inula conualescunt altè pastinato, & stercoreato loco, sed quæ re rust.

rarissimè ponenda sunt, ut maiora capiant incrementa. Inulam verò inter- cap. 3.

uallo trium pedum feri conuenit, quoniam uastos facit frutices, & radici-
bus, ut oculi us Harundinis serpit: nec est alius cultus horum omnium, nisi

ut sarritionibus herbe tollantur. Ex quibus omnibus colligitur, plā-
tam à me propositam Antiquorum Sifer esse absque dubio ul-
lo. Radicem namque Pastinacæ satiuæ similem forma & sapo-
re, verum amariore, atque odoratiore: omnesque Pastinacæ ge-
neri adscripsere, qui adhuc de plantis recentiores scripsere,
atque Pastinacam uulgarem, siue domesticam appellantur. In
hac radice neruus inest longitudine, qui eximitur, postquam
elixata

elixata fuerit radix, non solum dulcedinis causa, sed quia tenerior est pars reliqua exterior, ciboque aptior, atque gratior; hoc & in Pastinaca sativa vulgari, & Rhaphano perspicitur, praesertim cum radices sunt bene adultæ, duriores tunc continent neruum cibo ineptum. Hanc postremo pro Elaphobosco depingunt, ab illius descriptione longè alienam: differt namque radice forma, sapore, atque semine Anetho dissimili, foliaceo compresso. Quamobrem non erit uerendum dicere non esse Elaphoboscon, atque Siferi perquam congruere, cum sapore, forma, atque usu Antiquorum monumeta etiamnum retineat. Seritur hæc semine, & postquam exierit, ut maior efficiatur radix transfertur altè prius refoßo, atque stercoreto agro, atque rarius ut cætera olera deponuntur. Dalehampius alios sequutus, quia planta à se descripta plures habebat radices, putauit atque scripsit, non semine, sed radice seri: sed hallucinatus est, quia sequi uoluit Matthioli scripta, quæ à Marcello Virgilio, qui uerbis tantum Dioscoridem commentatus est, ea transcripsit. Neque animaduertit uerba illa Plinij: *Oculis ex radice excis, ut Harundo seritur*, Inulæ satum, non Siferis demonstrare, de qua uerba faciebat. Idemque postea, Inulam, Sifer, & Pastinacam eodem tempore magnis seminum interuallis seri; Sifer uerò transferri melius. Quod hinc quilibet Olitor facit, prius uerò semine, Rhaphanos, Pastinacas, Cæpas, Lactucas, Brassicas, atque cætera olera serit, deinde opportuno tempore prius altero solo refoßo & stercoreto, ut melius conualescant, atque grandiora fieri possint, radices transfert. Hoc apertè iubet Columella, ut supra dixi loco citato, & ita eius uerba intelliguntur. Quibus sic conceptis ad plantæ descriptionem redeo. Radice firmatur longa, Pastinacæ sativæ similis, alba, aliquando in superiore sui parte purpurascente, quæ intus neruum, ut Pastinaca, & similes continet, sed duriores, atque lignosum minime uescendo aptum. Primo anno digiti crassitudine æquat, postea quidem fit grandior, atque excedit Pastinacam: folia emittit ex semine nata primum bina, deinde terna, postea uerò quaterna ex opposito, petiolo in imo rubenti hærentia, & unicum latius singulis petiolis in illorum extremo: superius leuia, inferius aliquantulum hirsuta, per ambitum serrata, atque Laueris modo cui admodum similia sunt, insuper diuisa praesertim

Lib. 19
c. 5.

Forma.

fertim cū planta tres annos attigerit: caulem edit scēnicula-
 ceum hirsutum, rubescentem, geniculatum, atque singulis geni-
 culis alis diuisum, secundo anno pedes altū quatuor, postea
 uerō æquat, uel superat hominis staturam: in summo caulis &
 alarum, quas plures edit, insunt umbellæ luteæ, & in his postea
 semen foliaceum duplex compressum, Angelicæ uulgo dictæ se-
 mini simile: Augusto mense perficitur: locos amat pratenfes. *Tempus.*
 Huius radicis sapor, est Pastinaca amarior, atq. odoratior, aro- *Locus.*
 maticum quid amplius habens, gustu gratior, quapropter etiā-
 num à multis feritur, & præsertim in Gallia Cisalpina, ut ab il-
 lius prouinciæ incolis amicis accepi, in cibo auidissimè expe-
 titur, atque ut palato gratior fiat, illam ita parare solent. Ra-
 dicem adultam accipiunt lauāntque, fibras paruas cultro exci-
 dunt, postea elixant, atque cū refrixerit per longū diuidunt,
 neruūque eximunt, atque in frustra dissectam, patella oleo fer-
 uenti plena, farina prius obductam piscium modo frigunt: eo
 euadere sapore aiunt, ut nec pisces bene conditos ea mensa de-
 gustare comedentibus placeat ampliū. Non igitur mirum si
 Tiberius princeps, ut à Plinio refertur, omnibus annis à Ger-
 mania afferri iubebat, cū sit ita palato, & stomacho grata atq.
 utilis. Huius facultates ita præter alios Plinius descripsit pri-
 uatim. *Sifer erraticum satiuo simile est & effectu, stomachum excitat, Vires.*
fastidium absterget. Ex aceto Laserpitiato sumptum, aut ex pipere, & mul- *Lib. 20*
so, uel ex giro, urinam ciet, ut Opion credit, & Venerem In eadem senten- *c. 5.*
tia est & Diocles. Præterea cordi conuenire conualescentium, aut post mul-
tas uomitiones perquam utile. Heraclides contra argentum uiuum dedit,
& Venero subinde offensanti: agrisque se recolligentibus. Hicetius ideo sto-
macho utile uideri dixit, quoniam nemo tres Siferes edendo cōtinuaret: esse
tamen utile conualescentibus ad uinum transeuntibus. Satiui priuatim suc-
cus cum lacte Caprino potus sistit aluum. Ex his igitur notum est
plantam hanc Antiquorum usum Siferis, atque uires ab illis
tributas retinere, quare alias plantas ab alijs descriptas mini-
mè Siferis uires atque gustum, & usum referre iudicaui: Ela-
phobosci potius historiam repræsentare planta illa radice
Asphodelo simili uidetur, de qua dicam.

Elaphoboscon Dioscoridis.

Nomen,
& Ety-
mon.

Lib. 3.

Lib. 22

c. 22.

Lib. 25

c. 8.

Descri-
ptio.

Lib. 22

c. 22.

Forma.



VONTIAM ut fertur, Cerui hoc pabulo aduersus serpentium ictus resistunt; Elaphoboscon dicta fuit planta hæc, quasi ἐλάφων βόσκη, ut Dioscorides ait, ταύτην φασὶν τὴν πύαν τὰς ἐλάφους γιμνέσας, ἀντέχειν τοῖς ὄφει ἐρπυσσὶ δόγμασι. hanc dicunt herbam ceruas depastas resistere reptilium morfibus, & Plinius. Quippe fama est hoc pabulo Ceruos resistere serpentibus, & alibi. Simplicius Cernæ monstrauere Elaphoboscon, de qua diximus. Hanc Dioscorides his notis depinxit. Ἐλαφόβοσκον καυλὸς ὅστις λιβανωτίδι ἢ μαράθρω ἐμπερὶς γενοταμένος. φύλλα διδάκτυλα τὸ πλάτος, ἱκανῶς ὅπη μῆκη ὡς τερεβίνθου, περιεκλασμένα, τραχέα ποσῶς. ἔχει δὲ παραφυάδας ἱκανὰς ὁ καυλὸς, σκιαδία ἐχούσας ὅμοια ἀνήθω, ἀνθὴ ὑπομήλινα, καὶ τὸ σπέρμα ἀνήθω ἐμπερές. ρίζα ὡς τριδάκτυλος τὸ μήκος, πάχος δακτύλου, λευκὴ, γλυκεῖα, ἐδάδιμος. καὶ ὁ καυλὸς δὲ λαχαίνειται ἀριφύων ὢν. Elaphoboscon caulis est Libanotidi, aut Fœniculo similis, geniculatus, folia habens anuum digitorum latitudine. satis oblonga ut Terebinthi, circumfracta, aspera aliquantulum. Habet autem caulis propagines multas, habentes umbellas Anetho similes, flores submelinos, & semen simile Anetho. Radix est trium digitorum longitudine, crassitie vnus digiti, alba, dulcis, & esui apta, & caulis olerum modo editur, dum recens est. Et Plinius, Elaphoboscon ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine, semine corymbis dependentibus Silis effigie, sed non amaris; folijs Olsatri. Quæ descriptio mutila uidetur, cum nec flores, nec radicem describat, & digiti crassitudo uidetur potius cauli, quam radici, de qua nihil dicit, tributa. Quare Dioscoridis descriptionem hoc loco magis sequendam esse cenfeo, cum satis totā plantam ex ea delineatam habeamus: cui à me depicta planta satis respondere uidetur: his enim partibus constat. Radices habet albas, dulces, esui aptas, aromaticas, sapore nigræ Theophrasti passi nacæ: digiti crassitudine, longitudine uerò tres, quatuorue digitos, uel minus, aliquando cultu, & uetustate magis, æquantur: plures, ab uno ortu Asphodeli modo dependentes, à quibus folia exeunt Laueri, uel Siseri à me depicto similia, sed terna ex opposito petiolo harentia, atque unicum in extremo,




Tempus.
Locus.

extremo, ut in Terebintho, sed per ambitum ferrata dentibus acutis, tactu asperis, (quare uerbum illud *ραχία*, non ad foliorum superficiem, sed circumferentiam, refertur, atque non *hirsuta*, sed *aspera*, interpretandum est hoc loco, sicuti eiusdē Dioscoridis est exemplum in cap. de Elleboro nigro, ubi folia aspera esse dixit, per uerbum *ραχία*, quod nec eo loco *hirsuta* interpretari potest: nulla nigri Ellebori quidem folia hirsuta esse scimus, sed ferraturis acutis circum aspera: præterea Dioscorides folia hirsuta per uerbum *δαρία*, describit, quod proprium est, ut in cap. de Semperuiuo tertio notauimus) lata duobus digitis, atque tribus longa: caulem emittit rotundum fœniculaceum, geniculatum, & ex singulis geniculis alas, habentes in summo, ut caulis, umbellas pallescentibus floribus, quibus singulis succedunt bina semina non compressa, sed aliquantulum extuberantia Anetho similia. Culta mihi floruit Aëstatis fine, atque semina perfecit Autumno: gustu & sapore Pastinacæ nigrae aromatico, sed non amaro, ut Plinius notat. Sponte ortam non uidi, sed in agro Norbonensi oriri tradit Lobellius. Hæc satis Dioscoridis Elaphoboscum referre uidetur, etsi uideatur obstare, ut aliqui dicunt, Dioscoridem nullam de multiplicibus radicibus mentionem fecisse: ad quod respondetur, hoc euenisse, nam hæc planta, etsi multiplex sit radice, non semper multas habet radices, cum semine difficulter exeat, atque radice seratur, una ex illis auulsa, ut omnes iam cognouere; quare non erit absurdum dicere, Dioscoridi forsan contigisse, plantam unica radice allatam uidere: uel potius relatori fidē adhibuisse, qui radicem tribus digitis longam, & digito crassam esse affirmavit, nihil distinguens de multiplicitate; & sic Dioscorides ignarus forsan multitudinis, uel tacitus, ita descripsit plantæ huius radicem: putans sufficere ita radicē describere, ut sit unius digiti crassitudine, & trium longitudine. Nulla enim adhuc uisa est radix, quæ talem habere possit formam & magnitudinem, nisi sit Asphodeli, Pæoniæ fœminæ & similibus. Radix quidem non carnosa uel bulbosa minimè poterit digiti crassitudinem assequi, nisi sit pede longior, ut Raphani, & similibus. His responsum satis mihi uidetur, cum in reliquis respondere uideatur, & radicis hunc scrupulum ita defensum esse, & sublatum puto. Dulcis est plantæ huius radix
absque

abſque amarore aliquo, omnium ſentētia : quapropter, an Dioſcoridis Siſer ſit, iſdem dubitant : nam Galenus, & Plinius uolunt Siſer amarore non uacare ; atque cū in hac Planta Recētiore non reperiſſent amaroris notam, loci, cōſque uarietati, uarietatem obiecerunt : ſed nec aliquis unquam huius radices amaras alibi deguſtauit. Reiſcienda igitur eſt eorum de hoc ſententia, cū & omnibus locis dulcis edulis, & guſtu ſuauiſ ſit. Iccirco, cū huius plantæ radix, tantū quia multiplex ſit, à Dioſcoridis hiſtoria differat; craſſitie uerò, forma, & longitudine, colore, & ſapore illam referat, atque etiam folijs Terbintho perquam ſimilibus, caule, floribus, & ſemine, atque guſtu reſpondere uideatur, non uereor pro Dioſcoridis Elaphoſco afferre, ſatis ſuæ congruente delineationi. De quo Galenus loquens ita inquit. *Elaphoſcon facultatiſ eſt calidæ, & tenuiū* Lib. 8. de
ſimpl.
med. ſac.
partium, ac proinde exiccatoriæ ſecundo maximè exceſſuum ordine. Dioſcorides uerò hanc uim habere aſſerit. *Tradunt cernas huius herbe pabulo reſiſtere ſerpentium morſibus. Vnde & ſemen eiſ commorſiſ à ſerpentibus datur cum uino bibendum.* Plinius uerò habet. *Et hoc laudatum in cibis. Quippe etiam conditum prorogatur ad uirinam ciendā,* Vires.
Lib. 6. de
ſimpl.
med. ſac.
lateriſ dolores ſedandoſ, rupta, conuulſa ſananda, inſtationeſ diſcutiendoſ, coli quoque tormenta. Contra ſerpentium omniumque aculeatorum iſtuſ. *Quippe fama eſt hoc pabulo cernuſ reſiſtere ſerpentibus. Fiſtulaſ quoque radix nitro addito illita ſanat. Siccanda autem in eo uſuſ priuſ eſt, ne ſucco ſuo madeat, qui contra ſerpentium iſtuſ non facit eam deteriore.* Hanc pro Siſaro omneſ depinxēre, atque uerum eſſe aſſirmant, ſed in deſcriptione Siſeriſ iam oſtendi, omneſ hallucinatoſ eſſe, cū ideo hanc Siſer eſſe putauerint, quia radice ſerebatur, una ex illiſ auulſa, quod ex Marcelli Virgiliſ commentario exceperē, non ſine omnium pudore, cū ex hoc cognoscantur ad legendum parum ſolliciti, uel ad uerba, & ſenſuſ cōſiderandoſ inepti, atque nimis creduli. Non enim quia ſcripſit Marcelluſ Virgiliuſ, *Seri hoc non ſemine, ſed bulbiſ, vetereſ dixerunt : qui ut in Lilio, Inula, & Aro ſit, à reliqua radice auulſi, ad nouam ſobolem in hortiſ diſponuntur,* ideo non erat Pliniſ, atque Columellæ textuſ ab eodem citatuſ cōſiderandus, atque ſenſuſ ueritaſ excipienda, quam, ut dixi in deſcriptione Siſeriſ patefecit : nec repetenda eſt hīc ampliſ. Non eſſe Elaphoſcon Dioſcoridiſ quæ ab aliſ depingitur, ex hiſ quiſque iudicabit. radicis quidem ſa-

Μήνιον Ἡράκλειον

Epauer Heracleum



pore, forma, longitudine; semine foliaceo Anetho dissimili, totaque forma abesse cognosceret.

*Papauer Heracleum Theophrasti, &
Dioscoridis.*



PAPAUERIS nomen huic plantæ inditū fuit, non quòd esset ex genere Papauerū, sed quia inter segetes sicuti Papauer rhoeas folijs nō dissimilibus exoritur, capitula etiam Papaueri similia habens. Herculeum uerò dictum ob uirium præstantiam in educendo uomitione humores comitiales efficiētes morbum, quo Hercules depressus fertur: unde comitialis morbus Hercules dictus est. *ἁφρώδης* à Dioscoride dicitur, quia album sit, & spumæ speciem hirsutic referat. Spuma quidem cuiuslibet rei dicitur, quod rarum, album, leuèque sit, ut salis spuma, quæ ueluti situs, aut lanugo quædam saxis hærens inuenitur; quam Dioscorides *ἄχρη*, & *ἐπίφυγμα* appellauit: quæ uerba lanuginem significant: uel quòd simile sit forma & colore, ut Aphronitrum. Dici etiam potest *ἁφρώδης* ab effectu, spumofum enim humorem, pituitam scilicet, in aqua mulsa potum, uomitu educit, ut Theophrastus, & Dioscorides aiunt, Galenúsque consentit. Huius notas sic Theophrastus depinxit, *Ἐτέρα δὲ μήκρον, ἡράκλεια καλεῖται: τὸ μὲν φύλλον ἔχουσα ὅσον στροβίλος, ὥς τὰ ὀθόνια λευκαίνουσι. ῥίζαν δὲ λευκὴν ὀπιπλάειον: τὸν δὲ καρπὸν λευκόν.* Aliud autem Papauer heracleum appellatur, quod folium habet ut Struthium, quo linteæ dealbant: radicem uerò albam per summam terram: fructum autem album. Dioscorides uerò habet. *Μήκων ἁφρώδης, ὅσῳ δὲ τινων ἡράκλεια κληθεῖσα, καυλὸν ἔχει σπιδαιμαῖον, καὶ τὰ φύλλα σφόδρα μικρά, στροβίλος ὁμοίωτα, καὶ καρπὸν παρ' αὐτοῖς λευκόν, καὶ τὸ ὅλον δὲ βοτάνιον λευκὸν ὂν, καὶ ἁφρώδες: ῥίζαν δὲ λεπτὴν ὀπιπλέον.* Papauer spumeum, ab aliquibus herculeum appellatum est, caulem habet pedalem, & folia admodum parua, Struthio similia, & fructum ab ipsis album, & tota herbula alba est, & spumea: radicem autem tenuem in summa terra. Plinius autem ex Theophrasto excipiens scripsit. *Alterum è syluestribus genus, heraclion vocatur, cap. 19.*

Nomen,
& Ety-
mon.

Lib. 4.
c. de spu-
ma salis.

Lib. 9.
c. 13.
Descri-
ptio.

Lib. 4.

Lib. 20
cap. 19.

ab

ab alijs aphron, folijs (si proculintuearis) speciem Passerum præsentantibus: radice in summa terræ cute, semine spumeo: ex hoc lina splendorem trahunt *Æstate*. In qua descriptione iam omnes animaduertunt Plinium hallucinatum, herbā ignorantē, à uocis fuisse similitudine; *στροθιον*, uel *σρουθος*, *Struthium*, *Lanaria*, scilicet herba, cum *σρουθιον*, uel *σρουθος*, quæ uerba Passerculum, & Passerē significant: ideóque Passerum speciem folia præsentare dixit. Sed ueritas est ut folia Papaueris huius similia sint folijs *Struthij*, *Lanariæ* herbæ: qua lintea dealbantur. Sed hanc dealbandi uim Plinius non *Struthio*, sed *Papaueri* tribuit, dicens: *Ex hoc lina splendorem trahunt Æstate*: *φ*relatiuum non proximiori *σρουθος*, sed *Papaueri* tribuens. Nescio quidem, mirórque quomodo in hunc incidit errorem, nam *φ*relatiuum, nō *sceminini* sexus est, ut *μήκων* *ήράκλεια*, sed neutri, uel masculini, *σρούδιον*, uel *σρουθος*, quod tamen minimè animaduertens (emungebatur tunc candelā) *Papaueri* perperam tribuit. Ex his denique nisi foliorum *Struthij* delineationem habeamus certam, nullam cum *Struthij* folijs habere similitudinem herculei huius *Papaueris* folia asserere poterimus. Quare quoad fieri poterit *Struthium* primò depingam antiquorum, eiusdem scilicet *Theophrasti*, auctoritate, & delineatione, deinde plantam pro *Papauere*, *Struthij* folijs admodum minoribus, ut *Dioscorides* notat. *Struthium* igitur ut ab ipsius etymo incipiam, ideo appellatum cenfeo, quia ipsius folia ad modum pennarum auis *Struthij* appellati, uulgò *Struzzi*, utrinque laciniata sunt: nam & aliæ plantæ à pennarum similitudine appellatæ sunt, ut *Filix*, quæ *πέρις* dicitur, quia folia utrinque digesta sunt pennæ modo, ut *Dioscorides* ait in cap. de Filice: ita etiam folia *Abietis*, esse uidentur, *Lib. 4*
Lib. 3. c. 10 ut *Theophrastus* ait, & etiam *Sorborum*: *Singula* verò, inquit, *constant ex obliquis pennæ modo partibus, ac si omne unum esset, habens lobos excisos ad neruum usque, verùm differunt singula multitudine partium. Lib. 3. c. 11*
Decidunt verò non partes, sed totum folium pennæ facie. Quod etiam folia plantarum similia dicantur pennis *Struthij* auis, idem *Theophrastus* testis est, qui de arboribus *Indiæ* loquens ait. *Lib. 4. c. 5*
Alia cui folium specie prælongum, simile pennis Struthiorum, quæ super galeis imponuntur, &c. Item spinosa uel aculeata folia habere debet, nam *Theophrastus* inter *ἀκανθόφυλλα* *Struthium* recenset: atque *Sonchum*, & *Struthium*, & similia, non esse *acanacei* generis

neris notat, nam capitula non habent spinosa, uel spinis circumdata, ut reliqua spinosafoliata acanacea. Flores edere dicit idem Theophrastus Aestate inodoros, atque pulchros: *Floret & Iris Aestate, & Struthium dictum, flos aspectu pulcher, sed caret odore: cuius flores in coronis addi antiquitus refert Athenæus. Radicem teretem longamq. habere debet Polemonia similem Dioscoridis sententia, qui, de Polemonia loquens ait, ῥίζα πυχναία, ὑπόλευκος, ἐμπερὴς στρουθίω. Radix cubitalis, subalba, similis Struthio. Sunt qui Struthium oleæ folia habere putent, atque Plinij auctoritate mouentur, qui ait; At quæ vocatur Radicula, lauandis demum lanis succum habet: mirum quantum conferens candori, mollitiæque. Nasctur satina ubique, sed sponte præcipua in Asia, Syriæque, saxosis & asperis locis. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule ferulaceo tenui, & ipso cibus indigenarum expetito, & tingenti, quicquid sit, cum quo decoquatur, folio oleæ, &c. Sed hanc Plinij lanariam herbam Oleæ folio, non Struthium, cuius folia ἀκανθόφυλλα esse debent, sed quæ Dioscorides παρακανθόφυλλον esse scribit, Hippophaës censerem. Pro Struthio uerò ex Iaceis uulgò dictis & Stœbis falsò putatis aliquâ, uel illis similem supponerem: spinosa foliata quidem sunt ut Sonchus, & capitula eidem similia nō acanacea habent: atque in aliquibus acrem tetrûmque halitum cerebro molestum inesse percepi. Sed de his nihil nunc statuo, nam dealbandi uim lanas in radice perquiro: atque nunc Iaceas & Stœbas, foliorum, atque plantæ totius forma Struthij delineationem referentes sufficit considerare: non ut Struthij uim referant, sed Plantæ habitum, cui simile folijs admodum minoribus herculeum Papauer demonstrandum suscepi, ut Dioscorides uult. Planta hæc frequentissima est in agris, nec minus erratico Papauere infesta, quare inter hordea non cribrata etiam capitula inueniuntur: Agricolaæ *flor campese*, nuncupant. Radice firmatur parua, tenui, parum sub terra descendente, atq. multò minus Corniculato Papauere, cuius radicem per summam terram ferri tradunt Theophrastus & Dioscorides: alba paruis fibris diuisa: folia emittit primis erratici Papaueris folijs similia, atq. etiâ Iacearum, & Stœbarum, quarum folijs etiam cùm adoleuerit similia sunt, sed minora duplo, uel triplo, albidiora, atque molliora, lanuginosa multum, quare incana perspiciuntur: caulem emittit Veris sine, ab radice alis diuisum, in quibus & folijs,*

præter

Li. 6. c. 7.

Lib. vii.
c. 10.Lib. i. 9.
c. 3.Forma.
Locus.

- præter naturalem aliorum foliorum hirsutiem, lanugo quædã uisitur, quasi rarũ superiectũ sit Bambaciũ, quo spumæ colorẽ, raritatemque referre uidetur: nec alio modo spumam referre censeo plantam aliquam; nec ut aliqui putant exudare spumofum liquorem, in humido quidem extrinseci caloris feruescentia requiritur, ut spumescere possit, quod in plantis minimẽ
- Tempus.** posse accidere censeo, cum adhuc non obseruauerim. Aestate uerò in alarum summo ex singulis foliorum alis, ut in Chelidonio maiore, quod παρ ἑκαστον φύλλον florem habere ait Dioscorides, capitula sunt alba, squamosa, flores edentia uarios, nam albo, purpureo, atque cæruleo colore conspiciuntur: quod autẽ capitula huius plantæ sint similia Papaueris capitibus, idẽ
- Lib. 3.** Dioscorides tradit in capite Centaurij maioris, his uerbis, ὡς κεφαλὰι σμοταὶ μήκωνι, in quibus capita similia Papaueri: hæc quidẽ Centaurio similia sunt. Semen habet Cnici paruum ex cinereo album, quare ἀφρόδες dicitur, talis quidem est spumæ color, nam aquæ opacitas per ipsius diaphanas partes perspicitur: pappũ habens, amarum, acre, quod perfectum per se decidit aperto capitulo. Huic Theophrastus has uires tribuit. Purgat per superna
- Vires.** radix huius: vtuntur ea aliqui ad comitiales in aqua mulsa. Dioscorides uerò diligentius uires describens, & modum, ait. Huius fructus, non radix, colligitur Aestate ubi plenè maturuit, & siccatus decidit. Purgat per vomitus, si acetabuli mensura cum aqua mulsa sumatur. Huiusmodi purgatio priuatim comitialibus commoda est. Plinius quidem habet, Tunditur in pila comitialibus morbis acetabuli mensura semen in uino albo: uomitiones enim facit. Atque de semine Dioscoridi consentiens intelligit, nam Theophrastus radici uim tribuit in aqua mulsa pota. Plinius ab utroque in hoc dissentit, nam in uino albo potari scripsit: à quo deceptus Gaza, in uersione huius loci μελικράτω, uino mulso, interpretatus est. Sed error utriusque uidetur, nam in uomitionibus, nõ uino, sed aqua mulsa uti debet,
- Lib. 5. c.** cum propriam hanc uomitiones ciendi uim aqua mulsa habeat
- de aqua** teste Dioscoride. Galenus uerò hæc de planta hac reliquit.
- mulsa.** Papauer herculeum, vocatur & aphrodes, eo quod totum album, & spumofum sit, existens paruum. Semen habet pituitam expurgans. Recentiores hanc feminis uim ciendi uomitiones non cognouerunt sub
- Lib. 7. de** simpl. Cyanei floris nomine à Plinio inter alios coronarios relato.
- med. fac.** Qui an diuersus à spumæo Papauere, quod non cognouit, sicuti &
- Lib. 21.** c. 9. et 11

ti & an ipsius Cyanus sit incertum est, sed & vtrunque esse posse cenſeo, nam & Struthij flores his non abſimiles coronarij etiam ſunt: ſicut & huius flores, quorum venuſtate, & coloris diſferentia manipuli eleganter compoſiti conſciuntur Aeſtate, immixtis Roſarum, Aurantiorum, Caryophyllorúmque floribus, vt & oculi coloris varietate, & nares odore oblectentur, atque ideo in hortis ſeritur. Quare ἀφραδνοία μύκων, Veneris ſcilicet Papauer appellari poteſt. Chōdrillis, Intybísque cūm parum folijs ſimilis eſſet, natura ſimilem fecerunt: atque eaſdem vires huic quas Serīdes habent tribuere, refrigerantem nempe, atque ſiccantem. Mihi verò ut ex ſapore perſpicitur acrimonia participare videtur, atque non parum diſſerre ab illis. Placentinum aiunt Syrupo è Cichorio Cyaneum immiſcuiffe Cichorij generi adſcribentē, ſed certè ab eo diſtat vt iam omnes animaduerterunt: atque ego non hanc plantam, ſed aliam ſpeciem cæruleum florem ſemper edentem, quam Dodonæus Chondrillam cæruleam appellat, lacteſcentem Placentinū uſurpaſſe cenſeo: quam alij pro Sefamoide paruo Dioſcoridis depingunt, illi longè flore, ſeminis ſque colore & ſapore, viribúsque diſſimilem. Eſt & altera Cyanei etiam nomine maioris planta *Varie-* vulgò dicta, non in agris ſed montanis locis frequens, folijs *tas.* maioribus, latioribúsque, incanis, hirsutis, atque lanugine illa ſuperabundanti etiam refertis, caule breuiore, craſſiore lanuginoso: floribus purpureis, calyce non albo læui, ſed ſquamis uiridibus per ora flauis lacinijs diuiſis; radice perenni, atque repente: ſemine verò non diſfert. Ex his igitur conſtat plantas ab alijs pro ſpumeo Papauere depictas nullam cum Struthij folijs habere ſimilitudinem ſicuti, nec ſuæ reſpondere delineationi.





Phyteuma Dioscoridis.

A CILEM, probabilémque putarunt commentatores aliqui, Plinium sequuti, excusationem esse, quia Phyteumatis vsus ad amatoria tantum utilis perscribitur, supernuacaneum esse illius historiam describere, uel uestigare. Sed ijs quidem difficilis fuit huius plantæ inuestigatio, iccirco ne uiderentur parum diligentes, occasionem nacti, in ea quiescunt. Huius quidē plantæ historia breuissima est, sed notas principes habet, quod si quis diligens, atque studiosus Lanariam herbam inuenerit, aut ex coniectura verborum ab antiquis relictōrū idea confiderauerit, facile illam, à foraminum fructus nota quibus diuidi traditur, inueniet. At ijs confusus signis plantam hanc describere studui. Huius etymon etsi omnibus plantis commune uideatur, quia φυτεύονται omnes; tamen φυτέω, non tantum plantare, sed producere, generare, & parere significare traditur. Hæc cum, ad amatoria maximè apta sit, & sic ad generationem, præ alijs φυτεύμα appellata est: φυτέειν, non tantum πίας, & φυτόν, sed etiā παῖδας, dicitur: vnde Aristophanes,

Etymon.

Nomen.

In Versis.

Ἐπειτα παῖδας ἤ φυτέειν, καὶ τρέφειν.

Postea filios oportet plantare, & nutrire.

Et Diogenes, ut apud Laërtiū, liberis dans operam, se hominem plantare dicebat. Huius apud Dioscoridem hæc est delineatio.

Φύτευμα φύλλα ἔχει ὅμοια στροβίλῳ, μικρότερα δὲ: καρπὸν πολὺν τετραγώνον. *Descriptio.*

ρίζαν μικρὰν, λεπλὴν, ὀρθόλαιον. Phyteuma folia habet similia Struthio, minora verò: fructum copiosum perforatum: radicem paruum, aliqui legunt, μακρὰν, longam, tenuem, per summam terram. Plinius verò vsum tantum descripsit, de quo postea. Huic delineationi respōdere videtur planta à me depicta, quæ radicem habet longam tenuem parum sub terrā descendentem, obliquè se propagantem, atque supra terram emicantē; ex qua folia exeunt parum hirsuta ex viridi albicantia, forma & diuisura Iaceis uel Stœbis vulgò dictis similia, uerū prima folia latiora sunt, rotundioribus sinibus erosa, minora uerò. Postea caules edit cubi-

*Locus.**Tempus.*

tales, & bicubitales etiam, quibus per interualla geniculis folia hærent ex opposito bina, tenuiora, magisque pinnata, ex quibus alæ exeunt, in quorum, & caulis summo longis petiolis incumbentia extant capitula florum purpureorum, ad cæruleū vergentium, similia Trifolio Bituminoso, vel magis plātæ Pycnocomon à me dictæ, quæ hîc toto anno propter cæli amœnitatem vbique viarum per margines florida visuntur, oculosque recreant, sed Aestate magis: quibus decisis succedunt fructus plurimi circum compositi caput efformantes oblongū, ideòq. Dioscorides dixit καρπὸν πολὺν, fructum copiosum: fructus hî diligenti naturæ industria sunt formati, singuli enim in imo quo cohærent, sunt acutiores, in medio illorum crassiores, è medio verò ad summum latiores fiunt, atque cartilagine quadam tenui lineis signata constructi: quos si inuertes pilei formam, vel nolę representare videbis: latior enim pars, & cartilaginea, limbum; reliquum pyramidalem formam, quæ pars tota circumfracta est per longum, in arcus, & pontes peruios, perquam elegantî structura: atque si illos expressè peruios videre volueris, fructum aspice plantæ maioris Hispanicæ ab Herbarijs dictæ congeneris, qui cū sit maior, maiora habet foramina, ita vt acus permeet per singulos arcus: semen hoc plantæ Hispanicæ hirsutum in imo est, hoc differens à nostrate. Hanc si coniecturæ indulgendum est, magis suæ respondere delineationi censeo: nec nisi Lanaria herba certior sit, atque diuersis folijs, de hac disceptandum est amplius. Vires non alias, quàm ad amatoria vtilem radicem esse, Dioscorides descripsit. Plinius, hac ratione dixit; *Phyteuma, qualis sit, describere superuacuum arbitror, cū sit vsus eius tantū ad amatoria.* Sed certè ad aliud vtilem esse posse censeo, nam non quia vsus erat ad amatoria tantū, vires alias quibus non utebantur, vel minimè cognitæ habebant, habere non poterit. Quare non mirum si recentiores alias huic vires, & non ad amatoria, quorum vsus exoleuit, cognouère sub Scabiosæ nomine, quia ad Scabiem sanandam, atque siccan dam vtilem illitam putant: an autem hoc vi calidi, vel frigidi,

*Aduers.**Lib. 27**c. 12.*

ficcantis eueniat, ignorare eos penitus mihi videtur: nam *Pec. de Sca-* na & Lobellius viri docti, nunc similem faciunt viribus plantæ *biofa, &* Succisæ, vel Diaboli morsus ab ipsis appellatæ, à me vero Pyc- *Succisa.* nocomon, acribus, atque cordi inimicis, nunc verò Cyaneis, Chon-

Chondrillis, & Intybis, refrigerantibus, siccantibusque, ac cor-
di amicis. Sed vires hæ recentiorum plantis attributæ, vt con-
tra venena, & pestiferos morbos, Theriaca admixta sint vtilis;
vel refrigerantes, atque constringentes sint, Plantagine, Equi-
seto, & similibus immixtis, minimè animo meo satisfaciunt, nã
quælibet plâta nisi viribus sit omnino contrarijs, admixtis vti-
libus, efficere idem dici potest. In hac planta etsi aliquid ama-
ritudinis insit, non tamen acrem esse percipitur, quare non mi-
rum si viribus siccantibus, & adstringentibus esse aliqui dixe-
runt, qui Stœben Dioscoridis esse putarunt: atque Plantarum
Auctor historiæ ait, *decoctum Scabiosæ mirum in modum esse efficax
contra scabiem haustum, sicuti & succus illius scabiosis corporibus.* Sed
scabiosis etsi extrinsecus calida, & sicca, vtilia sint, non calefa-
cientes, & acres syropos, sed refrigerantes, atque siccantes ex-
hiberi scio: quod peritioribus atque huius facultatis studiosis
viris decernendum relinquo. Dioscorides hanc ad amatoria
vtilem esse scripsit, sed modum omisit, quare incognitus adhuc
erit, præsertim cum potiùs magica, quàm physica faculta-
te hoc efficere possit, sicuti in alijs, quæ appensæ collo, uel do-
mui, uel tactæ, vel simili modo utiles ad aliquid esse prædican-
tur. Non est Phyteuma quæ ab alijs Matthiolo, & Pena descri-
bitur, nulla quidem illarum fructus habet copiosos, sed paucos
contra Dioscoridis sententiam, qui *καρπὸν πολὺν* habere ait, nec
folia habeat Struthij herbæ, quæ folijs pinnatis, & ex genere
καυθούλων, atque Sonchi capite esse censetur auctore Theo-
phrasto, de qua supra diximus.

*Observa.
cap. de
Cyaneo.*

*Li. 6. c. 3
Li. 7. c. 9*

Erinus Nicandri & Dioscoridis.



RINON plantam hanc appellarunt Anti-
qui, quia lacteum succum habet, atque emit-
tit Caprifici modo, quæ *ἐρίνεις* à Græcis dicitur.
Quapropter Plinius post Caprifici de-
scriptionem, ita hanc subscripsit. *Herba quo-
que quam Græci Erineon vocant, reddenda in hoc lo-
co propter gentilitatem.* Et quia Ocimi folia an-
tequam caulem edat habet, ut in Ocimoide observatur, Oci-
moi-

*Nomen,
& Ety-
mon.*

*Lib. 23.
c. 7.*



moides, & quia aquatica loca diligit, ὕδρην, dicta fuit. Dioscorides his notis depinxit Ἐρινός φέεται παρὰ ποταμοῖς καὶ κρήναις. φύλλα ἔχει ὠκίμῃ ὅμοια. μικρότερα δὲ καὶ ἐπερχισμῆα ἐκ τῶν ἀνοσθεν μερῶν. κλωνία δὲ ἢ ὅς. σπιθαμιαῖα. ἀνθή λευκὰ. καρπὸν δὲ μέλανα, μικρὸν, συφόν. ὁ ποῦ δὲ μεσὸς ἐστὶν ὁ καυλὸς καὶ τὰ πέταλα. *Erinus nascitur apud fluuios, & fontes: folia habet Ocimo similia, minora verò, & incisa in extremis partibus: ramulos quinque aut sex pedis altitudine: flores albos, fructum nigrum, paruum, & acerbum. Caulis & folia succo referta sunt.* Plinius ita transcripsit, *Palmum alta est, cauliculis quinis ferè, Ocimi similitudine, flos candidus, semen nigrum, paruum.* His respondere videtur planta à me depicta, quæ non nisi locis aquosis, fontium, fluuiorum ripis, ac Vallibus, in Montium radicibus vbique hæc frequentissima: radice constat carnosâ non magna, paruum Rhaphanum æquantem ad summum, candida, gustu suauis ex dulci acerbâ, acetarijs expetita; lactescente; in medio, vel imo parum extuberante, à qua folia exeunt primo Vere Ocimi folijs similia, minora verò, medijs Ocimi folijs æqualia, per ambitum serrata, supernè hirsuta parum, atque viridia, infernè verò læuia, atque polita, albidiorâque: caules postea ab radice emittit plures, secundum loci annique temperiem, pedales, vel maiores, angulosos, hirsutos: quos folia absque petiolis alternatim circumdant, longiora admodum, angustiorâque minúsq. serrata, ita vt qui viderit plantam sine caule, atque postea caule præditam, diuersam absque dubio esse censeat, nisi domi cultam obseruauerit: folia quidem, quæ, antequam caules ederet, habebat terram tangentia, marcidâ euanescent, nec in illa amplius inueniuntur. Ex foliorum alis ramuli exeunt, in quibus sicut in caulibus flores Maio exeunt petiolis paruis hærentes caui, quinque diuisuris in extremo dissecti, colore albicantes, & etiam purpurascens, intus thyrsim habentes qui in tres curuas partes diuiditur: quibus siccatis florum basis extuberat, quæ hirsuta est, & in quinque viridia foliola desinit, semen perficiens Iunio & Iulio fuscum, minutum, compressum, gustu acerbum, quod cum perfectum & siccatum est, per basis foramina quæ tunc peruia sunt decedit. Tota planta ex radice, ad florum calyces vsque lacte manat dulci disrupta. His igitur videtur, natali loco, forma foliorum, lactis copia & sapore, quæ notæ priuatæ sunt, suæ delineationi respondere. Huic Dioscorides

Lib. 4.
Descriptio.

Lib. 23
c. 7.
Forma.
Locus.

Tempus.

Vires.

rides has vires tribuit. Huius semen drachmarum duarum pondere, ad mellis Cyathos quatuor admixtum, ad oculorum fluxiones sistendas illinitur. At succus aurium dolorem sedat, cum sulphure vino, & nitro infillatus. Plinius habet, trium cum melle Attico, oculorum epiphoris medetur: utique autem decerpta manat lacte multo, & dulci herba, perquam utilis aurium dolori, nitri exigui addito. Folia resistunt venenis. Galenus Erinon non habet, sed Echinon herbam describit, ita ut Erinon referre videatur. Aegineta uerò habet Erinon, & Echinon ex Galeno transcriptam, ita ut diuersa ab Erino esse censeat. Erinos, inquit, aquaticaberba est, cuius seminis drachmæ duæ, cum mellis drachmis quatuor illitæ, oculorum fluxiones sistunt. succus ad aurium dolorem facit. Nec, ut Dioscorides etiam, aliquid de vi propellendi venena tradit, quam Plinius addit, cum ait, Folia resistunt venenis. Sed Nicander hanc vim in radice esse tradidit in Theriacis suis, his versibus.

Ἡ' ἐ σὺ γ' ἡρύγγυιο καὶ ἀλθήεντος ἀκάνθου
 Π' ἴζαν λειήνεο, φέροις δ' ἰσορρεπὲς ἄχθος
 Ἀ' μοφῶν καὶ * χλοάωντος ἐν ἀρπύζειαισιν ἐρίνου.
 Sive tu Eryngij, & salubris Acanthi
 Radicem tere, ferres verò æquum pondus
 Amborum, & virentis in montis pede Erini.

* aliàs
 κλώθον-
 τος incū-
 mbentis.

Scholias tes Nicandri Græcus hæc etiã de Erino refert. Diocles in Rhizotomico ait esse similem Ocimo: prodest aduersus venenosas bestias: nascitur prope fluuios, & fontes, & loca aprica, & montium radices. Ex quibus Nicandri & Dioclis uerbis radicem resistere venenis patet, atque hanc à me descriptam plantam radicem habere, quæ seruari apta sit Dioclis sententia, quod in alijs Erinis ab alijs putatis minimè perspicitur. Non est Erinus, quæ à Matthiolo depingitur mutila planta sine floribus, quam nemo nisi ab eodem depictam vidit, præter ipsum qui se manus lacte inficisse ea extirpata asserit. Sed certè folia ab ipso depicta Dioscoridis Erinum non referunt, verba quidem illius non percepit, nam folia incisa in superiore parte, foliorum scilicet intelligitur, non caulis ut perperam fictè depinxit: Dioscoridis uerba hæc sunt, καὶ ἐπεχισμένα ἐκ τῶν ἀνωθεν μερῶν. ut etiam in capite de Argemone obseruatur. Quare nec plantam illam Erinum, nec vera asserere eo loco censeo: nõ enim plures sunt apud fluuios & fontes, montiumque radices orientes, quæ nobis aliisque

vesti-

vestigatoribus incognita sint. Nec est Erinus quæ à Pena & Lobellio refertur, nam nec iidem asseuerant. Nec quam postremo Dalechamptius proponit, folijs minimè incisis, nec crenatis iuxta caulium fastigia ἐκ τῶν ἀνωθεν μερῶν ἐπεχισμένα, inquit Dioscorides, in longum & angustum veluti fissis penè instar Pinastris: ita idem vertit, an autem rectè interpretatus sit, & vera sit ab ipso depicta planta quilibet ex supradictis iudicabit.

Hist. li. 9
c. 171.

Hippophæstum vel Hippophæes Dioscoridis.



ARIA non solum est huius plantæ nomenclatio, sed eiusdem scriptura: in aliquibus enim legitur ἵπποφαισον, ἵπποφύες, ἵπποφάες, & ὑπόφαισον, Hippophæstum, & Hippophæes, in alijs Hippope, Hippopæstum, & Hypophæstum, & Hippophyes. Ἰππόφαισον dici potest ἀπὸ τοῦ ἵππο, & φάισος, ἀπὸ τοῦ φαίνομαι, Hippophæstū, scilicet, valdè splendidum, ἵππο quidem, valdè significat & augmentum, vt ἵπποσέλινον, & similia, à Dioscoride vsitata compositionem, atque ualdè splendidam spinam appellarem, quod capitulis plantæ huius conuenire uidetur, læues quidem atque splendide in orbem circa capitula dispositæ sunt spinæ, vnde uulgò *Stellaria* uocitatur; atque *Calcitrapa* etiam, quia cùm spinis sit pungentibus, atque duris, hominibus cæterisque animantibus ipsam pedibus terentibus infesta est. Quamobrè Plinij in textu in quo corruptè legitur Hippope scriptum fuisse censo eo loco, pro Hippope Hippopæston; quod nomen ex ἵππο, & πάϊς, quod est ferio, conflatum uidetur, unde ualdè, feriens spina dici posset: quidam scribunt Hypopæstum, nam Hypophæstum, in Pauli Aeginetæ codice legitur, & etiam in Plinio, & aduerbio illo ὑπὸ, sub ferientem spinam dicere oporteret, uel subcluidā. Quare *Stellariæ* nomen, à læuitate spinarum, & forma, *Calcitrapæ* uerò ab effectū, vulgo remansit plantæ huic, atque antiquo nomini ἵπποφαισον, uel ὑπόφαισον, & ἵπποφάισον, uel ὑπόφαισον satis cōguens. Plinius ne harum plantarum Hippophyeos & Hippopes etymon ignorasse uideretur; diuinans ait, *Debent accommodata esse equorum natura, neque ex alia causa nomen accepisse.* Mihi uerò

Nomen.
Etymon.

Lib. 22.
c. 12.

Lib. 22.
c. 12.

- Hippophyes tantum nomen respondere uidetur, nam ἵπποφύες, equis genitum, significare uidetur: atque non ἵππο sed ἵππος interpretatur: Hippope uero, quam alio loco idem Plinius Hypophæstum appellat, minimè respondet, cum ὑπό non ἵππο, habeat. Huius notæ hæ sunt apud Dioscoridem. Ἰππόφαιτος, οἱ δὲ καὶ τοῦτο Ἰπποφαῖς καλοῦσι. φύεται ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις, ἐν οἷς καὶ τὸ ἵπποφαῖς καὶ αὐτὸ γναστικῆς ἀκάνθης ἔδος ὑπαρχόν. ἐστὶ δὲ χαμαιπτερὴς, ἔχον μόνον φυλλάρια μικρὰ ἀκανθάδην, καὶ κεφάλια χαῖνα. οὔτε δὲ καυλὸν οὔτε ἀνθος φέρει. ῥιζὰν δὲ παχέαν καὶ μαλαχίῳ. Hippophæston, quidam & hoc Hippophætes appellant. Nascitur in hisdem locis quibus & Hippophætes. & ipsum fullonicae spinæ species existens. Est autem humile, solum habens folia parua spinosa, capitulaque inania. Nec caulem, neque florem producit. Radicem habet crassam, & mollem. Plinius habet, Est & altera Hippope, sine caule sine flore, folijs tantum minutis. & alibi de herbis quæ alijs
- Lib. 4.**
Descriptio.
- Lib. 22.**
c. 12.
- Lib. 16.**
c. vlt.
- Lib. 27.**
c. 10.
- Lib. 26.**
c. 8.
- Li. 6. c. 5**
- Locus.**
Forma.
- innascuntur plantis loquens, ait, Quod uero in spina fullonia hypophæston, calyculis inanibus, folijs paruis, radice alba, &c. & alibi, Hypophæstum nascitur in spinis, ex quibus fiunt ænæ, (quidam legunt, pile,) fulloniae, sine cauliculo, sine flore, capitulis tantum inanibus, & folijs paruis multis herbacei coloris, radículas habens albas, molles, &c. Ex his postremis descriptionibus uidetur Plinius dicere, quod Hypophæstum sit alia res spinæ fulloniae innascens, quod in Dioscoride & alijs non inuenitur, quare cenfeo ipsum hallucinatum his locis, & putasse aliquid huic plantæ innasci sicut in Thymo, quod Epithymon uocatur, cuius altera species, Hippopheon dici asserit idem Plinius, ibi, Item Epithymum qui est flos è Thymo, Satureiæ simili. Differentia, quod hic herbaceus est, alterius thymi albus: quidam Hippopheon vocant. De hoc Hypophæsto nihil habet Theophrastus, etsi alterum describere uideatur de παρακαρθαφύλλοις loquens ibi οὐχ ὥσπερ φλεῖς καὶ ἵπποφάεις ἀνάκανθα τοῖς φύλλοις, in qua descriptione Marcellus Virgilius, & qui Emblemata scripsit, atque Dalechampius postremo errore decepti, uerba sequentia, quæ huic plantæ conuenire videbâtur coniungere: nec animaduertunt, descriptionem illam Capparis delineationem atque naturam exprimere. Sed ad plantam redeo atque quam depinxi ex omnibus adhuc cognitis etiam exoticis, si quæ alia, respondere uidetur Dioscoridis delineationi. In arenosis propè litora atque tenuibus solis, frequentissima hæc est, Autumni fine exit ex radice digitum vel magis crassa, molli, succosa neruum habete ut aliæ radices, duriusculum, colore albe-



albescente longa pedem Rhaphano simili, ex qua folia in orbē humi strata emergunt, colore uiridia, hirsuta parum mollia respectu aliarum spinosarum, parua admodum & laciniata profundē; per extremos sinus ueluti Sonchus, aculeos habentia quibus ἀνανθάδην esse dici possunt, sed in Plinio nihil de spinis in folijs habetur, atque in Dioscoridis textū inter uerba *μικρά, & ἀνανθάδην*, comma est signatū, quare Marcellus Virgilius, *folia tantum parua, capitulaque spinosa habens*, interpretatus est. Sed cū sit γνάφιν spina, cuius usus in uellicandis uestibus sit, quod uerbi γνάφω est proprium, unde γνάφοι dicuntur instrumenta quo lana carminantur: ut Suidas habet *ἡ γνάφος ἐν κύκλῳ κείνῃ εἶχον &c.* Interpres uerō Aristoph. in Pluto, *γνάφος vel γνάφος ἀνανθάδες τί, φ' ἔχουσιν τα ἱμάτια*: capitula etiam ἀνανθάδην esse uidentur; quæ hunc usum facile præbere possunt, cū sint in gyrum aculeata, atque uestibus hærentia: unde Echinion, Lappaginem, uel minorem Lappulam aliqui appellarunt, quæ etsi Hippophai sint supra scripta, huic tamen conueniunt; nam Hippophæes ácinos habet molles, nec aculeatos, & cōfusa sunt in principio capitis huius nomenclaturæ in qua duæ plantæ describuntur. In medio uerō foliorum umbilico Nouembri mense inueniuntur in omnibus unicum, uel plura ueluti capitula, sine caule, sed inter folia hærentia, colore ex luteo albescencia, quæ nihil aliud sunt nisi spinæ, foliolorum modo exorientes, ac ueluti folia nostratis Aloës composita conspiciuntur, alternatim aliæ inter alias exeuntes: nihil intus continentia, quare ideo χαῖνα, appellata sunt, & planta χαμαιπετές, quam Plinius sine caule, sine flore, capitibus tantum inanibus esse ait. Nec est mirandum plantam hanc ita ab Antiquis mutilam descriptam fuisse, sine caule, humilē & sine flore, capitulis inanibus: nam hoc etsi ijs uitio uerti possit, cū plantas multas serò caulem, uel florem edentes, ac etiā præcoces sine caule atque flore descripserint: tamen non ab re uidetur factum; sapius enim, cū longo tempore caule & flore uiduæ sint, sine illis inueniuntur; quare nota illis magis præcipua, atque congruenti, descriptæ uideri possunt. Ex eo tempore ita humilis, capitulóque inani, ad Aestatis initium usque durat: atque exinde caulem incipit edere cubitalem hirsutum, sed siccatus læuis efficitur: multis alis diuisis, singulisque alarum sinibus folia hærent tenuiora, inter quæ capitula

Tempus.

pitula exeunt spinis diuifa uti priora, ex uiridi, in purpureum luteum albicantemque colorem definentia, postea in uentrem siue corpus extuberantia, quæ Aestate flores promunt purpura scentes Cyanoides sed mitutis *πράλοις* refertos: quibus exactis femina perficiuntur pappo inuoluta Cnici modo, sed minora admodum compressa, colore cinereo: gustu amaro. Radicis sapor & odor ingratus, acris. Huic plantæ Dioscorides has vires tribuit. Ex huius folijs, radice, & capite, expressum succū* sicca-
 to, & pondus trium obolorum, cum aqua mulsa cui velis exhibeto. Per
 hunc enim purgatio, aquam & pituitam ducit. Priuatim verò conuenit. Or-
 thopnœam, comitalem morbum, & nervorum affectionem patientibus hæc
 purgatio. Plinius, Succus earū exprimitur Aestate ad soluendam aluum,
 tribus obolis, maximè in comitalibus morbis, & tremulis hydropicis. Con-
 tra vertigines, Orthopnœas, paralyseis incipientes. Huius sicut superio-
 ris non meminit Galenus: Paulus Aegineta quæ à Dioscoride
 describuntur, ad uerbum ferè transcripsit, nec amplius aliquid
 refert. Recentiores uerò etsi plantæ huius succi collectione
 ut à Dioscoride traditur non utantur, cum non sit in usu: ad al-
 uum soluendam; decocto tamen radicis, atque semine contuso
 plebeij utuntur ait Pena ad calculum extendum, urinâsque
 ciendas. cui tanta uis, ut etiam anastomosi facta uenarū emul-
 gentium, aut ureterum, cruentum lotium proliciat. Non est
 Hippophæstum quod Plantarum Auctor depingit, nam & ipse
 met illud affirmare noluit, cum ab historia sua satis discrepet.
 Hanc Dalechampius pro Theophrasti Myacantha affert ratio-
 ne motus, quia spinas iuxta folia habet, atque ideo sit ex *παρα-
 καρβοφύλων* genere, inter quæ Myacantha à Theophrasto nume-
 ratur, absque aliqua plantæ nota alia; sed Myacantha auctori-
 bus Dioscoride, Plinio, & alijs ex genere Asparagorum est, qua-
 re si coniecturæ indulgendum est, potius Asparagi speciē Cor-
 rudam tertiam à Carolo Clusio depictam pro Myacantha af-
 ferrem, quæ, cubitales, inquit, habet virgas, ramosas, candidas lignosas
 & priori similes, firmis, candicantibus & deorsum spectantibus spinis al-
 ternatim, & secundum virgarum, ramorumque inæqualium inflexionem
 horridas: ad quas quina aut sena folia simul & ex eodem capite prodeunt,
 prioris speciei folijs longiora, mollioraque, quæ commanducata subdulcia,
 & aliquantulum gummosa deprehenduntur: flos inter folia ex alarum si-
 nu longo tenuique pediculo dependet ex viridi pallescens: deinde fructus
 propè

Vires.
χυλίσας,
ξηραίνε
 non *ὀπι-
 ζομένην*
 ut in
 Hippo-
 phaë.
 Lib. 27
 c. 10.

Li. 6. c. 4

Lib. 2
 hist. rario-
 rum stir-
 pei. cap.

83

propè modum rotundus, qui tricoccus videtur (tametsi vnicum granum in se contineat, raro bina, foris nigrum, intus candidum firmum, rii in superioribus,) initio virens, per maturitatem rubescens, & carnosus, siue succū & pulpam continens lentam & viscidam: radice firmatur multiplici, veluti alij sylvestres Asparagi, longa, crassa, intus alba, foris flauescente. Fert aliquot thyrsos, qui aliorum Asparagorum modo manduntur crudi & cocti cum oleo, aceto, & sale. Nusquam abundantius, quàm supra Olyssponem salebrosus locis iuxta vias non procul à Tago obseruavi: nascitur tamen & alijs Lusitanie locis, & tota ferè Batica. Octobri fructu maturo inueni, & raros etiam hinc inde sparsos flores.

Apocynum Dioscoridis.

Nomen,



Descriptio.

Lib. 24.
c. 11.

LANTARVM pleræque nomen ab inuentore acceperunt, eoque deinceps nomine appellata fuerunt: alia à loco in quo nascuntur, plurimæ uerò à ui uel effectū, inter quæ est hæc connumeranda: quæ quia canes interimit, nomen à canibus habet, ἀπὸ τοῦ κυνὸς, ἀπὸ κυνον dicta: cui vi respondent etiam nomina alia, κύναρχον, κυνόμορον, κυνοκτόνον, & κυνοκράμβη. addiderunt etiā à ui necandi Pantheras, παρδαλιαρχές. Hanc verò, ut ab hominibus caueatur, quia uenenosa sit, atque ne pro Asclepiade, à similitudine decepti accipiant, Dioscorides ut alia quædam uenenosa diligenter descripsit: atque notā illi priuatam ab Asclepiade alienam adscripsit, luteum scilicet succum, quo turgere asserit: eius verba sunt hæc. Ἀπὸ κυνον, οἱ δὲ κύναρχον, οἱ δὲ παρδαλιαρχές, οἱ δὲ κυνόμορον, οἱ δὲ κυνοκράμβη καλοῦσι, ἔρνος ἐστὶν ῥάβδους ἔχων μακράς. λυγρόεις, δυσραύςους, φύλλα κισσῶ ὅμοια, μαλακώτερα δὲ καὶ ὀξύτερα κατ' ἄκρον, βαρύσσημα, ὑπόγλυχρα, ὁποῦ μετὰ μῆλινου. καρπὸς δὲ ὡσεὶ λοβὸς κυάμων περὶ δακτύλου τὸ μῆκος, δυσλακώδης, ἐφ' ᾧ σπερματὰ σκληρὰ, μικρὰ, μέλανα. Apocynum siue Cynocrambe frutex est virgas habens longas, flexibiles, in aliquibus legitur, δυσώδης, scilicet graueolentes, frangenti contumaces: folia Hederae similia, molliora verò & acutiora in summo, graueolentia, subuiscosa, succo referta melino. Fructum ut siliquam Fabarum digiti ferè longitudine, folliculi specie, in quibus semina, (Marcelli textus habet λευκά, alba scilicet,) dura parua, & nigra. Plinius



Forma.

Locus.

Vires.

Lib. 6. de
simpl.
med. fac.

nus uerò habet, *Frutex est folio Hederae, molliore tamen, & minus longis viticulis, semine acuto, diuiso, lanuginoso, graui odore*. Nec aliquid de succo luteo refert, non mirum quidem est, nam alijs rebus grauioribus incumbere oportebat. Sic & Dalechampius atque Lobellius nullo facultatis facto periculo, quia planta hæc similis erat Asclepiadi, nisi quòd succum luteum, & flores haberet fuscis, Asclepiadem esse scripserunt. Cur potius cum similis sit etiam facie Apocynis alijs, & forsan eadem cum Apocyno non repente floribus tantum colore diuersis habeatque luteum succum, non Apocynum est denominanda? Infelix quidem est hominum natura, alienis erroribus supposita, quibus vitam cum morte commutari accidit. Huius quidem forma hæc est. Radice nititur fibrosa Asclepiadi non dissimili, viticulis flexilibus, læuibus, longis, quælibet fulcra, aut alia ipsi propinqua scandit non minus quam alterum Apocynum, quatuor cubita uel magis longitudine æquans extenditur, folia habet hederacea, mollia, uiridia, læuia Asclepiadi similia nonnihil in summo acuminata: flores Apocyno repenti uulgari similes, sed colore pullo, parum in purpureum uergente, quamobrem nigrum florem habere dicitur. Siliquas, & semina papposa uti aliud uulgare apocynum compressa & nigra Augusto mense perficit. Succo turget luteo, ingrato uti tota planta. Hanc nasci in collibus Monspelliensis agri Frontignanæ uicinis, tradit Lobellius, sub nigræ Asclepiadis nomine, quod an rectè impositum sit iam demonstrauimus. Hanc uires Dioscorides has habere tradit. Huius folia cum adipe subacta, in panes efformata, & obiecta, occidunt canes, lupos, vulpes, pantheras. Statim enim coxendices ipsorum resoluunt. In Plinio uerò legitur. *Sic & pleureticos, & omnes lateris dolores, Apocyni semen ex aqua. Frutex &c. Canes & omnes quadrupedes necat in cibo datum*. Ex his uidetur, homini salutare, quadrupedibus uenenum esse, Galenus uerò contradicere uidetur, ait enim. *Apocynum, aut Cynocrambe. Vocant autem quidam eam Cynomorum, quandoquidem canes celerrimè interimit, sicut Lycostonum Lupos*. Est autem hominibus re-nennum; herba multum grauius olens: proinde omnino calida est non instrenuè, non tamen proportionè desiccat. Itaque illita admodum digerentis est facultatis. Aliqui non abs re Plinium interpretantur, ut Apocyni semen ex aqua, intelligatur impositum, non intrò sumptum

nam

nam digerendi cū habeat facultatem, poterit lateris dolores sanare, & si omnes dicat: sed certè intrò sumptum Plinius intelligere uidetur, cū ad superiorum similitudinem dicat, Sic &, &c. Hoc tamen periclitatoribus est relinquendum. Obseruandum denique est, quod Emblematum scriptor, & Auctor Plantarum illū sequutus tradiderunt non quidem meo iudicio rectè: legunt enim textum Dioscoridis hoc modo. *Huius folia cum farina in panes coacta*. Græcè uerò ταύτης τὰ φύλλα συνείασι ἀρτοποιούμεενα. Plantarum uerò Auctor corrigit etiam sequutus latinam interpretationem superiorem, & pro *είασι, συνείασι* legendum statuit: quibus respondendum est, textuum peruersores & malos interpretes esse. Textum uerò Dioscoridis semper & multos quos habeo uarijs locis editos, habere συνείασι, adipe scilicet, *είασι, είασι*, Adeps interpretatur: non autem *είασι*, ab *είασι* *είασι*, quod farinam significat, aqua subactā. Item canes folia Apocyni graueolentia farina mixta nō tam facile nisi fame pereant, edere uelle est censendum; Adipe uerò allesti facile et si cibum non appetant, folia ipso commixta decepti à pinguedine comedent: non enim nec farina, nec adeps interimūt, quæ aliās alunt canes, sed folia Apocyni: quæ ut canis auidè ac multa deuoret, aliqua re cani grata, & sic adipe commiscenda, & in globulos placentasque panis modo conformanda sunt. Hæc recta mea sententia videntur.

Phu Dioscoridis.



ON potuit Dioscorides, proprioribus notis omnibus, atque priuatim, à radice ad flores usque, plantam Phu describere: atq. si in omnibus [Deo optimo maximo placuisset] aliarum plantarum descriptionibus ita accuratè illarum historiā tradidisset, profectò nec planta foret ulla, quæ nobis nota non fuisset.

Huius descriptionem tam claram, atque plantam hanc celebrem, cuius radix in Theriacæ compositione non minima dosi commisceri debet, nescio quomodo tantorum uirorum adhuc nemo animaduernerit: immo quod peius, omnes unica uoce



Valerianā maiorem dictam ab ipsdē, pro Dioscoridis Phu vsurpant, non solum putantes cōgruere descriptioni Dioscoridis, atque genuinam esse, sed illius textum in aliquibus postremo iuxta Valerianæ dictæ formam emendare volunt, impendiō morosiores, qui illam negant esse Dioscoridis Phu, iudicantes: atque minorem Valerianam sic dictam, siue sylvestrem refellent; quam, etsi folijs Dioscoridis Phu quadret, dicunt, non tamen radice, & reliquis, non sine graui errore. Hoc autem im-

putandum negligentiae collationis textus Dioscoridis, cū plan-
ta ab ipsis proposita: vel dicendum, uerba Dioscoridis, nedum
sensum hoc loco eos non intellexisse, ut ex sequentibus appare-
bit. Ait enim Dioscorides, Φοῦ, οἱ δὲ καὶ τοῦτο ἄγριον νάρδον καλοῦ-
σι, γονᾶται μὲν ἐν πόντῳ, φύλλα δὲ ἐλαφοβόσκῳ ἢ ἱπποσελίνῳ παραπλήσια
ἔχει, καυλὸν πηχυαῖον, ἢ μείζω, λεῖον, τρυφερόν, ἐμπόρφυρον, μεσόκαιον, διει-
λημμένον γόνασιν, ἀνθὶ πρὸς τὰ τοῦ ναρκίσου, μικρότερα δὲ, καὶ τρυφερώτερα, καὶ
ἐν τῷ ὑποδάκῳ διαπόρφυρα. ῥίζα δὲ ἢ μὲν ἀνωτέρω, περὶ δακτύλου μικροῦ
τὸ πᾶχος, πλάγια δὲ ὀρθή, ῥίζα ἔχει καθάπερ χεῖνος ἢ μέλας ἐλλέβορος, ἀλλή-
λοις ὀρθῶς πλεγμένα, ὑπόξανθα, εὐώδη, καρδίζοντα τῇ ὁσμῇ, μετὰ τινος βάρ-
ρους βρομάδους. Thu, quod est ipsum aliqui sylvestrem Nardum appel-
lant. nascitur in Ponto. Folia quidem habet Elaphobosco, aut Hipposelino
similia: caulem cubitalem, aut maiorem, laeuem, tenerum, purpurascen-
tem, cauum, geniculis distinctum; flores ad Narcissi flores accedentes,
minores tamen, et teneriores, ex albicante purpureos. Radix vero superius
crassitie est circa paruum digitum, habet quidem obliquas fibras, velut Iun-
cus, aut niger Elleborus, ad inuicem complicatas, subfluas, bene olentes,
Nardum cum odoris grauitate quadam referentes. Cui descriptioni
quantum respondeat planta Valeriana minor, siue sylvestris
dicta, à me proposita ab omnibus reiecta, quantumque ab eis-
dem recepta absit, ex sequentibus patebit. Habet quidem hæc
folia, ut etiam Dioscoridis delineationi respondeat historia,
Hipposelino, sed positu Elaphobosco similia, plura tamē utrin-
que pinnatim, ex opposito longo petiolo hærentia, ut in Sio
aquatico, per ambitum magis laciniosa, sed aliquando paucis,
uel nullis incisuris diuisa, humi inclinata: caulem cubitalem,
aut etiam maiorem, qui annis, & cultu ad hominis proceritate
assurgit, rotundum, sed aliquando in imo tantum hirsutum, po-
stea totum laeuem, striatum, cauum, tenerum, purpurascētem,
ut etiam foliorum petioli circa radices: geniculis distinctum,

Lib. 1.
Nomen.
Descri-
ptio.

Forma.

in quibus singulis bini foliorum ordines, ex aduerso, & etiam aliquando terni, ut in folijs *Lyfimachia* luteæ uisitur, illū cingunt: in summo uerò flores plurimos habet, uelut umbellatim confertos, ut *Nardum montanum* radice bulbosa, & *Valeriana* maior dicta, paruos admodum, oblongos, cauos, in quinque foliola desinentes, atque exeuntes ex singulis uasculis onalibus, forma ampullæ oleariæ fictilis compressæ: quibus, floribus decidis, labia intumescunt, quæ denique in lanuginem soluuntur, in gyrum apertam; & uascula illa, quæ eadem semina sunt, siccata decidunt, atque lanugine illa ex labijs procedente, ut alia papposa semina euolant. Florum color ex albo purpurascit: forma uerò *Narcissi* flores imitari uidentur: nam & *Narcissi* flores habent in ipsorum imo illud extuberans, ubi continetur semen, & deinde tenuiores in quinque aut sex foliola desinunt: nec amplius in florum *Narcissi* collatione est aliud requirendum, nam *Dioscorides*, non positum florum, sed illorum formā similem *Narcissi* floribus esse tradidit: teneriores sunt, & minores admodum, atque hoc loco omnes consentiunt, & ueritas est, ut corrigi debeat textus *Dioscoridis* corruptus, & pro, *μείζω, μικρότερα*, legendum sit. Radicē habet in superiore sui parte, ex qua scilicet caulis erumpit, crassā instar digiti parui, quam plures carnosæ fibræ, idem principium habentes, ut *Iuncus*, & *niger Elleborus*, quibus *Dioscorides* comparat (*Ellebori* quidem utriusque radices, ut idem *Dioscorides* descripsit, à quodam paruo capitulo *Cepæ* simili pendentes conspiciuntur, atque radices esse non fibras dixit, ibi *ρίζαι, &c. οἶονεὶ ἀπὸ τινος κεφαλίου κρομμυώδους ὑρτημέναι*;) aliæ, super alijs ordine dispositæ ternæ, quaternæue, obliquè nitentes, circundant: sed quæ alijs incumbentes uisuntur, in quinque, plurésue partes radicis orbem diuidunt, ut stellam penè diuisura repræsentent. Parum sub terra & lateraliter semper nitentes inueniuntur, atque obliquè repentes se quotannis propagant; & radix nouella, uetustiori complicatur, ut etiam in *Elleboro* obseruatur: quare si uerba illa Græcè, *ρίζα δὲ ἢ μὲν ἄνω τέρω, περὶ δακτύλου μικροῦ τὸ πᾶχος: πλάγια δὲ ἢ περὶ ρίζας ἔχει καθάπερ χίτων, ἢ μέλας ἐλλέβορος, ἀλλήλοις ἐπιπεπλεγμένα, &c.* cōsiderentur, nihil aliud, nullámque alterius plantæ radicem describere uidebuntur. Colore subpallidas, ficas uerò magis flauas, odoratas, *Nardum*, sed *hircina* quadā

gra-

grauitate admixta, referentes, unde Phu nomen est adepta: nā quisque odoris graueolentiam abhorrens statim *Phu*, sonitum naturā exprimit. Nec potest intelligi, ut radicis pars superior aliquo pacto sit obliqua Rusci modo, cuius radice Phu adulterari habetur in Dioscoride; nam respondetur, si Rusco fuisset similis in totum, non Iunco, & Elleboro similem Dioscorides fecisset, quibus ex uno principio ueluti capite, fibræ obliquæ producuntur, sed Rusci modo obliquam, & geniculatam, (dum uetustior est, Rusci radix) dixisset: item nō superior radicis pars in Phu est obliqua, sed tantum fibræ obliquæ per terram feruntur, atque tota radix similior est Iunci, & Ellebori radici, ut iā dixi, & facilius adulterari potest radix Phu, Rusci nouella radice, cum forma minus à radice Phu distet, differt quidem quia fibræ Rusci difficillimè possunt frangi, & minus in puluerem reduci, quod contrā est in Phu radice, quæ facillimè & frangitur, atque tunditur. Quantum verò Rusci radix (uetustissima esse oportet, ut Valerianæ maioris dictæ radicem æmulari possit) colore, nam albo, non flauo est, geniculis, atque multitudine oculorum, quibus non in rectum producitur, ut dicta Valeriana, sed spicati operis obliquam lineam repræsentans, differat ab illorum Valeriana maiore, quisque, radicis plantæ utriusque conspectione, cognoscere poterit: non dico à Dioscoridis descriptione abhorret: qui cum designare uoluit radicem obliquam geniculatam, & summo cæspite nitentem, ut Acori radicem, atque Asari, & similium, radicem obliquam dixit, non fibras, *ρίζαν πλάγιαν*, non *ἐμπέριζαν πλάγιαν*, scripsit: quæ aliàs *ρίζας* appellauit. Quare reiicienda est illorum sententia, qui putarunt summam radicem Phu debere obliquè spargi, Plinij forsā textu moti, qui ait, *radice obliqua, villosaque, & imitante auium pedes*. & dicunt radicis partem superiorem obliquam esse debere, quibus respondeo, uillos *ἐμπέριζαν*, non *ρίζαν*, Dioscoridis sententia obliquè spargi debere: & sic si, & pars superior radicis obliqua sit, & fibræ, nullum posse è terra alimentum trahere; cum utraque partes supra terram ferantur, nam & Valerianæ maioris dictæ pars obliqua, & superior, semper supra terram emicat, & si obruatur, statim marcescit. Neque poterunt aliquam cum auium pedibus similitudinem afferre. Quare Plinius, quia nunc breuius plantæ Phu descriptionem reliquit, ex Dioscori-

Lib. 12
c. 12.

de,

de, ex quo transcripsisse censetur, iisdem est interpretandus: ut scilicet intelligatur tota radix obliqua, quæ eadem uillis est diuisa: uillos quidem Plinius non solum hoc loco, sed in Astragali descriptione, cui uillosam dixit esse radicem, & alibi, crassas fibras intelligit. Nullam quidem habet radicem potiore, sed omnes fibræ sunt radices quas Dioscorides verbo ἐπιρίζια, rectè expressit, atque πλάγια, esse dixit, sicuti in planta à me proposita uisitur, non autem aliam radicis partem obliquam intellexit; ex quo percipitur omnes illas fibras esse radices, nec magis præcipua illarum una alteri erit, sed omnes illæ simul radicem conficere, ut in Elleboro, & alijs consimilibus, ideoque ἐπιρίζια denominauit. Hoc autem cognoscitur, nam si quam uelis ex illis radiculis demas, nihil detrimenti plantæ afferes, immo si unicam relinques, non ideo plantæ euanesceat, sed repululabit: hoc amplius addo, quod pluries obseruauit in hac planta, unica ex illis radiculis sata, paucis post diebus folia emergere, atque deinde se in latum propagare, atque ἐπιρίζια reponere, semper enim obliquè feruntur oculos emittentes, quotannis ita se propagantes; uiuaces quidem sunt admodum. Huius uerò plantæ nouella radix perbellè auium pedes exprime uidetur, [etsi Plantarum auctor Plinium emendare uoluerit, ut quod ille latinè, *auium pedes*, expressit, sit uersio græci textus, τοὺς τῶν ὀρνίθων πόδας, corrupti; quem corrigendum iudicat, atque pro, ὀρνίθων πόδας, μελαμπόδιον, reponendum, latinè uerò *Melampodion*, quod nomen est Ellebori, Melampodij nomine appellati, quia primus Melampus pastor, illius uim purgatricem inuenerit, qua filias Præti infantes ad pristinam restituit sanitatem, ut idem Dioscorides narrat: & sic Elleboro similis erit meam sententiam adiuuans:] nam quatuor, uel quinque fibras habere inuenies carnosas, obliquas natura, quæ expansis digitis, pedes auium repræsentant, quod si quis ueritatis studiosus uidere uoluerit, uerè cognoscet in plantæ à me propositæ radice nouella, atque etiam in uetustiore, sed in illa plures inueniet eodem ordine fibras compositas: quod in radice Valerianæ ab ipsis receptæ, nullo modo nec artificiosè extorta inueniet, nec Dioscoridis textu qualicunque uersione persuaderi poterit. Quare sublato radicis argumento, quo iam omnes hallucinati sunt, si rectè considerentur reliquæ partes

Lib. 4.
c. de Elle
bor. ni-
gro.

partes Valerianæ ab ipsis receptæ, multo minus Dioscoridis textui respondere uidebuntur: & iam radicis cum textu collatione facta, & reiecta, ad folia uenio, quæ nullam cum Olusatro, & Elaphobosco similitudinem habent, Nardum montanum ad unguem, & Eryngij folia, atque totum plantæ habitum referunt: quam si Dioscorides describere uoluisset similem folijs Nardo montano, non Elaphobosco dixisset, atque radice tantum non bulbosa differre, sed obliqua & geniculata: prima namque folia oblonga sunt Plantaginis forma non laciniata: quæ uerò cauli hærent profundis Erucae aut Scabiosæ uulgò dictæ lacinijs, atq. Eryngio nõ dissimilibus, sunt diuisa, ut in Nardo montano uisitur. Non. n. à principio ante caulis eruptionem quæserò & post annum immo bienniũ edit, ex aduerso pinna- tim petiolo hærent folia, ut in Elaphobosco, & Sio aquatico, quod simile folijs est Hippofelino Dioscoridis iudicio: forma uerò Hippofelino accedentia, ut in planta, à me proposita, quæ à principio in lobos diuisa sunt per ambitum serratos ut Hippofelini folia & Elaphobosci: mirorque quibus oculis, quauē mente hæc uiderint, nobisque tradiderint: caulem neque aliquando mihi, amicisque contigit rubescentem uidere, multis plantis conspectis, illum quidem semper colore cinereo Brassicæ, & Nardo montano similem, permanentem. Quod contrā est in caule plantæ à me propositæ, qui semper, & ad flores usque ex uiridi purpurascit, flores item non ut planta à me descripta purpurascunt, sed uel dilutius, uel nihil. Quare Valerianam illam maiorem appellatam uulgò, Nardi montani speciem non bulbosam, & forsan eandem cum Hirculo, radice Celtico Nardo simili potius iudicarem: quod si quis nouellam illius plantam, quæ cum sit parua sine caule est, consideret: non dissentiet similem esse Celtico Nardo, sed minorem, neque ita amaram, neque ut Nardum Celticum uerū odorem remittentem, sed hircinum quid, ut etiam syluestris hæc Valeriana redolentem: colore magis pallido: quæ satis respondere uidetur historiæ à Dioscoride traditæ, ait enim. *Adulteratur autem simul euulsa, aliqui legunt, imposita cum ipsa, herba simili; Lib. 1. c. quam propter odoris uirosi olentiam, Hircum appellant. Facilis tamen de Nardo est cognitio. Est enim sine caule herba, & candidior, & minus oblonga do Celtici folia habet, neque radicem amaram, aut aroma redolentem, quemadmodum co-*

verum;

Lib. 12

c. 12.

verum, Celticum Nardum, habet. Plinius cum Gallico Nardo semper nascitur herba quæ Hirculus vocatur, à gravitate odoris, & similitudine, qua maximè adulteratur. Distat quod sine cauliculo est, & quod minoribus folijs, quòdque radices, neque amaræ, neque odoratæ. Non enim amarorem, neque odorem habere poterit tam parva planta atque imperfecta, uti maior, & perfecta planta. Quibus sic exposita planta à me proposita, Phu verum, atque genuinum Dioscoridis est posthac appellandum, atque in medicamentis utendum, altera ab alijs primùm eo nomine insignita falsò, alijs usibus reponenda, cùm iam non illam, sed quam proposui Dioscoridis delineationi magis respondere contra omnium sententiam demonstraverim. Floret Maio mense, atque Iulio perficitur. In montibus, collibusque non aridis, sed aliquantum umbrosis, atque etiam uliginosis & pratensibus hîc frequens. Huius plantæ radicis odor, atque sapor longè superat Valerianam maiorem sic dictam: atque ut ait Dioscorides. *Vim habet calefaciendi, & ciendi urinas, arida pota: sed & decoctum ipsius idem efficere potest. Facit etiam ad lateris dolorem, & menses ducit, & antidotis miscetur.* Galenus uerò, Phu, aromatica quodammodo est huius herbæ radix, Nardo viribus similis: sed tamen ad pleraque infirmior, urinas monet plus quàm Indica, aut Syriaca Nardus, perinde ut Gallica. Recentiores uerò sub nomine Valerianæ sylvestris has vires tribuunt. Ruptis, vulsis, ex alto deuolutis opem fert. Decoquuntur folia ad aphtas, & oris vlcera. Antidotis item inseritur. Præter has vires plantæ huic tributas, addo & hanc proprietatē, iamdiu in multis, atque memetipso expertam, ut pulueris radicis plantæ huius spontè ortæ, extirpatæ antequam caulem edat, cochlearij dimidium cum uino, aqua, lacte, aut alio quouis decenti succo, & ægroti commoditate, & ætate, semel sumptum, aut bis, Epilepsia correptos liberet. Hanc exhibendam pueris, & præsertim infantibus, hoc morbo faciliè laborant, quibus lacte propinandum puluerem iussi, amicis dono dedi: qui deinde, Diuino prius numine fautore glorificato, puluere huius plantæ illis restitutam sanitatem affirmarunt. Hoc & alijs adultis nonnullis.

Tempus.

Locus.

Vires.

Lib. 8. de

simpl.

med. fac.

PISCIVM ALIQVOT PLANTARVMQVE NOVARVM HISTORIA

FABIO COLUMNA AVCTORE.



AD LECTOREM.



SVPERIORE plantarum historia, hanc Piscium aliquot, plantarumque novarum historiam seiungere volui, vt si fortè inter edendū, alias antiquorū delineationibus respondētes plantas addere libuerit, suis locis non confusè reponere possem. Quæ verò post horum editionem consequutus fuero, nisi Dioscoridis commentarium, vt dixi, perfecero, in alteram editionem expecta.

Φράγκισκος ὁ Μαῦρος εἰς Ρ'ινόβατον.

Ρ'ινόβατ' οὐκ ἐλάχισον ὀφείλεις μνῆρι τῇ σῇ,

Ὅπῃ σε θαλπωρὴ γέιναιτο καὶ χάριτι.

Ἀλλὰ σοφῶ πλῆστον Φαβίῳ, ὃς πολλὰ μογήσας


Εἰς τόδε σ' ἄγνωστον πᾶσιν ἐδείξε βροτοῖς.

Αἶε καὶ Φοῖβος τοῦτω καὶ δέξιός εἰν

Ζεὺς, ὅφελος δ' ὄσσει γὰρ μέγα θυμοσόφοις.

Εἰς ὄνυχος δῶαται γιγνώσκειν ὧδελέοντα

Παιδευτός, κεφαλὴ χαῖρε σὺ δαυμασίην.



De Rhinobato, siue Squatinoraia.

X duobus nominibus, Ρῖνν scilicet, & Βάτος, compositum est nomē Rhinobatus, quod Gaza Latinē Squatinoraia interpretatus est, nā ex Squatina & Raia oriri creditur, vt Aristoteles asserit: eius verba sunt hæc, Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἰχθύων, παρὰ τὰς συγγενείας οὐδὲν ἄπαι σωμαζόμενον. Ρῖνν δὲ μόνῃ δοκεῖ τοῦτο ποιεῖν καὶ Βάτος. ἔστι γὰρ τις ἰχθύς ὃς καλεῖται Ρῖνοβατος. ἔχει τὴν μὲν κεφαλὴν, καὶ τὰ ἐμπροσθεν Βάτου, τὰ δὲ ὀπίσθεν Ρῖνν, ὡς γινώσκουσιν ἑκατέρωθεν τῶν ἰχθύων. Alios sanē quidem pisces præter cognatos, coire nemo vidit. Squatina verò sola, & Raia id facere videntur. est vtiq̃ue piscis quidam, qui Rhinobatus dicitur. habet enim caput, & anteriora Raia, posteriora verò Squatinæ, vt qui ex vtroque ortum ducit. Quem textum Plinius ferè ad verbum transcripsit, ait enim. Piscium diuersa genera non cōstunt præter Squatinam & Raiam, ex quibus nascitur priori parte Raia similis, & nomen ex vtroque compositum apud Græcos trahit. Neque apud alios Auctores aliquid de eo inueni, præterquam apud eundem Aristotelem, ubi de diuersorum generum coniunctionibus verba faciens sic ait, Ἐπὶ δὲ τῶν θαλασσιῶν οὐδὲν ἀξιώλογον ἐώραται. Δοκοῦσι δὲ μάλιστα οἱ Ρῖνοβατοὶ καλούμενοι γίνεσθαι ἐκ Ρῖνν, καὶ Βάτου συνδυαζόμενων. In marinis nihil dignum memoratu visum est, videntur verò maxime qui Rhinobati dicuntur gigni ex Squatina & Raia coniunctis. Ex his autem colligo, Aristotelem potius affirmare Squatinæ & Raia cōiunctionem, quàm de illis incerta tradere; & nescio quomodo vir tantæ doctrinæ Rondeletius, propterea quòd neque sibi, maxima adhibita diligentia, neque piscatoribus vnquam contigit piscem hunc videre, existimet neque Aristotelem, neque Plinium uidisse, atque hunc piscem esse planè commentitium, & re ipsa non existere. Qua de causa conatur extorquere verba Aristotelis, dicens, Squatinam itaque cum Raia coire videri ait, quo quidem loquendi genere, & similibus, vt ferunt, aiunt, creditur, vtuntur Herodotus Theophr. & Dioscorides, cū rem aliquam pro incerta habere significant. Ad primum respondeo, Aristotelem facillè vidisse Rhinobatum, cū ipsius notas tradat, dicens, ἔστι γάρ τις

Lib. 6.
c. 11. de
hist. ani.

Lib. 9.
cap. 51.

Lib. 2. de
gen. ani.
c. 5.

ἰχθὺς ὃς καλεῖται Ρινόβατος, ἔχει γὰρ τὴν μὲν κεφαλὴν, &c. itémque Plin-
 nium, *ex quibus nascitur priori parte Raia similis, &c.* In quibus ver-
 bis nihil est quod verti in dubium possit. Ad secundum dico,
 non modò Aristotelem, sed alios Auctores Græcos, quorū exē-
 pla latè patent, semper in rebus certis, verbo, δοκῶ, uti, atque
 Dioscoridem, ut in pluribus capitibus, sic præsertim in cap. de
 Dorycnio, in antecedenti periodo per uerbum, δοκεῖ, res certas
 significare, quòdque ipse verum existimat, & subinde sequenti,
 in certas per, φασί, quibus ambobus uti non erat opus, si eadem
 significare voluisset, præsertim in tam breuibus periodis, essetq.
 idem modus loquendi; quod cōfirmo ex interpretatione Ruel-
 lij viri doctissimi, qui cū tantam in Græcis habere vim hoc
 uerbum, δοκεῖ, videret, constat, ibi illud est interpretatus: quare
 differt Græca ratio uerbi, δοκεῖ, à Latina, *ferunt, aiunt, & simi-*
lium, cū hæc incertas, illud verò certas præferat. Accedat
 huc etiam alter textus Aristotelis secūdo loco citatus, ubi post
 uerbum, δοκοῦσι, ponit aduerbium, μάλιστα, quod vertitur, *maxi-*
mè, super omnia: & maiorem in modum, quibus, cū aliquid certū
 est dicendum, utuntur omnes, ipsèque Aristoteles tali scriben-
 di modo non vsus quidem fuisset, si de hoc pisce aliter sensisset,
 rēmque pro incerta habuisset; & cū ipse non viderit piscium
 coniunctionem, quam idem peragi absolūque ocysimè tradit,
 & rarò verum ouiparorum coitum cerni; difficilèque esset di-
 uerforum piscium coniunctionem, quæ rarò, ut ipsemet testa-
 tur, accidit, conspiciere, ideo dixit, οὐδὲν ἀξιόλογον εἶναι, & quia
 credebat natura posse fieri, δοκοῦσι δὲ μάλιστα, &c. quod ipse, *cre-*
duntur, est interpretatus: sed quidem, *credere*, significat, rem
 non visam pro certa habere, quod accidit, cū fidem nostram
 alicui adhibemus veritatem dicenti, nobis ita certum esse ali-
 qua ratione putantibus. Sed ad Rhinobatum redeo, diffici-
 lèque erit ad conclusionem hanc Rondeletij doctiorum ani-
 mos inducere: Si ideo coeunt Squatina & Raia, quia piscis sit qui Rhi-
 nobatus nominetur, utriusque similis, quam rationem infirmam iudi-
 cans, atque illam ad imposibile trahens, παραλογίζομαι cōclu-
 dit, & Hippocentauros & Tragelaphos esse posse dicemus, si Centaurus cū
 Equā; & Hircus cū Cervā commisceantur. Quod argumentum
 quā sit absurdum iudicent doctiores: aliud enim esset, si Hip-
 pocentaurus inueniretur, ex Centauro & Equā natum esse, di-
 cere,

Lib. 1. de
 gen. ani.
 c. 6.

Lib. 5. de
 hist. ani.
 c. 5.

Lib. 2. de
 gen. ani.
 c. 5.

cere, aliud contra, nam tunc argumentum procedit, estque probabile, cum ab aliqua re existenti est ductum. Quam suam conclusionem Galeni testimonio confirmat dicens, *fieri secundum naturam non potest, ut tantopere dissidentia corpora commisceantur*, &c. *Lib. 3. de usu part. c. 1.*

& Neque si diuersæ animantium formæ, non tamen usque adeo dissimiles coeant, id animal gignit, quod una parte huic, altera illi simile sit, sed quod uni tantum procreantium simile sit, vel tertium quoddam: ut cum *Asinus Equam inijt, Mulus aut Mula neutri per omnia simile animal gignitur. Si Lupus cum Cane, vel Vulpe congregiatur, Canis, vel Vulpes alteri tantum similis.* Ad quæ respondeo, Aristotelem, non ut ipse, tam dissidentia corpora, & commentitia coniungi posse, dixisse, Centaurum scilicet cum Equa, sed Raiam cum Squatina, quæ inter se aliquam *συμπάθειαν*, similitudinemque habere videntur, cum sint ex eodem genere Cartilagineorum, atque præter os, & angustior corporis habitum, quibus à Raia distat Squatina, alis, & post illas appendicibus duabus, & pinnulis duabus in cauda, vtraque sit donata: nec longitudine ita differunt inter se, quò minus Raia cum Squatina fœmina possit coniungi, supinarum partium attritu, cum vtraque, ac reliquū genus Cartilagineum ouiparum, ita coeant, ut idem Aristoteles ait, *να- tant enim eodem modo, ut idem tradit. οἱ δὲ Βάται, καὶ τὰ τοιαῦτα ἀντὶ περιγύων τὰς ἐχάτερὰ πλάται νέουσι.* *Lib. 5. cap. 5 de hist. ani. Lib. 4. de part. ani. c. 13.*

Raiæ & similes propinnis extrema sui corporis latitudine natant. Accedant quæ de Galeno citat, scilicet Mulus, aut Mula neutri genitori per omnia simile animal gignitur. Non igitur excludit, ut in aliqua parte corporis, morum & naturæ, possit esse vtrique simile, ut de Mulo aliisque animalibus ex differentibus specie natis dici potest, quod cuilibet in perquirendis contemplandisque rebus naturalibus exercitato per spicuum est: immo addo id, quod mirum, quòdque incredibile putarem si ab alijs audissem, sed quia, tantæ auctoritatis, fidei, & doctrinæ Caterina Pellegrina auia mihi que carissima narrauit, certum esse mihi persuadeo: ait enim suo uiuente patre Hieronymo Abellarum, aliorumque oppidorum, ciuitatūmq. Regulo, eo in oppido anno salutis c15, 15. xxviii. repertum esse, eisque allatum monstrosū animal ex Scrofa natum, cuius caput per omnia humano capiti erat simile, reliquum verò corpus genitrici: cūmq. an subulcus cum illa commixtus esset, in dubium verteretur, eum iussisse notionem ea de re apud

iudicem haberi. Itaque ad iudicem delatus subulcus, remque cum illa *ἡντιονδ' αὖς* habuisse confessus est, delictique reus est factus. Quod diuino iudicio factum puto, ne, qui tantum, execrabileque facinus patrauit, impunè abiret: testes ibi etiamnum superstites sunt. Accedat denique locus Plinij ante citatus, in quo nec verbum quidem vllum est dubium, quod extorqueri possit, & in ambiguum reduci, ait enim *Piscium diuersa genera non coeunt præter Squatinam & Raiam*, & quæ sequuntur. Qui uidetur, aut verba Aristotelis secundum illius mentem interpretatus, vel coniunctionem piscium conspexisse, & pro certa tradidisse. Vt cunque igitur res se habeat, iam satis perspicuū est, Aristotelem, Pliniūque Rhinobatum piscem his notis delineasse, caput scilicet habentem, & anteriora Raię, posteriora verò Squatinæ: quæ omnia pisces à me proposito inesse videntur, vt ex sequenti descriptione patebit, & ut ordine prosequar, ab illius nomine incipiam. Piscis hic, quem Rhinobatum antiquorum esse ducō, à nostris piscatoribus vulgò dicitur *Cetola*, quod Citharam significat, est enim instrumentum hoc musicum aereis fidibus tensum, quod pennæ frusto pulsatur, ipsis, & plebis fæci notum, & vsitatum, quare facile illis fuit, ob illius similitudinē, nomen huic pisci imponere: ijdēmq. promanubrio, caudam fingunt, pro testudine, reliquum corpus, & pro regula in pontis modum constructa, qua chordæ ab instrumento eleuantur, rimam oris: hæc descripsi ne ij, quibus instrumentum hoc est incognitum, fraudari viderentur. Est igitur cartilagineus, nostro mari frequens, magnitudine, vt à piscatoribus accepi, quatuor pedes non superans, pondere verò duodecim libras ad summum æquans, colore subflauo, in supina parte albo, cute est aspera velut arenulis minutis conspersa Squatinæ cuti simili, quam, si manum deorsum duces, læuem iudicabis, sed si à cauda ad caput, asperitatem senties; figura, primo intuitu Raiam refert, multum *ἔξυρύνχου βάτῳ* simili, sed angustiore, nam rostrum in longum protenditur, & alas habet angustiores cæteris Raijs: corpus cordis figuram ferè simulat, estque tertia pars totius longitudinis: caret illis duabus appendicibus carnosiss, inter alas, & appendices cartilagineas, sitis, quibus Raiæ sunt præditæ, genitalia verò habet mas inter caudam & appendices cartilagineas, vt etiam Raiæ,

tœmi-

foemina quidem caret illis, sed tantum habet duas cartilagineas appendices in modum pinnarum, ut Squatina, quæ ab osseo neruo supra anum posito originem ducunt, & inde cauda procedit longa duabus reliquis partibus, lata, & carnosa, caudam repræsentans Squatinæ, inferiore parte plana, cuius latera tenui limbo cartilagineo definiuntur, in qua sunt duæ pinnae caudam in tres partes, ut in Squatina diuidentes, quæ in unicâ pinnam definit: oculos habet membranula illa pupillam operiente ut in Raijs, sed ut Squatinis, & post illos foramina duo, post quæ procedit dorsum asperius usque ad caudæ extremitatem tendens, in quo similiter sunt aculei simplici ordine digesti, ut in cauda Squatinæ, ac etiam alij sunt in osseo diaphragmate post branchias, caput à uentre separante; iuxta quod binæ lineæ utrinque ad latera dorsii positæ oriuntur, quarum duæ lateribus caudæ propinquiore in ipsarum ortu sunt curuæ caudæ à reliquo corpore secernentes, omnes verò cum cauda terminantur. In supina parte duo sunt foramina oblonga, ab illis Raiarum dissidentia, pronaribus sita, iisque subest os, squamis osseis pro dentibus munitum, branchiæ subsunt utrinque quinæ, quarum duæ inferiores insunt osseo diaphragmati, lineâ quadam curua & sinuata signato, ventrem à capite separante: in ventre continentur intestina omnia Raiarum intestinalis similia, oua distant à Raiarum ouis, sed similia sunt illis Squatinæ illaq. gerit utero ab hyemali solstitio. Quo tempore pariat, quibus moribus & natura mas & foemina sint præditi, adhuc obferuare nequiuimus: cum Raijs uendi solet ferè semper. Quare cum capite & parte anteriore sit Raiæ similis, cauda verò & cute Squatinæ, rectè mihi uidetur posse dici Rhinobatus Aristotelis & Plinij: an autem ex Raiæ & Squatinæ coniunctione ortus sit, adhuc incompertum habeo, satis mihi uidetur nunc posse Rhinobatus appellari, à similitudine *Pisces*, & *Batou*.



Pastinaca marina Dioscoridis.

LURES Pastinacæ marinæ species iam à similitudine ipsarum apud recentiores memorantur, atque depinguntur, quas uidere licebit apud Gesnerum naturalium rerum studiosissimum, atque illarum collectorem, prolixius esset illas iterum transcribere, hanc ab alijs minimè animaduersam describam, [cuius caudam radio munitā tantum, sine reliquo corpore depictam inter alias idē Gesnerus exhibuit]: eò quòd Dioscoridis delineationi respōdere uideatur: cuius nec sensus, sicuti nec uerba percepisse alios cognoui: eius uerba sunt hæc, Τρυγόνος θαλασσίας τὸ κέντρον, ὃ δὴ ἀπὸ τῆς οὐράς αὐτῆς πέφυκεν ἀνεστραμμένον ταῖς φολίσιν, ὃ δὲ ὄντα πονοῦντα πρᾶναι: πρὺπται γὰρ καὶ ἀποβάλλει. Quæ sic latinè reddidi. Pastinacæ marinæ aculeus, qui ab radice ipsius enascitur reflexus squamis: dentem dolentem mitigat: frangit quidem illum, æquè eijcit. Huius descriptionis quàm breuissimæ uerba, neminem perpendisse atque cum pisce contulisse præter Rondeletium uirum doctissimum animaduerti; quæ etiā multum interpretans, cum φολίσιν, uerbi proprietatem minimè pisci depicto conuenire perspiceret: in hanc descendit sententiam se prius excusans, ut vel Dioscoridis locus sit inemendatus, vel improprio uocabulo usus sit. Quod uerbum, in Piscis huius caudæ delineatione interpretari, & in ea ostendere conabor. Piscis hic à nostris piscatoribus Muchio appellatur vulgò, est cartilagineus, planus, læuis, colore cinereo ad flauum tendente, sed paruus est magis flauus, inferius uerò albescente, cuius corpus ueluti quadratum efformare uidetur, binos enim angulos alarum extremitates, binosque alios rostrum, & caudæ principium complent. in superiore parte caput uisitur Raia modo infra rostrum paruis squamis asperum, oculos & post illos foramina ut in alijs: è regione utrinque nō multum distantes lepidēs sunt binæ, atque duæ aliæ in capite inter oculos & diaphragma branchiarum, in inferiore uerò foramina duo supra os, quod osseis squamis munitum est, post ipsum utrinque quinq; branchiæ, quæ à reliquo uentris, osseo diaphragmate

Τρύγαν δαλματία

Pastinaca maritima



- phragmate diuiduntur; ad caudæ initiū & ani latera duæ sunt
 pinnae uice cartilagines, atque in maribus appendices illæ car-
 nosæ genitalium. Caudam uerò longam habet sesquicorporis
 longitudinem æquantem propè initium crassam, & quadratam,
 in extremo rotundam, & multò tenuiorem inferius limbum ha-
 bentem, quo dirigit cursum: supra uerò aculeum osseum durum
 utrinque ferratum dentibus caudæ radicem respicientibus,
 dodrantem longum uidi, latum in imo sesquiunciam, in extre-
 mo acutiorem, ab initio caudæ absentem tertia totius caudæ
 parte: quam etsi alij recentiores squamis carentem depinxe-
 rint (parui piscis iconem) maiores quidem atque grandio-
 res minimè uiderunt, sicuti & Plinius qui radiū quincunciam-
 lem, ueluti maximum describit. Sed & quæ non excedit decem
 libras, parem habet, quid de ea quæ ducentas excedit, dicen-
 dum, quæ pugionem ferreum æquantem, ut dixi aculeum ha-
 bet? Hæc autem caudam habet squamis osseis asperam utrin-
 que, patellis nostratibus similibus, sed aculeatis in summo, quas
 proprio uocabulo Græci *λεπίδες* uocant in aquatilibus, ideòq.
λεπίδες dictæ sunt, quia ad modum *λεπίδων* à cute excrescentium
 extuberant: unde morbi genus quem porriginem Latini appel-
 lant sic dictum est, nam uelut plures patellæ saxo hærentes, ita
 porri cuti extuberantes conspiciuntur, sicuti etiam exanthe-
 mata, in quorum modum erumpentem scabiem Ficū arborē ha-
 bere testatur Theophrastus. quam in Ficu quadam paucis ab-
 hinc diebus eruptā animaduerti. *Φολίδες* uerò propriè squamæ
 sunt reptantium animalium, sed cōfunduntur, nam *φολίδες* aiunt
 esse serpentium *λεπίδες*, & Hippocrates *φολίδα τοῦ χαλκοῦ*, squa-
 mam æris, dixit: quam Dioscorides *λεπίδα τοῦ χαλκοῦ* appella-
 uit, quibus communiter squamas omnes cuiusvis generis *λεπίς*,
 & *φολίς* uerba significare perspicitur. Dioscorides uerò etsi *φολί-
 σιν* uerbum scripsit, quo serpentium squamas denotatur, hoc ta-
 men loco data opera, potest dici, uti eo uerbo uoluisse; cauda
 quidem huius piscis ueluti serpens squamosus uidetur; & sic
 squamas illas siue *φολίδες* dictas respici à dentibus reflexis acu-
 lei, ut Dioscorides ait (non retrouersis squamis, ut perpe-
 ram Hippolytus Saluianus interpretatus est, pro dentibus re-
 flexis) cognitum est. Atque hanc esse ueram interpreta-
 tionem non est dubitandum. Non igitur Rondeletius am-
 plius

plius in explicando verbū *φολισιν* cōmorari debet, sed forū pesca-
 torium adeat, uel Piscatores, à quibus, si piscem uidere nolue-
 rit, audire poterit huius piscis descriptionem & naturam. De *Lib. 9.*
 quo Plinius loquens ait, *Sed nullum vsquam execrabilius quàm radi-* *c. 48.*
us super caudam eminens Trygonis, quam nostri Pastinacam appellant,
quincunciali magnitudine: arbores infixus necat: arma ut telum perforat
ut ferri, & veneni malo. Et alibi, nihil est vnquam venenatius, quàm *Lib. 32.*
in mari Pastinaca, utpotè cum radio eius arbores necari dixerimus. Aelia- *c. 2.*
nus verò, Pastinaca aculeum (cuius ante mentionem feci) mortiferum *Lib. 13.*
habet, ut vel celeriter non modò homines, sed etiam animalia alia perdere *cap. 6.*
queat, quod quidem ipsum, ut non admirabilitatem facit, certè id stupendā
admirationem habet: quod si ad maximam arborem, & vegetam, & summè
virentem aculeum admoucas, & defigas, non multo post amittit folia, quæ
postquam defluerunt, totus truncus similis est arboribus, solis ardoribus
exiccatis æstate, cum maxima est siccitas. His similia alibi etiam, si- *Lib. 13.*
cuti Nicander in Theriaca sua, & Oppianus. Piscatores nō nisi *c. 5.*
cauda exempta pastinacam hanc & congeneres in forum uen- *& lib. 13*
dendi causa afferunt, vetitum est enim, nec nisi amicis, & qui *c. 1. lib. 2*
uenenum effugere sciant, multis etiam obsequijs præstitis cum
cauda domi secretò afferunt. Huius ueneni signa tradidit Dio- *Lib. 7.*
scorides. Remedio sunt multa, quæ collegit Saluianus, sed præ-
sertim ipsa Pastinaca diuulsa & vulnere imposita sui ictus medela est: in- *Lib. 8.*
ter alia quæ idem Diosc. scribit: & Plin. Pastinaca contra suum ictū *c. 6.*
remedio est, cinere suo ex aceto illito, vel alterius. Et alia multa; sed ea- *Lib. 32.*
dem Pastinaca non modò contra suum uenenum antipharma- *c. 5.*
cum est, sed & alijs affectibus succurrit, ut scilicet, dentium do-
lorem mitiget, atque illos frangendo euocet. Modus autem utè
di, à Plinio describitur hoc modo Pastinacæ quoque radio scarifica- *Lib. 32.*
re gingiuas, in dolore vtilissimum. Conteritur is, & cum Elleboro albo illi- *c. 7.*
tus, dentes sine vexatione extrahit. Celsus uerò, ait, aculeus torretur *Lib. 6.*
deinde conteritur, resinæque excipitur, qua dente circumdato, hunc soluit. *c. 9.*
Addit Plinius etiam Strumas curare, his uerbis. Eadem vit & *Lib. 32.*
Pastinacæ radio, & Lepore marino imposito. ita ut celeriter remouean- tur, *c. 8.*
& alibi. Partus adiunare, & faciles facere Pastinacæ radius adalligatus *Lib. eod.*
umbilico existimatur, si uiuenti ablatus sit, ipsæque in mare demissa. & *c. 10.*
alibi: Pruritus scabiemque non hominum modo, sed & quadrupedū effi- *Lib. 32.*
cacissimè sedat iecur pastinacæ decoctum in oleo. *c. 10.*

Stella hexadactyloides



Stella Marina altera

δεκαδασυακτινοειδής.



NOVA & perelegans est huius Stellæ forma, ab alijs omnibus differens, nec adhuc descripta: nostro litori frequens, ita ut nec ulla retrahantur retia, quin ipsis implicata, & simul cū piscibus in foro etiam non inueniatur. Hæc admodum fragilis est, ut uiua ne ab rete excipiat potius frangi patitur, ita illi se implexâ cirris continet. Non uis ulla in extrahenda Stella est adhibenda, cūm radij sint geniculati, atque genicula cōiungens cartilago sit admodum tenuis, qua de re facillimè genicula dissoluantur; nec quamuis radij omnes sint disrupti emoritur, nisi lōgo post interuallo. Huius color subrubens est, forma uerò ab alijs stellis dissideere uidetur. Hæc enim paruum admodum corpus habet: radios quinque; sed singuli in binos diuiduntur, ita ut decem prima facie uideantur: semipedem longos nec maiores hucusque vidi: Stellæ diameter pedem æquat. Radij uerò omnes geniculis paruis constant, atque singula genicula formâ trianguli habent, lineæ quidem secantes nunc in dextram, nūc in sinistram partem coniunguntur, spirarum modo, quæ alternatim angulos oppositos conficiunt. E' singulorum uerò triangulorum basi, cirri etiam, ut bases quoque, utrinque alternatim producantur, simili modo geniculati, minimi digiti longitudine ac cannabini fili crassitie, quibus maximè implicatur, graditur, atque apprehendit: Horum superiores parum longitudine sicuti & crassitie alios inferiores ad extremum usque superât. E' centro uerò ipsius alij tennes cirri fili etiam crassitie, & eodem modo geniculati, maioris digiti longitudine exeunt, quorum superiores inferioribus minores sunt, atque contrario modo, quo radij maiores, curuantur, quibus escam apprehendere, atque in os adducere censeo, in quorum umbilico uisitur inesse, ex aduersa parte corpus conspicitur rotundum, læue, molle, cuius interiora propter tenuitatē considerare nequiu: ipsum uerò facillimè disiungitur à Stella: læuis est tota, sed aspera tactu

Aut uidetur propter geniculorum & cirrorum multitudinem : crusta integitur duriuscula, ita ut offe is geniculis, sed non admodum duris composita uideatur. An splendeat, ut aliæ noctu, cum uiuam domi habere non potuissem, experiri non potui.

Conchas vulgò Anatiferas, non esse fructus terrestres, neque ex ijs Anates oriri : sed Balani marinæ speciem.



DVM Conchas hæc, ex quibus Anates oriri falsò asseritur, minimè uidissem ; atque apud Lobellium, Penam, quique eos sequuti sunt, conspicerem in maris rupibus arborem esse, quæ fructus hos Amygdalæ pares forma, atque magnitudine ederet : mentem sæpenumero cogitatio huius rei perturbabat meam : neque credere poteram, etsi aliquando animum ad credendum inclinabam, ratione hac commotus : quia scripta hæc erant à doctissimis duobus medicis, atque demum ab alijs recepta : at quidem iterum reijciebatur à sensu hæc imaginatio fortiore argumento, quia arbor fructus edens depicta exhibebatur, atque ab iisdem medicis, iisdem fructus Concharum nomine donati erant, quas è naui anno sæ carina auulsas habere testantur : quæ quidem inter se contraria, atque impossibilia censentur. Arboris fructus terrestris, minimè concha maris esse potest, atque si foret, nauium carinis hæreere haud posset. Qua sententiâ impulsus, conchas has uidere animo flagrare cœpi. Nec multis quidem exinde præteritis diebus, nostrum in litus (hyems tunc erat) ingens maris æstus vi sonitûque ruere cœpit, qui decem ferè diebus continuus fuit : in quibus, quia etiam pluuia uias abnegabat, magis etiam studiis animus adducebatur, piscium Historias à doctissimo uiro Rondeletio editas, cum aliorum descriptione conferebam ; inciditque eo tempore, testaceorum genere peruoluentem, Balanos ab eodem descriptas, atque depictas considerare, quarum forma, & cum his conchis similitudine memoria concharum harum excitata est. Atque sciens quia legissem, ab alluuione maris proijci conchas faciliè euenire

re posse, famulo iussi, ut nostri litoris partem lustraret, & quæ inueniret à maris æstu proiecta, adduceret. Fortuna accidit inter alia multa, Algæ scilicet hærentem Escharam, Alcyonij speciem, Stellam cuius iconem exhibui, Pennam, Conchâsque varias, & hæc Harundinum furculis, atq. radicibus, petris, pumicibusque hærentes attulisse, non sine animi mei gaudio: quarû forma hæc est, Cõcha læuis est, Amygdalæ fructui forma, & magnitudine ferè par, magis verò compressa in acutiore parte: colore ex albo ad cinereum uergente: quinque partibus constructa, nam quæ ualuulæ uice sunt, singulæ circa extremam, atque angustior partem, per obliquum veluti diuisæ conspiciuntur, partes verò illæ coniunguntur cartilagine, atque in posteriore conchæ parte in acutum definunt: quatuor hæ partes à quinta angustiore, quæ dorsum conchæ est, coniunguntur etiam cartilagine, ne ab ea parte aperiri queant; dorsi quidem hæc pars à fundo latior procedit, atque circa extremum conchæ in tenuiorem terminatur: curua est, atque rugosa additamentis, quibus ferratum circa imum conspicitur quinque aut sex dentibus dorsum. Pars, qua hæret latior atque magis extuberâs est, quam obrem ualuularum fundum apertum conspiceretur, nisi fundi loco pars quædam carnosâ fusca ueluti corium, tota rugosa in imo ubi hæret tenuior, & ad fundi latitudinem se dilatans in concha fundum efficeret: quæ planè rugosum Amygdalæ fructus petiolum illum continentē refert: qua de causa, quia in furculis arborum etiam eleganter compositæ, & hærentes uiuntur, arboris fructus esse opinati sunt. Concha quidem est marina, ex maris spumoso cæno orta, ut aliæ testaceæ omnes, saxis, lignis quibuscunque, pumicibus humorem illum magis retinentibus, adhærens. Animal intus continet ex concha minimè exiens, coniunctum quidem est in fundo, indeque forsan humore, cum ab ipsis aqua recederet, pro alimento fugere uideatur: carnosum corpus in imo est, os an habeat & quomodo, quocirare non puto, haud potui rectè conspiceret: uerum pedes siue Lib. 1. de
cirros ex fusco flauescens insectos, quâ plures habet. Britan- testaceis.
nici, ut Rôdeletius asserit, appellât Poussépierz, & alij. Pollicipedes c. 29.
quorum superiores alijs longiores, curui conspiciuntur, geniculati interna parte hirsuti, per longum diuisam pennam amulantes, & caudam curuam Galli, quam obrem opinati sunt illi
pennas

pennas esse, atque caudam, & auiculæ crescentis rudimenta⁹ extra concham emissa. Sed mihi potius cirros, & brachia animalis esse uidentur, quæ conchæ natura tribuit, ut escam uenari, & intrò reponere posset: frustra quidem, nisi ad uitam conservandam apta forent, illi adnata essent. At nescio quomodo credere potuerunt marinas conchas fructus esse terrestris arboris, quod nec ab incolentibus montiū cacumina, qui nec mare unquam uidissent, nedum conchas marinas, credendū esset: & quidem si ostenderentur illis, nomine arboris fructus; in promptu, fieri secundum naturam haud posse, ut arbor terrestris tales fructus ea cortice obductos, qui carnem & animal formatum intus continerent, edat, responderent: semper enim idem intus animal continetur. Quibus assentire dico, nunquā certè (quam paruulas easdem conchulas uix Milij semen equantes habeo, omnesque formatum completūque, sed paruulum animal habent.) sine animali conspiciuntur, atque semper eodem. Quare non ex uerme primum, ut non pauca marina animalia gigni asserit Aristoteles, oriuntur: sed à principio humor ille lentus in animal cogitur, atque terrestrior humoris pars circum densatur, efformaturque in conchæ modum, & tēpore intercedente longo simul cum animali incrementum capit: atque adulto animali, excedente ex illo spumoso mucosōque humore uī quadam seminali prædito, aut etiam eodem primo cœnoso humore intercedente, circa ipsum aliæ parvæ cōchulæ Musculorum modo gignuntur. Ex his igitur testaceum animal esse certum erit, nec arboris fructus, ut ab alijs depingitur: hæ quidem conchæ in sicco deiectæ breui emoriuntur, propter humidi diminutionem, in mari uerò (spontè oriuntur) putrescere minimè possunt, atque si ex putredine harū aliquid oriretur, marinum esse etiam oporteret dato & non concessō. Quamobrem remota principali, per consequens reiicitur eorū conclusio sequens, ex putredine illarum scilicet in mari proiectarum aues exoriri, uolatilium generationem, ex piscium putredine, mari tribuentium: quod quantum à ueritate absit, & an fieri possit iisdem iudicandum relinquo. At concludendum quidem est, falsam esse eorum assertionem, qui ex his conchis Anates oriri aiunt: putarunt forsan in Scotia tantum & Britannia locis nobis longinquis oriri, quare, fabulas nobis obtrudere



obtrudere faciliè credendas, opinati sunt: sed & nobis & uicinis locis Prochyta insula præsertim, frequentes sunt, atque magnitudine insigni adollescentes nõ solum ramis, petris, carinis adhærentes, sed & solutæ quæ natant, quarum Icon & historia à Ferdinando Imperato simul cum alijs admirabilibus, nouisq. rebus edetur. Has doctissimus Rondeletius ueritatis studiofus in Normannia, & Britannia sua oriri asserit, nec aues generari ex his tradit, sed pro Balani specie exhibet, atque describit homines, & mulieres alia fastidientes cibaria, hoc edulij genere delectari, atque elixatas in aqua, disrupsitq. internam carnem ex aceto edere. Cui assentio & concham hanc Balanũ esse, etsi alterum genus Balani figura magis ad Glandes accedente describat: nam quamuis illud superiorem, & dimidium tantum Glandis partem repræsentet, hoc tamen etsi non Quercus glandem, sed Amygdalæ fructum referat, Balanum tamen etiam esse censeo. *Balanos* enim non solum Quercus fructus, sed Castanearum, Fagorum, reliquarumque arborum genericum nomen est, ut alij animaduertere, sicut & Glans apud Latinos, non solum Glandem, sed quemlibet fructum significat, unde

Lib. 71

Vlpianus ad Edictum scribens ait, *Glandis nomine omnes fructus continentur*. Quapropter si quis conferre uoluerit similitudinem secundæ Balani cum Glandibus Quercus, uidebit nec totam Glandem nec Glandium positum ita referre, sicut si primi generis cum Amygdalæ fructibus comparentur furculo hærentes conchæ. Quæ utræque Balani nomine sunt appellandæ, idem enim animal intus continent, iisdemque locis inueniuntur hærentes, nec nisi conchæ forma inter se dissident. Conchæ autem differentia oritur ex materia scilicet limo: prima enim, quæ lignis in mare proiectis petris, & pumicibus hæret, in arenosis degit, ubi aqua purior, ideóque & limus purior, atque tenuior, subtiliore terra permixtus existit, quare concha generatur solida, læuis & subtilis. Secunda uerò in scopulis limosis ubi cœnum est terrestrius, atque minus purum, hæret; ideo crassiore testa integitur, atque rudiore, ut ostrea, spondylus, & similes: quem ortum tradit Aristoteles his uerbis, *Ostreis quæ cœnum,*

Lib. 5. de
gene. ani.
e. 15.

ibi origo consistit. Conchæ, Chamæ, Vngues, Pectines, locis arenosis ortus initia capiunt. & paulò inferius, Testacea denique omnia sponte naturæ in limo diuersa, pro differentia limi oriuntur: nam in cœnoso Ostrea, in arenoso

arenoso Conchæ, & reliqua, quæ modò enumeravi. Secundum addidi Balani genus, ut & qui non uiderint in Rôdeletio, cognitum ex hac pictura habeant.

Ocymoides Lychnitis reptante radice.



EDIA est planta hæc inter Ocymoidem, & Lychnidē coronariam: Ocymoidi verò, quia Locus. folijs sit paruis ab radice statim binis singulis geniculis hærentibus; at Lychnidi, quia incana, pilosa, atque carnosa folia habeat, non minus quàm Lychnidis folia ad ellychnia formanda apta, similis uidetur. Spontè ac fre

quens oritur in monte D.M. Virginis appellato locis humentibus petrosis. Radice tenui admodum firmatur parum sub terra descendente atque circum reptante, ex qua plures fruticant viticuli rotundi incani hirsuti, bina foliola singulis geniculis hærentia habentes, quæ in imo minora sunt, deinde maiora in medio viticulo, quod contra euenit in plantis, ab radice statim foliatis, ante caulis eruptionem, ut in Theophrasto legitur; hirsuta, carnosa, incana Lychnidi similia, sed magnitudine & forma Ocymoidi, Polemonix Belgis dictæ. Cuius etiam, sicuti & aliarum congenerum ritu flores edit Aprili atque Maio mense Forma. candidos, quinque foliolis constructos, stamina intus quinque

lutea habentes, atque singula folia in summo quo latiora sunt, diuiduntur uti folliculi Thlaspi: Iunio semina in oblongis pericarpis mollibus, cartilagineisque perficit, fulua, angulosa, hirsutâq. Pericarpij uerò non uelica uti in superiore Ocymoidē, obducti sunt, sed tantum basim quinque foliolis constructâ, ut in planta, Gallinæ morsus appellata. Huius radix uiuax admodum est, ideoque multum fruticat, atque perennat, terrâmq. ipsius coma operit. Sapor plantæ dulcis est, quare non ineptè Tempus. Herbariorum, Fœcellarumque uulgus ad eliciendum lac copiosum utitur, atque plantam sicuti cætera olera iusculis admixtis intus ouis disruptis decoquunt, non sine piperis, atque amaraci modico, uel ut alij solent in placentam efformant, cuius esu magnam lactis copiam prouenire experimento se habere asserunt, atque hodie utuntur. Ex his igitur, calidam atque

Ocymoides lychnitis



Nomen, humidam, nec adeò terrenæ substantiæ participem esse censeripotest. Hanc Herbarij hîc, *Herba lattaria* vulgò appellant, à lactis eliciendi facultate ipsis nota.

Tragopogon laciniatis folijs.

Nomen.

Lib. 4. c.

de Senecione.

Lib. 25.

c. vlt.

Lib. 7.

c. 7.

Lib. 2. c.

de Trago

pogo.

Lib. 7.

cap. 7.

Forma.



λοῦ κάλυξ μέγας . καὶ ἐξ ἄκρου κατὰ πρὸς μέλας . ἀφ' οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔχειν . Sed in caule calyx magnus, & in summo fructus niger ex quo nomen habet. Non enim à fructu nigro, quem non habet, sed à proluxo, ac extra calicem excedente pappo, siue barba angusta, Hirco simili Tragopogon appellata fuit, ut exactè descripsit Theophrastus, οἱ δὲ μυρία ἄλλα καλοῦσιν, ὃ τὴν ῥίζαν ἔχει μακράν καὶ γλυκείαν, τὰ δὲ φύλλα τὰ κέρκω ὅμοια, πλὴν μακρότερα: τὸν καυλὸν δὲ βραχύν, ἐφ' οὗ τὴν κάλυκα μεγάλην, καὶ ἐξ ἄκρου μέγαν τὸν πρὸς τὸν πόλιν ἄλις πῶγονα: ἀφ' οὗ καλεῖται Tragopogon. Quidam autem inter millia alia nominant, hanc, quæ quidem radicem habet longam, & dulcem, folia Croci similia, multum longiora: caulem autem brevè, super quem calicem magnum, & ex vertice magnam barbam canam, unde dicitur Tragopogon. Hæc Tragopogi varietas est. Radicem habet longam teretem foris nigram, intus albam, lactescentem sicuti tota planta, dulcè esui aptam, ex qua folia plura, ut in alijs exeunt uiridia læuia supernè, sed auersa parte aspera, tribus, aut quatuor lacinijs diuisa, ut vulgaris Coronopi herba stella dicti, sed pedem longa, angusta ut Croci folia. Caulem emittit post annum, ex semine nata, asperum, cauum, pedalè, & bipedalè, alis diuisum: in quibus, & caulis summo calyces sunt, ut in alijs, sed striati, in quibus flores lutei mane aperiuntur, deinde post horam Sole superueniente clauduntur, nec amplius aperiuntur, sed semina ut in alijs cō generibus perficiuntur: quæ postea aperto calyce in sphæram concinnata, nassam referentia, quæ Græcis πᾶγι dicitur, in pappos

pos uento spirante euolant. Maio mense floret, Iunióque perficitur, semen à vulgari differt, magnitudine, nam minus est, nec asperum, sed striatum. in Apulia frequens, indéque aduectam habui.

Absinthium Montanum Abrotonifœmina flore.



LN excelso monte D. M. Virginis appellato
noua & elegans, rarâque Absinthij huius spe- *Locus.*
cies exoritur, atque non nisi rimis saxorum *Nomen.*
sterilibus, ex quibus fruticat, exit. E' radice *Forma.*

lignosa, parua, nigra, fibrosa, folia incana, lanuginosa, tenuia emittit incisuris profundis diuisa, media inter marinum Absinthium, & Abrotonû marem, in orbem disposita: Vere caules edit plures supinos paucis in imo folijs hæretibus, Aestate flores singulos, *Tempus.*
singulis caulibus in summo habentes Abrotoni fœminæ modo, sed similes Chamælo potius, foliolis quidem albis lutei umbones circundantur. Sapore & gustu, atque odore Absinthium uulgare Ponticum refert planta hæc, iccirco potius Absinthij nomen indidi, quàm Abrotoni fœminæ cui similior uideretur, præsertim flore, qui longè ab Absinthij floribus abest: sed quia non *δενδροειδὴς* ut Abrotonon fœmina sit, ut Dioscorides ait; sed *Lib. 3. c.*
ἐπιγείοφυλλος, & χαμαίφυλλος, atque etiam sapore magis amaro, ad- *2. Abro-*
stringentique sit, Absinthio perquàm simili, ut idem iudican- *tono.*
da sit: etsi effigie, cû florida est hæc planta ab Absinthio differat. A sapore, & odore, & sic à facultate, malui Absinthium appellare, quàm à similitudine, quæ sæpe fallit, Abrotoni fœminæ uarietati adscribere: magis enim acerbitatis, quàm Abrotonon habet, & sic minus tenuium partium quàm illa est, & sic minori etiam extenuandi facultate prædita est, etsi non minus, sed potius magis exiccatoriam uim contineat.

Abinchium montanum

Trachelium Tragopogi folio montanum.

ON è florum forma, natali loco, anniq; tantum tempore quo floret, sed & à lactis copia, substantia foliorum, & sapore totius plantæ, Tracheliorum varietati, sic à recentioribus quia trachæ, locisq; vicinis medeatur, appellatarum, reddenda est hæc noua planta, in D.M. Virginis Monte sic vulgò dicto, exorîes.

Nomen.

Locus.

Forma.

Radicem quidem habet crassiusculam albidam lactescentem, & ex ea plures propagines habètes folia angusta longa duriuscula, croci aut, Tagopogi forma, & magnitudine: Veris sine caules pedales edentes subrubentes, atque hirsutos, quibus folia alternatim, raraq; hærent, in quorum summo sex aut septem simul flores purpurei nolæ forma, trachelij vulgaris modo, ex basibus singulis quinq; foliolis viridibus constructis, exeunt: fructus atq; semina Trachelio etiam similia! Aestate perficit. Radix perennis est, atque dulcis esui apta sicuti vulgare Trachelium, & Rapuntium.

Tempus.

Sinapi alterum agreste nostras.

IN valle supra ædem D. Mariæ vitæ, inter Rubos, Cynocramben, Leonis dentes, & Ranuncula, oritur quædam noua, & elegans planta, nec alibi oriri scio, nec herbarij hæc se vidisse aiunt. Radice firmatur parua, tenui, fibrosa parum sub terrâ descendente, albida, ex qua folia exeunt Chelidonij maioris incisura, distât

Locus.

Forma.


quòd nec succum luteum edunt, nec cæsia, sed viridia sunt, aspera hirsutie obsita, atque extremum folium non retusum, vt Chelidonium, sed acutum habent, atque minora sunt: Caulis angulosus est atque alis multis diuiditur: flores edit purpureos umbellatos ferè, quatuor foliolis cõstructos Chelidonio pares; siliquas postea alternatim, frequenterq; hærentes, rectas, quarum extremæ partes cælum versus tendunt, quibus spica confici videtur siliquarum duorum digitorum, summû longitudine ad Sioaquatico pares, quæ cû exiccari incipiunt, flauescunt, atque

d vento

Trachelium

montanum





Tempus.

vento flante, vel aliquo illas tangente, disrumpuntur ab imo; atq; intortis vtrinque valuulis semina iaculantur flaua Sij, vel Cardaminæ modo, parua, gustu acri: sicuti etiam folia: floret Martio, & Aprili mense perficitur: nisi diligens sit cultor, huius semina non colliget.

Alsines facie plantanoua.

Nomen,
et Etymō
Lib. 4

Lib. 2.

Lib. 4.

Descript.



LSINE, ita dicta est, quia vmbrosa loca, & lucos amet, vt idem Dioscorides ait: ab aliquibus Myosota dicitur, quia folia habeat Musculorum aures imitantia; in capite de Myosotide Dioscorides ait, Sunt qui *Alsinen* Myosotida vocitant, sed alia est *Alsine*: vt idem ait Ἀλίνη, οἱ δὲ μὲν ὅτι, καὶ τοῦ ἔχειν φύλλα ὅμοια μὲν ὧτις.

ἀλσινὴ δὲ, διὰ τὸ σκιερὰς καὶ ἀλσείδος φυγεῖν τόπους. πῶς δὲν ὅμοια ἔλξιν, ταπεινότερα δὲ καὶ μακροφυλλότερα καὶ οὐ δασέα. διατρίβει δὲ τε, σικίον ὅζει.

Alsine, aliqui *Myosota* appellant, eo quod folia habeat similia muris auriculis: *Alsinen* verò quia vmbrosa loca, & lucos amet. Herba est similis *Helxinæ* humilior verò, & minoribus folijs, & minimè hirsuta: & contrita Cucumeris odorem refert. Plinius habet: *Alsine*, quam quidam *Myosoton* appellant, nascitur in lucis, vnde & *Alsine* dicta est: incipit à media Hyeme: arescit Aestate media: cum prorepat musculorum aures imitatur folijs: [sed aliam docebimus, quæ iustius *Myosotis* vocetur.] Hæc eadem erat quæ *Helxine*, nisi minor minusque hirsuta esset: nascitur in hortis, & maximè in parietibus: cum teritur odorem Cucumeris reddit.

Lib. 2. 7.

C. 4.


Forma.

Quorum delineationibus nulla alia ab alijs depicta ita facie respondere videtur, potius *Myosotam*, quàm *Alsinen* referre videtur: quæ verò à me est depicta, læuitate & magnitudine tantum differre videtur: reliquum *Helxines* habitum refert. Radicem quidem habet tenuem, albam, fibrosam, ex qua plures dodrantes viti-culi rotundi, atque læues, parum rubescens, carnosus, succo referti, atque in terra frati exeunt, nisi à pariete dependeant: folia geniculis ex interuallo frequentia primum bina, postea alternatim vtrinque digesta habent *Helxines* forma, & positu, *Parietariæ* scilicet, (humilior namque hæc est *Parietaria*, quod non potest intelligi, si de *Cissampelo* putares, nam repens est *Dioscoride* teste:) minora verò, & rotundiora parum, satis mu-

ris

ris auriculis similia, carnosæ, minus hirsutæ, Oxalidis rotundi foliæ folia exprimentia, nam quadam veluti aspergine eodem modo obsita sunt, vt etiam in Atriplice visitur: ex quibus & geniculis bina alia foliola exeunt, vt etiam in Parietaria conspiciuntur, quæ etiam muscutorum auriculas imitatur, iuxta quæ flores bini, aut terni enascuntur, muscosi, ex herbaceo albidis, duobus foliolis contortis ex aduerso constantes, multis intus staminibus tenuibus: quibus decidentibus totidem fructus succedunt rotundi, duri, primùm virides, postea ex nigro cinerei. Octobri mense exit, Vere floret, atq; Aestate finitur. Herba tri- Tempus.
ta Cucumeris odorem planè refert, si quæ alia sit quæ talem odorem referat. Gustu insipido aqueo sunt folia, in semine verò aliquid inest tenuium partium, quo extergi lingua largè manso percipitur, non autem calorem imprimit. Ex quibus colligitur, extergere, adstringere, atque humectare posse, sicut Helxine, vt ait Dioscorides; quam Alsines viribus iisdem pollere ait: atque Galenus Helxinen extergendi, adstringendi, cum humiditate subfrigida vires habere asserit. Sed in cap. de Alsine; Alsinem Helxines vires habere, & aqueæ essentia esse dicit, atque Lib. 6. de
simp. me.
facult.
frigefacientem & humectantem tantum vim habere, absque adstringitione: quæ vires potius contrariæ, quàm similes esse videntur Helxine; nam extergendi vim habet & adstringendi maiorem; minorem verò humectando refrigerandi. Hoc tamen doctioribus, atq; periclitatoribus relinquo. Loca videtur amare eadem quæ Helxine, atque ex Insula Capreis, vbi frequens spontè oritur, aduectam habui. Locus.

Erini, siue Rapunculi minimum genus.



OVA hæc est plantula atque pulchella ex D. Mariæ Virginis monte aduecta quæ radicem habet paruam admodum fibris diuisam teneram, atque Rapunculo siue Erino à me depicto similem sapore, lactescentemque. folia: emittit parua admodum, digiti longitudine, parum hirsutæ, oblonga, latioraque in summo, & per extremum serrata raris diuisuris, nam quæ proximiora sunt radici octo dentes circum habere videntur, superiora verò minus, atque floribus hærentia binos, caulem emit-
tit ab

*Asiū**Alsine*



tit ab radice ex singulis foliolis alis diuifum, ita vt fruticofa videatur; anguloſum hirsutum, tenuem, floſculos edit Aprili menſe & Maio, inter folia, ex calyce parum hirsuto lato in quinque folia deſinente, vt in Rapuntio, & Campanula pyramidali dicta viſitur, exeuntes oblōgos cauos ſimiles Tracheliorum floripurpureos, intus apicē vel thyrfulum luteū in ſummo triplici diuiſura intortū vt in congeneribus cōtinētes. Semen perficit Iunio, & Iulio, minutum admodū, fufcum. Tota planta lacteo ſucco turget dulci, vti Rapuntium, ita vt gratus fit ſapor palato.

*Phyteuma minus, Scabioſa parua, floribus
Ocimi laciniatis atque odoris.*

Forma.



Tempus.

Locus.

VLCHERRIMA atque grata oculis, atque naribus eſt Scabioſa hæc, quæ lignoſam longamque radicem habet, ex qua folia exeunt diuerſa, nam in imo vel ſunt ſylueſtri Erucae, paria, vel Coronopo ſimilia, minora verò atq; hirsuta, in caule verò ſimilia laciniis Scabioſæ vulgari minori, ſicuti & flores, qui purpurei ex albo colore ſunt, nec vt in alijs, ex cæruleo purpurei, in capitulis rotundioribus, atque ſinguli flores Ocimi flores imitantur, nam galericulati ſunt, & per ora laciniati, admodum ſimiles exotico Ocimo, folijs purpureis maculis infectis, ſimbriatisq; atque etiam, quod in alijs Scabioſis non obſeruatur bene odorati ſunt: floret Aestate, atque etiam Hyeme propter cæli amœnitatem. In montibus oritur Amalfæ oræ.

F I N I S.

Θραγίσκῃ τε Οὐρρηρίῃ ἐκ κοινωνίας Ἰησοῦ ὁπίη εἶμα
εἰς Φάβιον τὸ Κολέμαν.

Γλῶσσι, καὶ πύλον, καὶ ἥρα, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς

Ἡν καὶ τὴν τέχνην ἡ φύσις εἰργάσατο.

Εἴτα ποθοῦσα λίαν μορφῶν καὶ εἰκόνα πλάττειν

Τὴν ἰδίην, τεχνικῶς ἐπλασε τὸ ΦΑΒΙΟΝ.

Οὗτος νῦν πλάττει, φύσις ἄλλη, πᾶν πεπνυγόν.

Πᾶν ὅ, τι πύλος ἐχθρὸς, πᾶν ὅ, τι γαῖα φέρει.

Prætermissa quæ Lector suis locis ita reponet, quæ
etiam in Indice notantur.

Pag. 1. post verba, ex lato prodeuntes definunt, **adde**: Capitula etiæ
pyramidalem habent formam, atque ignis flammam representât,
ita ut ab ipsorum etiam figura nominis etymon sumi possit.

Pag. 3. post, ac veluti in plures partes diuisa, **adde**: sylvestri Melan-
thio paria, & similia,

Pag. 45. post, ἀνζωοῦσαι, **adde**: Huius succus illitus, aut linteola il-
lo madida, ambustis impoſita, quàm citius ad cicatricem illa
perducit: nec finit, quod pluries expertus sum, ignis vim ulterius
diffundi.

Pag. 54. post, similes quodammodo; **adde**: Quare etiam Calycan-
themum, & Heliophyes appellatum inuenitur in diuersis illis no-
menclaturis; quia florem calycis modo habeat, & circumagatur,
ut Heliotropium, quare, ut Matthiolus refert, aliqui Heliotropiū
esse perperam putarunt:

Pag. 65. post, extremo Vere, **adde**: vel Autumno etiam,

Pag. 90. Pæoniæ fœminæ, & similium, **adde**: ut Apij, Tithymali
scilicet tuberosi; cuius radix tuberosa est, & Pyri formam ha-
bet, atque Dioscorides, & Theophrastus similem dixerunt esse ra-
dici Asphodeli, cuius multiplex est radix; nec Apion vnicam tan-
tùm radicem habere notarunt.

INDEX EORVM QV AE IN HOC VOLVGINE CONTINENTVR.

*In quo, sciat Lector, sepius in eadem pagina idem repetitum esse: quod mi-
nimè notatur: item communem numerum priorem partem,
Antiquum Romanum, alteram designare.*



A

BIES. pag. 94.

Abrotonon scæmina.

pag. xxiii.

Abrotonon mas. ibidè.

Abſinthium marinum.
ibidem.

Abſinthium montanũ

Abrotoni scæminæ facie, & eius histo-
rie. ibidem.

Abſinthium Ponticum. ibidem.

Acanthus. 51.

Acanthus Pæderos. 46. 48.

Acini vsus. 24.

Acinos Dioscoridis vnde nomen ducat.
23. quæ sit, & eius historia. ibidem. &
24. 26.

Acori radix. 117.

Adiantum. 82.

Aëtij locus emendatur. 31.

Agrioriganum. 13.

Alcea. 18.

Alisma Dioscoridis vnde dictum. 18.
eius historia. ibid. 19. 20.

Alisma alterum Plinij. 22.

Alœs. 108. Alsine. xxviii. xxviii.

Alsine facie noua planta. xxviii.

Alto deuolutis. 120.

Alui fluxiones sistentia. 12. 20. 23. 26.
62. 66. 87.

Aluum soluentia. 39. 109.

Alyssum Dioscoridis unde dicatur. 27.
quod, & eius hist. ibid. 29. 30. 31

Alysson alterum Antonij Coi, quod, &
eius hist. 31. 32. 34. 35.

Αλυσον. 31.

Amarum in plantis non semper calefa-
cere. 56. & 57.

Ambustis igni medentia. 45.

Anagallis aquatica. 27.

Androsæmum. 77.

Anemone. 74

Anethum. 88. 90.

Angelica. 87.

Anisum. 2. 77.

Anthaliij vsus. 7.

Anthaliium. 6. vnde dictum. ibid.

Antidotis quæ inserantur. 120.

Aparine. 29.

Aphronitrum. 93.

Aptas quæ curent. 120.

Α' πλόφυλλον. 29.

Apocynum Dioscoridis vnde dictum. 110.
quod sit, & eius hist. ibid. 112. 113.

Apocynum repens. 112.

Appetentiam excitantia. 85.

Aquam ducentia. 109.

Aquilegia. 3.

Arbores necantia. xi.

Aristolochia clematidis. 40.

Aristolochia rotunda. 36.

Anoglossum. 18.

Arum. 91.

Asari radix. 117.

Asclepias. 110. 112.

Asclepias nigra. 112.

Afinus. v.

Asparagus. 63. 69. 109. 110.

Asphodelus. 16. 87. 88. 90.

Asplenium. 77.

Astragalus Diosc. vnde dicatur. 59. 901
sit, & eius hist. ibid. 61. 62.

Astragalus. 118.

Atriplex syluestre. 48. xxviii.

Attrahentia. 38.

Aurantium. 97.

Auricula Vrsi. 19. 22.

Aurium dolores sedantia. 104.

I N D E X:

B

B *A'λανος* quid. xviii. 62.
Βάτος ὁ ξύρυγος.vi.
 Belladonna.46.49.50.
 Betonica.34.58.
 Betonica aquatica. ibidem.
 Bilem flauam educentia.38.39.
 Bislingua vnde dicatur.66.69.
 Bistorta.45.
 Brassica.86.
 Britannica.45.
 Bubones petilentes maturantia.71.
 Buphthalmos.56.

C

C *Αερα*.54.86.116.
 Calamintha.13.
 Calcitropa vnde dicta.105.
 Calculum exenteria.71.109.
 Calculos frangentia.19.78.79.
 Caltha.56.
 Campanula pyramidalis.xxxii.
 Canes occidentia.112.
 Canis. v.
 Capitis doloribus medentia.45.70.
 Capparis.106.
 Caprificus.101.
 Carbunculos sanantia.38.
 Cardamine.xxviii.
Καρπός quid.80.
 Caryophyllus.97.
 Centaurium maius.96.
 Centaurus. iiii. v.
 Cerua. iiii.
 Cetola. vi.
 Chamædaphne quæ & unde dicatur. 67.68. eius hist.69.
 Chamædryon.34.
 Chamæmelum. xxiii.
 Chelidonium maius.96.xxiii.
 Chondrilla.6.39.97.101.
 Chondrilla prima Diosc. unde dicta.9.
 quæ, & eius hist. ibid. 11.12.13.
 Chondrilla altera Diosc. vnde dicta 13
 quæ & eius hist. ibid. 15.16.
 Chondrilla cærulea.97.
 Chrysanthemum.54.56
 Chrysocomes radix 8.

Cicer.59.61.62.65.68.70.
 Cicerula.58.
 Cichorium.ij.15.97.
 Cichorium Constantinopolitanum.16.
 Cichorum strumosum Myconij. 16.
 Cissampelos.xxviii.
 Cistus.13.
 Clinopodium syluestre.26.
 Clymenum Diosc. quod, & eius hist.52
 54.55.56.57.58.
 Cnicus.96.
 Coeliacis utilia.58.
 Coitus piscium raro conspicitur. iiii.
 Coitus piscium ocysimè fit. ibid.
 Coli tormenta discutientia.91.
 Colocasia.7.
 Columbina.3. vnde dicta.4.
Κόμιν quid significet.36.
 Comitialibus vtilia.96.109.
 Commentatorum Diosc. error.43.91.115
 Commentator Diosc. reprehenditur.49.
 106.113.
 Conchas vulgò Anatisferas non esse fructus terrestres, neque ex ijs Anates oriri. sed Balani marinæ speciem. xiii.
 xv. xvi. xviii.
 Conceptum impediencia.83.
 Concoquendi vim habentia. 16.
 Consolida regia.2.
 Conuulsis vtilia.74.
 Cordi utilia 20.87.
 Coriandrum.71.73.74.75.79.
 Cor Indicum.4.
 Coronopus. xx. xxxi.
 Corruda tertia Clusij. 109.
 Cortex. quid 6.
 Crocus. xx.
 Cucumis. xxviii.
 Cutis vitia sanantia.30.
 Cyaneus.30.96.97.100. eius varietas.97
Κύναρχον. 110.
Κυνοκράβη. 110.
 Cynocrambe. 110. xxiii.
Κυνοκτόνον. 110.
 Cynoglossa. 15.
Κυνόμορον. 110.
 Cypèrns.6.7.8.62.

I N D E X.

Cypérus à Cypro in quo differat. 8.
Cypirus quid. 8.

D

Dactylus Plinij. 45. vnde dicatur.
46.
Dalechapius notatur. 86. 105. 106.
Damassonium. 18. vide Alisma.
Damassonium alterum Plinij. 22.
Δασύς quid significet. 44. 45. 90.
Datura quid. 51.
Dens Leonis. 11. 15. xxv.
Dentes euocantia. xi.
Dentium dolores minuenda. ibid.
Diaboli morsus. 39. 100. quare sic dictus. 38.
Distamnum. 82.
Digerentia. 79.
Diogenis dictum. 99.
Dioscoridis caput restitutum. 51.
Dioscoridis commentatorum, & interpretum incuria. 43. 49. 91. 115.
Dioscoridis commentator reprehenditur. 49. 106. 113.
Diosc. incuria & Affeclarum. 67.
Diosc. locus corruptus. xx. 80. 82.
Dioscoridis locus corruptus restituitur. 41. 45. 113. 116.
Diosc. locus emendatur. 46. 48.
Diosc. textus illustratus. 38. 41. 62.
Δοκῶ quid. iiii.
Dodonæus notatur. 4.
Dryopteris. 77. 78.
Dysenterix quid profit. 7. 20. 62. 66. 72. 74.

E

Ebulum. 36.
Echinon. 108.
Echinon herba. 104.
Elaphoboscum Diosc. vnde dictum. 88. qd sit, & eius hist. ibid. 90. 91.
Elaphoboscum. 86. 87. 115. 119.
Ελῆξ quid significet. 1. 65.
Elleborus. 18. 22. niger. 90. 115. 116. 117. 118.
Enterocelis quid profit. 20. 82. 83.
Epilepticis quid utile. 120.
Epimedium Diosc. vnde dictum. 80. qd

& eius hist. ibid. 82. 83.
Epimedium. 23. 24.
Epimetrum. 23. 24. 80.
Epipetron. 23. 24. 80.
Epiphoris quid medeatur. 45.
Equa. iiii. v.
Equiserum. 101.
Erineos. 23. 80.
Ερπιδός. 101.
Erinus Nicandri, & Dioscor. vnde dicta 101. quæ sit, & eius hist. ibid. 103. 104. 105.
Erinæ noua minima. xxix.
Eruca. 35. 46. 48. 49. 50. 51. sylvestris. 36. 39. 48.
Eryngium. 61. 119.
Erysipelata curantia. 26.
Erythrodanum. 29.

F

Faba. 52. 54. 100.
Fascino aduersantia. 30.
Febri aduersantia. 30.
Ficus x.
Filix. 77. 78. 82. 94. femina. 78.
Fior campepe. 95.
Fior d'ogni mese. 55.
Fluxum muliebrem sistentia. 66.
Fluxionibus contraria. 79. rubris. 58.
Fœniculum. 79. 88.
Φολίς quid. x.
Furunculos discutientia. 38.

G

Galega montana. 62.
Gallinæ morsus. xix.
Gaza notatur. 96.
Genista. 11.
Geranium bulbosum. 74.
Geranium columbinum. 71. 74. Robertianum. ibid.
Gingiuarum suppurationi vtilia. 62.
Gladiolus quid. 8. Glans ouid. xviii.
Glastum. 39. 52. 55. sylvestre. 39.
Γράφοι, quid. 108.
Grumos sanguinis dissoluentia. 38.

H

HAEmorrhoidas sanantia. 58.
Halicaceum. 4.

Harundo

I N D E X

Harundo. 85.
Hedera. 52. 59. 80. 81. 85. 110. 112
Heliotropium. 54.
Helxine. xxvii. & xxviii. Cissampelos. ib.
Hepaticum trifolium. 83.
Herba lattaria. xx.
Herba stella. xx.
Herba stridola. 15.
Herculeus morbus. 93.
Hernias fanantia. 65. 71. 83.
Hiera. 32.
Hippocentaurus. iiii.
Hippoglosson. 66. unde dicatur. 67
Hippolytus Saluianus notatur. x.
Hippophaës. 95. 106. 108.
Hippophæstum vel Hippophaës Diosc.
vnde dictum. 105. quod, & eius hist.
ibid. 106. 108. 109.
Hippohies. 105.
Hippope. 105.
Hipposelinon. 105. 115. 119.
Hirculus. 119. eius consideratio, & de-
scriptio. 120.
Hircus. iiii. xx.
Hyacinthus. 61.
Hydropicis utilia. 109.
Hypericum 45. tomentosum. ibid.
Hypochondrium unde nomē trahat. 13
Hypoglossum. 65. vnde dicatur. 66. 67.
68. 69. eius hist. ibid.
Hypophæstum. 105.

I

I Acea. 95. 99.
Iecur quid expurget. 3. 4.
Igni ambustis me dentia. 45.
Illecebra quæ sit. 41. 43.
Inflammat' ones sedantia. 34
Infantiam facientia. 49. 50. 51
Intybum. 97. 102.
Inula. 85. 86. 91.
Iocinores obstructions aperientia. 30.
Iris. 52. 55. 58. 94.
Isopyrum Diosc. unde dictum 1. quod
sit, & eius hist. ibid. 2. 3. 4.
Iuncus. 115. 116. 117.
Iuncus triangularis quid. 8.
Ixia. 75.

L

L Ac elicientia. 16. xix.
Lactaria herba. xx.
Lactuca. 86. agrestis. 11.
Lanaria herba, vide Struthium.
Lappa 30. 108.
Lappula miuor. 108.
Laterum uitio quid proffit. 7. doloribus.
112. 120.
Lauer. 88.
Laurotaxa, quæ & unde dicta. 67. eius
hist. 69.
Laurus. 67.
Laurus Alexandrina quæ, & vnde dica-
tur. 67. eius hist. 68.
Lentigines depurgantia. 30.
Lens. 77.
Λεπιδες quid. x.
Libanotis. 88.
Lienis obstructions aperientia. 30
Lilium. 54. 91.
Linaria. 11.
Lithospermon. 30.
Lobellius notatur. 15. 16. 18.
Lunaria botrytis. 79.
Lupos necantia. 112.
Lupus cum cane, & zulpe coit. 7.
Lpxata coniungentia. 82.
Lychnis. xix.
Lyron. 18.
Lysimachia lutea. 116.

M

M Aculas detergentia. 20
Malinathalle Theophrasti unde
dicatur. 6. quæ & eius hist. ibid. 7. 8. 9.
eius usus. 7.
Mammas cohibentia. 83.
Marcellus Virgilius notatur. 16. 43. 44.
86. 106
Marrubium. 3. 13. 2. 3. 4. 35. 38.
Matthiolus notatur. 16. 32. 58. 86. 104.
Melampodium. 118.
Melampus pastor. 118.
Melanthium. 3. 4. 19.
Menses ducentia. 12. 20. 70. 71. 79. 120.
sistentia. 23. 26.
Mercurialis. 24. 36. Mespilus. 6. 9.
Monstrosus animal. v.

Mor-

Morsus Gallinæ. xlx.
 Muchio. viii.
 Mulus. v.
 Myacantha. 109. quæ, & eius hist. ibidē.
 110.

Myosora. xxvii.

Myrtus sylvestris. 68.

N

Narcissus. 115. 116.
 Nardum celticum. 119. 120.

Nardum montanum. 116. 119.

Nardum sylvestre. 115.

Narium eruptiones sanantia. 58.

Nervorum affectibus utilia. 109.

Nigella vide Melanthium.

Nux Metella. 48. 51.

O

Ocimoides lychnitis. quæ, & eius
 hist. xix.

Ocimoides. 19. 101.

Ocimum. 23. 24. 26. 35. 36. 46. 49. 50.
 101. 103. 104. xxxi. exoticum. xxxi.

Oculorum epiphoris medentia. 104.

Oculorum fluxiones cohibentia. 104.

Oculorum ulceribus utilia. 45.

Olusatrum. 88. 119.

Ophioglosson. 83.

Orchis. 82.

Oris ulcera. 120.

Orobanche. 83.

Orthopneas curantia. 109.

Oxalis. xxviii.

Oxymyrsine. 63.

P

Pœonia fœmina. 90.

Panos curantia. 26.

Pantheras necantia. 112.

Papaver corniculatum. 95.

Papaver Heracleum Theophr. & Diosc.
 vnde dictum. 93. quod, & eius hist. ibi.

94. 95. 96. 97.

Papaver rhœas 93.

Papaver spumeum idem quod Hercu-
 leum. 93.

Paralyseis curantia. 109.

Paralytica. 19. 22.

Παραπλησιος. 24.

Παραπλησιος. 110.

Parietaria. xxvii. xxviii.

Paronychias sanantia. 46.

Partus adiuvantia. xi. 70. 71.

Pastinaca domestica siue vulgaris. 85.
 erratica. 75. nigra Theophr. 88. 90.

Pastinaca sativa. 86. 87.

Pastinaca marina Diosc. quæ & eius hi-
 stor. viii. x. xi.

Pastinacæ ictibus medentia. xi.

Pectori quid profit. 7.

Pena notatur. 4. 23. 39.

Peplis siue Peplion. 43. 44.

Perdicium. 15.

Periclymenum. 52. 58.

Personata. 7.

Pes Anserinus. 48.

Pesti aduersantia. 4. 20.

Pestiferis morbis. 30.

Πέταλον quid. 1. 4.

Πασί quid. iiii.

Phasiolon. 1. 2. 3.

Phu Dioscor. & eius hist. 113. 115. 116.
 117. 118. 119. 120. quare sic dictū. 117.

Phu. 36.

Phyllitis. 82.

Phyteuma Diosc. vnde dictum. 99. quod
 sit. & eius hist. ibid. 100. 101.

Phyteuma minus nouum floribus odo-
 ris. xxxii.

Φυτίων quid. 99.

Pilos agglutinantia. 12. 16.

Pisces cartilaginei ouipari. v.

Pisces ocysimè coeunt. iiii.

Pisces cartilaginei coeunt^r. supinarum
 partium attritu. v.

Polemonia. 19. 95.

Polygonatum. 66.

Polygonon. 30.

Polypodium. 77. 78. 55.

Polyporum cirri. 52. 55. 58.

Porrus. 35. 36. 38.

Portulaca. 40. 41. sativa. 43. sylvestris.
 ibid. quæ ibid. 44.

Poussépéz. xv.

Primula veris. 19. 22.

Profluuium album mulierū sistentia. 82.

Pterygia sanantia. 46.

Pycnocomon Diosc. vnde dictum 35. 36
 quod

I N D E X

quod sit, & eius hist. ibid. 36.38.39.
 Pycnocomon. 100.
 Πυκνός quid. 44.45.

Q Vadripedes necantia. 112.
 Quercus. 3. 132.

R Abiem sanantia 30.32.35.
 Radix Idæa Diosc. vnde dicta 63.
 quæ sit, & eius hist. ibid. 65.66.67.68
 69.70.71. eadē est quæ Hypoglosson.
 Laurus Alexandrina, Lauroraxa, &
 Chamædaphne. ibidem.

Raia. iii. v. vi. vii. vii.

Ranunculum. xxiii.

Rapuntium vulgare. xxiii. xxviii. xxxii.

Renes expugnantia: 30. obstructions
 aperientia. 19.

Rhaphanus. 62. 86. 90. 103. 108 sylue-
 stris. 75.78.79.

Rhinobatus Arist. & Plinij. iii. vnde di-
 ctus, qui, & eius hist. ibidem. iv. v.
 vi. vii.

Rondeletius notatur. iii.

Rosa. 97.

Rubia. 29.65.

Rubus. xxiii.

Ruellius notatur. 2.

Rugas delentia. 20.

Ruptis & luxatis quid profit. 20.74.120

Ruscus, siue Myrtus sylvestris. 59. 63.
 65.66.68.69.70.117.

S

S Aluia. 31.32.34.

Sanguinem è naribus educantia. 45.

Sanguinis eruptionem sistentia. 3.58.62
 66.74.

Sanguinis grumos dissoluentia. 38.

Sanicula. 19.22.

Saniculæ adagium. 73.

Scabiem sanantia. xi. 30. 100.

Scabiosa 36.39.100.101. Hispanica di-
 cta. 100. xxxii. noua floribus odoris,
 xxxii.

Scolopendrium. 75.75.78.79.

Scrofa. v.

Scrophularia. 54.58.

Sinapi agreffe nostras, quod, & eius hist.
 xxiii.

Sium. xxviii.

Solanum siue strychnon manicum Dio-
 scoridis, vnde dictum. 46. quod sit, &
 eius hist. ibid. 48.49.50.51.

Solanum somniferum & lethale. 49.

Soldanella marina. 82.

Somnia, & imagines representantia. 50.
 51.

Somnia graui quæ efficiant. 38.

Sonchus. ij. 94.95. 101. 108.

Sorbus. 94.

Sparganium. 80.

Spuma quid significet. 93.

Squatina, & Raia simul coeunt. iii.

Stella marina δεκαδασυαντινός
 δὲ, quæ, & eius hist. xiii.

Stellaria. 105. vnde dicta. ibid.

Sterilitatem facientia. 83.

Stœbe. 95.99.101.

Stomachi ardoribus auxiliantia. 70.

Stomacho utilia. 13.85.

Stomachum excitantia. 87.

Strammonium. 48.

Strumas curantia. 16.20.

Struthij nomen, & etymon. 94. eius deli-
 neatio. ibid. 95

Struthium, lanaria herba. 93.94.95.97.
 99.100.101.

Στρούθιον quid. 94.

Σρουθός quid. 94.

Σρουθίον quid. ibid.

Struthium auis. 94.

Struzzo. ibid.

Strychnon manicon vide Solanum.

Succisa. 38.100.

Succudus Auicennæ. 80.

T

T Elephium. 41.43.44.45.

Terebynthus. 88.90.91.

Thlapi. 19.27.

Thoracis dolorem quid sedet. 3.

Thryon. 46.51.80.

Θύλαξ, & θυλάκιον quid. 55.

Tithymalus characchia. 40.

Tithymalus tuberosus. 90.]

Theo-

I N D E X.

Theophrasti locus illustratus. 49.
 Torminibus aduersantia. 20. 71.
 Τραχία quid. 90.
 Trachelium montanum tragopogi folio. quod, & eius hist. xxv.
 Trachelum xxiii. xxxii.
 Tragacantha. 75.
 Tragelaphos. iiii.
 Tragium primum Diosc. 75.
 Tragium alterum Diosc. vnde dictū 75.
 quod sit, & eius hist. ibid. 77. 78. 79.
 Tragij varietas, & hist. 79.
 Tragopogon, laciniatis folijs vnde dictū & eius hist. xxii.
 Tragopogon. xxiii.
 Trahentia. 79.
 Trasi. 6. 7. 8. 9.
 Trichomanes. 77. 78.
 Trifolium bituminosum. 36. 100. palustre. 4.
 Tumores discutientia. 30. 38. mitigātia. 20.
 Tusum sanantia. 3. 7. 30.
 V
 Valeriana maior. 115. 116. 117. 119.
 Valeriana minor siue sylvestris. 115.
 Venenis aduersantia. 18. 20. 22. 45.
 87. 104.

Venerem scientia. 87.
 Verbascum. 19.
 Veronica. 30.
 Vertigines sanantia. 109.
 Vesica utilia. 19. 30.
 Vesicaria Indica. 4.
 Vicia. 59.
 Viperæ morsui aduersantia. 12.
 Vitilignes exterenia. 12.
 Vlcera glutinantia. 30. 82. 62. 74.
 Vlcera serpentia curantia. 46. 51.
 Vomitiones mouentia. 96.
 Vrinæ ardores quid mitiget. 7.
 Vrinæ stillicidio utilia. 70.
 Vrinæ scientia. 62. 78. 85. 87. 91. 109. 120.
 Vrsi auricula. 19. 22.
 Vrticella quæ. 24.
 Vterum expurgantia. 30.
 Vulnera sanantia. 20. 30. 34. 58. 74. 82.
 Vulpes. v. quæ occidant. 112.
 Vulsis utilia. 20. 120.
 Vulnæ dolores sedantia. 38.
 Vuulæ tumores sanantia. 65. vlcera. 71.
 prolapsam quid contrahat. ibid.
 Vuularia. 65. 66. 71. quare sic dicta. ibid.
 X
 Anthium. 48.
 Xiphium. 80.
 Xyris. 80.

Errata sic corrigenda .

Pag. 9.	Chondilla, . . . corrige	Chondrilla.
Pag. 27.	Thlaspi,	Thlaspeos.
Pag. 44. & 45.	Quamobrem poterit,	Quamobrem non poterit.
Pag. 50.	aut maneat,	aut maneat.
Pag. 77.	Siciliana dicta,	Sicilianæ dictæ.

In Secunda Parte.


Pag. 8.	æque eijcit,	corrige	æque eijcit.
Pag. 11.	eadem uit,		eadem uis.
Pag. 19.	Ocymoides,		Ocimoides.
Pag. 28.	Α'λινι, Α'λσινι ελσείδις ελσώδις φυλεῖν φιλεῖν.		

Imprimatur.


Ardicinus Biandrà Vic. Gen. Neap.


M. Philocalus Carmelit. Dep. vidit. Idem. f. 190.











SPECIAL 8A-B
QK 13485
41
C71
1592
Inv. #
90

9

